






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
394/A









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
394/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
394/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
394/A

The image shows the front cover of an old book. The cover is decorated with a marbled paper pattern in shades of green, blue, and yellow. A central rectangular label with a cream-colored background and a thin gold border contains the text 'DEBACQ LIBRARY' in a black, serif, all-caps font. The book's spine, visible on the left, is made of dark brown leather with some wear and a small gold label near the top.

DEBACQ LIBRARY









A. xiv. b

394/A









37.

42206

ARETAEI CAP-  
padocis medici lib. viii.

RUFFI EPHESII  
de hominis partib. li. iiii.

IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

ACCESSERE quę Crassus nō vertit  
Aretæi aliquot Capita.

Ruffi liber de Vesicæ ac renum affectib.

Eiusdem de Medicamentis purgātibus.

Adnotationes locorum in quibus ab in-  
terprete Græca discrepant.

PARISIIS, M. D. LIIII.  
Apud Guilielmum Morelium, & Iaco-  
bum Puteanum.

*Jm Graville Druyde*

LIBE

3-51







# ILLVSTRISS.

PRINCIPI ALBERTO  
seniori, Marchioni Brandenburgensi,  
Prusiæ, Stetini, Pomeraniæ, Vandalorum,  
Cassubiorumque  
Duci, Burggraui Norimbergensi, ac Rugiæ  
Principi,

IVNIUS PAVLVS CRASSVS  
S. P. D.



Volōgè omnium pulcherrima, diuinisque operibus cōsimilia nobis à diis fuisse concessa, veritatem scilicet eloqui, & mortalibus benignè facere, Pythagoras ille philosophorum sapientissimus assererat. Id ego mecū sepe animo reputās, ALBERTE princeps Illustrissime, verissimam tanti philosophi sententiā esse cognoui. Deus nanque cū res omnium summa, perfectissima, verissimāque sit, cuiusque ve

\* ij



ritatis fons est vberimus. idem cum sit  
perquam beneficus & liberalis, in om-  
nem mundum munera sua longè latèq;  
diffundit: & quicquid est, à Deo vitam &  
perfectionem, quantam eius natura ca-  
pere potest, adipiscitur. quapropter ego  
Deum imitari, eiusque muneribus ali-  
quo pacto defungi cupiens, vt primùm  
per ætatem licuit, veritatem docere, atq;  
humanum genus pro virili parte iuare  
constitui. Inde factum est, vt annos pro-  
pè viginti in nostra Patavina Academia  
per totam Europam celeberrima, Hip-  
pocraticam medicinam publicè non in-  
frequentì auditorio interpretatus fue-  
rim. Verùm cum ab eo docendi officio  
nimis laboribus deterritus, corpusculi-  
que nostri valetudini consulens destitif-  
sem, alia ratione veritatem patefacere,  
humanoque generi opem ferre quare-  
bam. Ea verò est, aut aliqua per me uti-  
liter inuenta literarum monumentis cõ-  
mendare, aut veterum auctorum obso-  
leta documenta illustrare, in hominũ-  
que memoriam reuocare. Cum in hac  
animi fluctuatione versarer, fortè liber.



quidam Græcè manu scriptus, veterri-  
mus & cariosus in manus meas incidit:  
in fronte libri nomen auctoris inscriptū  
erat, Aretæi videlicet cappadocis. de mor-  
bis agebat, qui singulatim humani cor-  
poris membra corripunt: ipsum auidè,  
vt mihi moris est, & ter, & quater perle-  
gi. perlectus liber cū gaudio, tum mœ-  
rore animum perfudit meum. Quippe  
gausus sum tam egregij auctoris librū  
qui vetustatis iniuria hominūque so-  
cordia in tenebris tot secula iacuisset,  
in lucem Dei beneficio fuisse vindica-  
tū. Indolui verò non mediocriter, ipsum  
non sanum, non integrum, sed multis  
mendis inquinatum, multis magnisque  
vulneribus concisum & laceratum ad  
manus nostras delatum esse. Caterū  
hæc fragmenta colligere, vtque pluri-  
bus vsui forèt, Latina facere, ac publica-  
re satius esse iudicaui, quàm ea in totū  
carie, tineis, sitūque deleri permittere.  
Scriptor enim mihi plurimi faciendus vi-  
sus est: nam salutaria in primis documē-  
ta proponit: auxiliāque pellendis mor-  
bis præsentanea recenset. quo quid ma-



gis expetendum mortalibus sit, nescio.  
quid enim cetera vitæ bona affecto lan-  
guentiq[ue] corpore proficiunt? præterea  
summoperè lectorem detinet, atque de-  
lectat. nam & quatenus materiæ conue-  
nit, grandiloquus est cum ampla & sen-  
tentiarum grauitate, & maiestate ver-  
borum, vehemens, varius, copiosus, ad  
permouendos animos acerrimus, ipsa  
quoque vetustate venerabilis. Qua ve-  
rò tempestate vixerit, apud nullum Græ-  
cum Latinumve scriptorem hætenus re-  
perire, aut certis coniecturis assequi va-  
lui. Natione Cappadox fuit, vt libri testa-  
tur inscriptio. in qua regione, licet bar-  
bara, tres tamen gentes Græcæ, Dorica,  
Ionica, & AEolica florere. Galenº cum  
huiusce Aretæi nusquam meminerit, a-  
lioqui veteres medicos sæpe cõmemo-  
rans, nullam de eo notitiam habuisse vi-  
detur. Paulº AEgineta semel eum initio  
quarti sui voluminis, Aetius verò Ami-  
denus frequētius nominauit. Sua patria  
lingua Ionica scribit: Hippocraticam-  
que dicendi formam, idest breuitatem  
cum grauitate coniunctam æmulatur.



Hippocrate nanque fuit etate posterior:  
siquidem eum nonnunquam testem ad-  
ducit: eiusq; vel integros aphorismos in  
suis voluminibus conscripsit. Nulli secte  
addictum se Areteus aperte demonstrat:  
in quibusdam enim ab Hippocrate, Ga-  
leno, Aristoteleque dissentit. De nonnul-  
lis etiam morbis propria quaedam à nul-  
lis aliis tradita, rationi tamen consenta-  
nea, scituq; dignissima exponit. Quàm  
multos in eo transferendo labores tule-  
rim: quantum temporis atque olei ab-  
sumpserim, vix queam dicere, cum pluri-  
mis undique vulneribus confossus esset.  
ex tribus tamen collatis exemplaribus  
multa quæ deficiebant, restitui: quæ erant  
deprauata, castigavi: quæ confusa erant,  
in ordinem redegi. per coniecturas etiã  
certissimas ab artis medicæ peritia de-  
sumptas, non paucos locos librariorum  
incuria vitiatos antiquæ & sanæ lectio-  
ni restitui. De quibus autem ambi-  
gebam, neque synceram veritatem  
eruere, mihi que penitus satisfacere po-  
teram, eos asterisco notavi: aliorumque  
iudiciis pensandos castigandosq; reli-



qui: vtque in summa dicā, quantum huic  
libro opis attulerim, qui candida mēte,  
& liuore purgata ipsum curiosè lectita-  
bunt, & cum Græcis exemplaribus con-  
ferent, facilè deprehendēt. Libellus præ-  
terea quidam Ruffi Ephesij de medici-  
nalibus appellationibus inscriptus Fran-  
cisci Frigimelici medici nobilissimi, &  
omnibus reconditis disciplinis ornatissi-  
mi opera cū ad me allat<sup>9</sup> esset, auctoris  
præstantia atque eruditione cognita, cū  
quoque eadem de causa Latinitate do-  
nandum, Aretæoque adiungendum esse  
iudicaui. vterq; enim vetus scriptor est:  
vterque Græca oratione artem medicā  
literis commendauit. Fuit sanè Ruffus  
Traiani Adrianiq; Cæsarum temporibus,  
medicus eximius Ephesi natus, vrbe  
Ionix celeberrima, minorisq; Asiæ me-  
tropoli. Hic multos de medendi facul-  
tate libros eruditissimè composuit, ma-  
gnique Galeni testimonio laudari com-  
meruit. nam de atra bile neminem ex-  
actius luculentiusq; quàm Ruffum, dis-  
seruisse cōmemorat. Verū ex tot eius  
doctissimis libris hic vnus, quod ego



sciam, vix reliquus est. in quo singularū  
corporis partium Græca vocabula enu-  
merat: necnon & earum positum, figu-  
ram, numerum, vsum, facultatesque de-  
clarat. Igitur hunc libellum perutilem,  
dignumque, qui ab eruditis perlegatur,  
Latina lingua donare, & in manus stu-  
dioforum proferre haud alienum duxi-  
mus. Neque hîc parum diligentiae adhi-  
bendum fuit, cū Græcis vocibus Lati-  
nas respondentes indagaremus: neq; id  
in omnibus semper assequi possemus. In-  
terdum enim linguam nostram voca-  
bulorum inopem (nisi forsan hoc igno-  
rantia nostra factum sit,) inueniebamus.  
At ubi nos Latina deficerent, Græcis,  
quæadmodum & in aliis doctrinis fieri  
solet, pro Latinis vti sumus. Porro illud  
monitos lectores velim, huiusce libelli  
primam partem à Ruffo bis eisdem fe-  
rè verbis fuisse conscriptam, eadēque  
fermè ad vnguem repetita. Quo id con-  
filio fecerit, diuinare nequeo. Ego verò  
cū ita manu scriptum librum offende-  
rim, ita & transferre, & edere libuit. ne-  
que enim ex toto partes hæc similes sunt:



Sed nonnulla, quæ in altera defunt, in altera reperiuntur: nonnulla, quæ in altera obscure ac breuibus perstricta sunt, in altera clarius ac fusius explicantur. Hos itaq; perueteres ac præstantissimos artis medicæ scriptores, ne eorum qui de humano genere benè meriti sunt, memoria prorsus euanesceret, diuulgare cùm mihi in animo esset, meaque commendatione apud vulgus eos minus probatum iri suspicarer, sub tuo nomine id facere optimum esse celsui illustrissime ac sapientissime Princeps. Te verò potissimum inter Christiani nominis principes delegi, cui has lucubrationes meas dicarem, quòd te constans fama & sanctissimis moribus, & vera religione insignem, bonarumq; disciplinarum alumnus, & parètem celebrat. non potui igitur non te maxima veneratione atq; amore prosequi: cùm nihil sit in terris optimo principe dignius, nihil amabilius: nihil, si modò humana diuinis cōferre fas est, quod magis Deo simile dici queat. Verus enim princeps ille est, qui vt dignitatis fastigio, perinde & virtute cete-



ris mortalibus præstat. Qui talis autem  
agnoscitur, is tanquã terrestris Deus, aut  
saltem Dei vicem gerens inter homines  
suspiciendus, ac sanctè pièque obseruan-  
dus est. Iccirco & antiquitus populi & ci-  
uitates viros probitate vitæ excellentes  
ad magistratus & ad imperia prouehe-  
bant: eosq; vel inuitos imperare coge-  
bant. vt Scylax de regibus Indiæ memo-  
riæ commendauit. Te verò huiusmodi  
esse, hisque de causis tanto imperio di-  
gnũ iudicatum, maximè atque optime  
Princeps, nemo tam rerũ imperitus est,  
qui nesciat. Ea enim in te omnia sunt,  
quæ in summo rege inesse debere omnis  
testatur antiquitas. Porro familiæ tuæ,  
maiorumque tuorum splendorem, ac  
fortia facta consultò prætereo, quando  
quidem quæ nos, ( vt poeta ille dice-  
bat,) nõ fecimus ipsi, vix ea nostra puto.  
At quæ tua propria sunt, & verè regia  
ornamenta, ea planè digna sunt, quæ  
ab omnibus in cœlum ferantur, ab om-  
nibus memoriæ ac literis prodantur.  
Admirabilis prudentia, quam pro-  
priam regum esse virtutem Aristoteles



voluit, in primis apparet. per eam enim  
tantam molem tuæ latissimæ ditionis  
tam in bello, quàm in pace scientissimè  
gubernas ac moderaris: populisque tuis  
ventura incommoda longè prospiciens  
& cauens, eos in summa tranquillitate  
conseruas. Iustitia præterea, quæ cuiusq;  
regni firmissimum vallum ac munimen-  
tum est, nullo vnquā in principe, quàm  
in te clarius enituit. nam sua cuique pro  
meritis tribuis: diuites potentioresq; nō  
deprimis: pauperes atq; humiles sustines,  
foues, à contumeliisque defendis. Libe-  
ralitatem autem tuam, & erga omnes,  
sed præcipuè literarum cultores muni-  
ficentiam quis vnquam satis pro meri-  
tis laudauerit? Plurimos enim ære tuo  
non in Germaniæ modò verum etiam  
Italiæ gymnasiis vberrimè fouisti atq;  
sustentasti: scholā Regiomontanam in-  
stituiisti: doctissimisq; viris, qui studio-  
sam iuuentutē erudirent, vndiq; accitis  
exornasti: bibliothecā quibuslibet vete-  
rū scriptorū libris refertissimā profusissi-  
mis impensis condidisti. quam qui vider-  
unt, cū antiqua illa Philadelphi AEgy-



ptij bibliotheca certare cōtendunt. Ne-  
pe fortitudinem, quanta in te sit, res in  
bello strenuè ac fortissimè per te geste,  
omnibusq; vel remotissimis gentibus  
manifestæ declarant. Humanitatem &  
clementiam incredibilem non modò  
subditi, sed & finitimæ & longinquæ na-  
tiones testantur: cùm nemini vnquam te  
adire volenti occludatur accessus: nemi-  
ni vnquam irrita ceciderit, modò fuerit  
honestæ petitio. Iure itaq; Homeri poe-  
tarum principis carmina illa de te cani  
possunt, quibus bon<sup>o</sup> princeps pastor po-  
pulorum dicitur. Iuppiter deorum ho-  
minūq; pater appellatur. Quid mirū er-  
go, si tu virtutibus adeo fulgens, in tan-  
ta fortunæ amplitudine positi<sup>o</sup>, (quæ duo  
in eodē rara inuentu sunt,) me ad te a-  
mandū, & quoquo modo possem, colen-  
dū illexisti, vel potius attraxisti? Ac non  
vereor, ne flagitiosa quadā assentatione  
aucupari tuā gratiā videar: neq; enim  
tu is es, qui sis nescius eos magis qui te  
non admirentur, inuidos, quàm eos qui  
laudēt assentatores esse iudicandos. Nā  
quæ de te hætenus prædicaui, neq; mea



cōment a sunt, neq; solus attestor: sed hęc  
passim Germani, Sarmatæ, Itali homi-  
nes, neque vulgaris notæ, sed grauissimę  
quiq; viri vno ore fatentur, ac celebrāt.  
Hisce ego rebus impulsus, sed tua po-  
tissimū lenitate mansuetudinēq; fretus  
benignissime Princeps, hos tibi dedicaui  
libellos: non me latet, quā ignobile,  
quā fordidū munusculū: at me legisse  
memini Artaxerxi Persarū regi cogno-  
me: to Memori agrestē quendā haustā ē  
proximo flumine aquā caua manu ob-  
tulisse: neq; ab eo reiectum, sed comiter  
acceptum, & phiala aurea, stola persica,  
multisq; daricis donatum abiisse. Dices  
forte, quid principi cū medicorū libris?  
multa & præclara priscorum regū exem-  
pla adduci possunt, Attali regis minoris  
Asiæ, Gentij Illyriorum, Iubæ Maurita-  
niæ, Mithridatis regum barbarorum ma-  
ximi. Hi omnes medicinæ scientiā ada-  
marunt, diligenterq; coluerunt. Quod  
nisi iā plus æquo vagatus essem, tibi va-  
lentissimis argumentis ostenderē, prin-  
cipi viro nihil medicina charius, nihil iu-  
cundius, nihil fructuosius in vita accide-



re posse. Itaq; ne tuas aures grauissimis  
in administranda republica negociis oc-  
cupatas diutius inani loquacitate fati-  
gem, finem faciam, si hæc pauca adiece-  
ro, me in his vertedis auctoribus fidelē,  
quàm elegantē atq; disertū esse maluis-  
se. cū in arte medica res spectentur, nō  
verba pendantur. Sterilis quoq; materia  
est morborum natura & curatio: neque  
magnæ, (in alieno præsertim libro) fa-  
cundia capax: quæ alioqui nobis te-  
nuissima est. Sed iā aliud op<sup>o</sup>, quod deus  
fortunet, sanè quàm pulchrius meo iudi-  
cio, longēq; vtilius amicis nostris hortā-  
tibus, ac prope impellentibus aggressi  
sumus: vbi non alieni scriptoris sententiis  
adstringemur, sed propriis viribus niten-  
tes spatiabimur. latius excurret oratio,  
amœna interdū quæret diuerticula: ca-  
sus mirabiles, euentus varios, aliāq; iu-  
cunda dictu, ac legentibus non minus  
frugifera, quàm blanda narrabimus. In-  
terim hos libellos nostri erga te animi  
veluti arrabonē qualemcūq; mittimus,  
grandiorem librū, & magis operosum, si  
hos nō respueris, missuri posterius. Vale.



A.  
 P.  
 DEC  
 June  
 P.R.  
 Dep  
 Dele  
 Deta  
 Deap  
 Deacc  
 Letera  
 Ceang  
 Deff  
 Deten  
 Depla



AR ET AEI CAP  
padocis medici

DE CAUSIS ET SIGNIS  
acutorum morborum,  
Liber I.

Iunio Paulo Crasso Patauino  
interprete.

PRIMI LIBRI CAPI-  
ta, ex quibus prima quatuor perierūt.

De phrenitide,	cap. I.
De lethargo, seu veterno,	cap. II.
De tabe,	cap. III.
De apoplexia,	cap. IIII.
De accessione morbi comitialis,	cap. v.
De tetano seu rigore,	cap. VI.
De angina,	cap. VII.
De affectibus columellæ,	cap. VIII.
De tonsillarum vlceribus,	cap. IX.
De pleuritide,	cap. X.

A



2 DE ACCESSIONE MOR-  
bicomitialis, cap.V. sine principio.

\*hebetudines, vertigines, tēdonū gra-  
uitates, venarum colli repletiones &  
distensiones: nausea frequentius quidē  
à cibis, non minimè tamen & ab inedia  
pusilla quædam nausea sequitur, & vbe-  
rior pituitæ sit vomitus: paucis assum-  
ptis cibis fastidiunt, & crudi sunt: flatibus  
replentur: præcordia elata habent.  
Hæc sanè perpetuò comitantur. cū ve-  
rò accessio appropinquat, splendores  
quidam purpurei, aut nigri, aut omnes,  
vnà permixti ob oculos in orbem ver-  
santur ac discurrūt, vt in cœlo iris præ-  
tenta esse videatur: aures sonant, fœdū  
odorem sentiunt, iracundi fiunt, bilis  
præter rationem accenditur. Quidam  
igitur leui de causa, vt potè ob animi  
angorem, ceciderunt: aliqui intentè flu-  
minis decursum, aut rotam quæ circun-  
uoluitur, aut turbinem qui in orbem  
agitur, conspicati: alios autem rerum  
græuolentiā, vt gagatis lapidis odo-  
ratus, prostrauit: his vtique in capite vi-  
tium inhæsit, atque inde noxam infe-



DE ACVTIS lib. I. 3

rens ortum habet. Nonnullos verò & corripit à neruis procul à capite positis incipiens, quicunque principium in consensum affectus inducant. Itaque magni manuum aut pedum digiti conuelluntur: vnde & dolor, & stupor, & tremor sequuntur. atque hæc in caput impetum faciunt, si & malū surrepēs caput inuasit. His porrò fragor quidam redditur perinde ac si ab ligno, aut lapide verberentur. cūque ab humo surrexerunt, quædam tanquam si ex insidijs vapulassent, commemorant: hoc sanè pacto illi quibus primo id malum incidit, decipiuntur: quibus verò familiare & consuetum est, simul atq; morbus in digitum impetum dedit, aut inde exortum est, vñtatos, qui adsunt, adiutores inclamant, futuramque ab experimento calamitatem prospiciunt: obsecrant quoque, vt membra, vnde oritur, constringant, reflectant, dirigant. qui netiam ipsimet sibi ipsis affecta mēbra, tanquam inde morbum eximentes trahunt velluntque: atque ita sibi met auxiliātes, nonnunquam & nos ad ægri-



tudinis notitiam impulerunt. Nōnul-  
los vtique ceu inuadente fera pavor  
corripuit, aut adumbrationis opinio  
incepsit, atque ita prociderunt. At in ip-  
so morbi insultu sensibus captus ho-  
mo iacet: manus ipsi neruorum disten-  
sione conuelluntur. crura verò non so-  
lum distracta sunt, sed etiam huc atque  
illuc à tendonibus proijciuntur. Id ge-  
nus calamitas ingulatis tauris haud  
absimilis est: ceruix incuruatur, caput  
variè distorquetur. siquidem nonnun-  
quam pronū ceu arcus inflectitur, quā-  
do pectori maxilla adherescit: nonnun-  
quam verò in scapulas refringitur, ve-  
luti his qui per vim crinibus trahuntur,  
vsu venit: quando modò in hanc, modò  
in illam partem ad humeros admoue-  
tur. Sic laborantes magno hiatu os ape-  
riunt: id siccum habent, linguam praelō-  
gam, vt periculum sit ne aut magno  
vulnere faucietur, aut penitus absin-  
datur. Interdum conuulsione dentes in-  
ter se colliduntur: oculi inuersi sunt:  
palpebrae cum palpitatione frequenter  
dehiscunt. quòd si quando conuiuere



# DE ACVTIS LIB. I. §

velint: palpebræ non committuntur, sed alba oculorum cernuntur, ac subapparent. Supercilia nonnunquam, vt his qui ad iram concitantur, in glabellam attrahuntur: nonnunquam ad tempora vehementer admodum reuelluntur: vt cutis circa frontem valde prætenta sit, atque in superciliorum medio rugæ euanuerint. Malæ rubentes palpitant: labia interdum quidem in acutum clauduntur, interdum verò ad obliqua dilatantur, quando in ridentis speciem dentibus circuntenduntur. Malæ rubent quidem, sed cùm morbus increuit, & faciei liuor accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, vt in strangulatu, aufertur. etiam si vehementer inclames, non sentiunt. eorum vox nihil nisi gemitus & suspirium est. respiratio verò suffocatio quædam est, veluti in his qui laqueo strangulantur. Inter initia arteriarum motus vehementes sunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi, & languentes: in vniuersum autem, ordine carentes. penis quoque erectio sequitur. Hæc utique circa acces-



tionis finem patiuntur: vbi ad mali remissionem perueniunt, tunc sponte vrinam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adstrictis compressisque vasculis genitura excernitur. id verò & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere potest. siquidem & istis nervorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, crassam, & frigidam: eam si trahas, in longum, veluti filum, ipsius multitudinem deduces. Porro temporis longitudine, & laboris vehementia, quæ intra pectus sunt, feruent: spiritus verò intus coercitus omnia concutiet: eorundem quoque & conuulsio & perturbatio sequitur. inter respirandum præterea humores & os & nares inundant, spiritus cum humore effertur. Cum præcedens verò strangulatio remittit, omnia item remittere videntur. Quinetiam, vt magnis procellis cōcitatum mare, spumâ ore profundunt: quando & tanquam iâ dudum expulso morbo resipiscunt, & resurgunt. Cæterû cum à morbo quiescunt, ab initio membris segnes sunt: ca



DE ACVTIS LIB. I.

pitis grauitate premūtur: dissoluti sūt,  
languidi, pallentes: consternati animo  
ob lassitudinem morbiq̃ verecun-  
diam contristātur.

DE TETANO SEVRIGORE, cap. VI.

**T**etani musculorum qui in maxillis  
sunt, & tēdonum distentiones sunt,  
dolorem quidem magnum inferentes,  
celerrime vero necantes, haud facile  
quoque sanabiles. At noxæ ab hoc ma-  
lo cum omni corpore communicatur:  
omnia enim cum principiorum vitijs  
consentiunt. Species verò conuulsionis  
tres sunt, cū rectum corpus riget, aut  
retrosum flectitur, aut prorsum vers⁹  
incuruatur. Recto quidem corpore te-  
tanus dicitur, cū neutram in partem  
detortus homo atq; inflexilis contētus  
est. At cōuulsiones, quæ retrorsū aut in  
priorē partē fiūt, à tētione & loco nomē  
claturā accipiunt. nā in auersā partē æ-  
grotātis reclinatiōē opisthotonō vo-  
cam⁹, neruis qui eō loci sunt, male affe-  
ctis: emprosthotonon autē, si in priorē



partē homo deflectitur, nervis antērius  
positis laborātibus. ton<sup>9</sup> enim neruorū,  
tentionisq; vocabulū est. Causae autem  
istorū infinitae sunt. nā ob vulnera fieri  
solēt, mēbrana, aut musculis, aut nervis  
pūctis, ex quo plerūque moriūtur. à vul  
nere enim cōuulsio, letale est. Cōuelli  
tur autē & ex abortu mulier: verūm &  
hac raro admodū euadit. & ab aliquo  
vehemēti ceruicis ictu nōnulli cōuelli  
tur: & frigus. lōgē excellēs horū vitiorū  
causa esse potest. quapropter hyems o  
mniū maxime horū vitiorū ferax est:  
secundo loco ver & autūnus, aestas autē  
minime, nisi vuln<sup>9</sup> p̄cesserit, aut pere  
grini morbi grassentur in vulgus. Mu  
lieres sanē magis, q̄ viri, neruorū disten  
tione tētantur: frigidae enim sunt. verū  
ipsę frequētius liberātur, quoniā humi  
de sunt. Quātū ad ætates attinet, pueri  
assiduē hoc morbo vexātur: sed nō ad  
modum pereunt, quōd illis v̄sitatum &  
familiare id vitium sit. iuuenes autem  
rarius quā pueri, id patiuntur: sed cre  
brius intereunt. viri minime. at senes  
inter omnes magis & eo vitio corripiti



DE ACVTIS LIB. I. 9

tur, & eo necā ur. in causa est frigiditas  
& ariditas senectæ, & mortis natura. Ce-  
terum si frigiditas cum humido coniū-  
gatur, minus noxiæ sunt cōuulsiones,  
mi. usque ab ipsis discrimen impēdet.

Affectū hunc ista comitantur: omnes  
subito atque affatim corripit, labor &  
intentio tendonum adest: & dorsi, &  
musculorum, qui in maxillis & pectore  
sunt. inferiorem enim maxillam supe-  
riori annectunt adeo, vt neq; vectibus,  
aut cuneis per Iouem facilē diduci pos-  
sint. Quod si quis vi dentes abducēs hu-  
morem instillauerit, non demittūt, sed  
effundunt, aut ore continent, in narē-  
ue retrudūt. Isthmus enim simul inhæ-  
rescit, actonillæ duræ atque intentæ  
eius quod deuoratur impressioni non  
cedunt. Facies est rubida, variegata, o-  
culi ferme rigentes, qui vix circumuol-  
uantur: strangulatio vehemens, spiratio  
vitiosa, manuum crurūque distentio,  
musculi palpitantes, facies varijs modis  
distorta, buccæ & labia tremunt, maxil-  
læ quatiuntur, dentes strident: in alio  
verò quodam & aures mouebātur. Ego



sanè vidi & miratus fui, lotium sup-  
 primi vsque ad insignem meiendi dif-  
 ficultatem, aut sponte effundi, cum  
 vesica premeretur. Hæc utique omni-  
 bus cōuulsionis generibus communia:  
 propria verò cuiusque hæc sunt: tetani  
 quidem in rectum totius distentio, nul-  
 lam prorsus in partem detorta neque  
 declinans: recta quoque sunt crura &  
 manus: opisthotonos verò retrorsum  
 incuruat hominem, vt reflexum caput  
 inter scapulas locetur, guttur extat: ma-  
 xilla inferior plerunque dehiscit, & ra-  
 rō cum superiore committitur. in respi-  
 rando stertunt, venter & pectus promi-  
 nent, lotium his minus contineri po-  
 test. abdomen intentum est, & si percu-  
 tias, resonans. manus retrorsum exten-  
 sione detorquentur: crura inflectuntur;  
 econtrariō poplites vitiosè curuantur.  
 At si in priorem partem contrahuntur,  
 conuexa quidem his terga sunt: æqua-  
 liter cum parte pectori opposita, quam  
 metaphrenon Græci appellant. coxen-  
 dicibus extra pulsus, dorsum totum re-  
 ctum est: vertex caputque in pectus ver-



DE ACVTIS LIB. I. 11

gunt: mētum ossibus pectoris affigitur, manus confertæ sunt, & coharētes: crura extenta. Dolores omnium atroces, vox omnium flebilis. suspirant autem mussantes profundius. Si pectus & spiritum morbus occupauerit, facile migrant è vita: bonum quidem ægrotanti quòd laboribus, distortionem, turpitudinēq; liberatur. præsentib<sup>9</sup> quoq; hominibus min<sup>9</sup> triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritus licet vitiato, nihilominus permanente, prorsum versùs non arcus modò instar, verum & orbis incuruatur, vt caput genibus adnexum habeant, cruræque ac terga in priorem partem refracta sint. adeo vt genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniucundus aspectus, triste intuenti spectaculum, & malum insanabile: ob inuersionem autem vel ab amicissimis hominibus non agnoscuntur. votū quoque illis qui adsunt, prius impium, nunc honestum efficitur, ægrum vita defungi, quo vnà cum vita doloribus & acerbis malis liberetur. Quinetiam neque



medicus praesens atque aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figuræ emendationem quicquam opis afferre potest. nam si mēbra dirigere velit, viuentem sanè hominem distraxerit discerpseritque. Igitur victis à morbo nihil vltra subueniens, contristatur duntaxat. hæc verò est medici magna infelicitas.

## DE ANGINA, cap. VII.

ANGINA peracutus affectus est. spiritus enim cōpressio est. Duæ verò eius species sunt. aut enim instrumentorum spirandi phlegmone est, aut solius spiritus in seipso causam habentis affectus. Instrumentorum quidem, tonsillarum, epiglottidis, faucium, columellæ, summæ arteriæ: quod si depascitur, phlegmone, etiam linguæ, & maxillarum interius: cū ob phlegmones excellētem magnitudinem, linguam extra dentes proferunt. oris enim cauernam implet, & ipsius quod abundat, extra dentes exeritur. hoc malum synanche Græce,



DE ACUTIS LIB. I. 13

angina Latine, & cynanche, id est canina angina nominatur: aut quoniam huiusmodi animalia assidue hoc malo vexantur, aut quod etiam sana linguam exerere consueverunt. Alteri autem generi contraria eueniunt, instrumentorum collapsio, & singulorum naturę insignis macies, & strangulatio vehemens: ut ipsismet in pectore latetioribusque partibus circum cor atque pulmones abditae esse inflammatio videatur. anginam hanc appellamus, quasi interius vrgentem atque angentem. Ego verò existimo ipsius solius spiritus id vitium esse, praua conuersione ad calidissimum sic cissimumque conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante. Id autem mirandum non est. nam in Charoneis strangulatus citra vllum corporis affectum acutissimi contingunt. immò vel vnica inspiratione prius quàm corpus aliquod maleficio contrahat, homines moriuntur. quinetiam & à rabido cane, qui in faciem, dum spiritus adducitur, tantummodo inspirauerit, & nullo pacto momorderit, in rabiem ho-



mo agitur. Talem igitur respirationis mutationem interius fieri, haud est ex his quæ fieri nequeant: quandoquidem & alia infinita eorum quæ in homine sunt, eandem speciem cum exterioribus causis obtinēt. succi perdentes intra corpus sunt & exterius. morbi quoque medicamentis perniciosus assimiles: & à medicamentis talia vomunt, qualia ob febres vomere solent. Quocirca neque à ratione alienum est, in pestilentia quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Piræei à Peloponensibus venena fuisse coniecta. homines enim pestilentis morbi cum letalibus medicamentis similitudinem ignorabant.

Adest fanè canis angina laborantibus, tonsillarum, faucium, totius oris inflammatio: lingua extra dentes & labia prominēs: salivæ effunditur: pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patētes, valdè rubent: potus in nares refunditur: dolores acerbissimi sunt, sed strangulatione vexati eos obscurius sentiūt: pectus & cor ardent: frigidi aeris desiderium adest,



DE ACUTIS LIB. I. 14

& admodum exiguum inspirant, eousque donec demum intercluso ad pectus aeris transitu strangulatur. Nempe quibusdam cum pulmone vitium facile communicatur: hi vero permutatione moriuntur. febres ignavae oriuntur, molles, nihil proficientes. At si alicui in bonum res vertitur, abscessus secundum aurem hinc atque inde exterius aut interius in tonsillis fit. Quod si cum torpore non admodum tarde fiat, evadit quidem, sed cum dolore atque discrimine: si autem morbo in abscessum mutato, tumor maior subest in acutum abscessu insurgente, repetit strangulatur. Haec sunt plane caninae anginae species. Angina autem collapsio, gracilitas, pallor comitatur, oculi caui, interi<sup>o</sup> demersi, fauces & gurgulio retracti tonsillae multo magis subsidetes, vocisque privatio. Huiusce speciei strangulatus longe quam prioris, violentior: quippe cum in pectore malum sit, ubi spirandi initium ponitur, eodem die moriuntur, qui celerime: nonnunquam & ante quam medicum accersiverint: nonnulli & accersito medico nihil profecerunt. mortuus



est enim arger ante quàm medicus ar-  
te vteretur. Quod autem in melius ver-  
titur, inflammat omnia, quęcunque ex-  
trorsum phlegmone impulerit: quare  
ex synanche, id est angina, fit cynache,  
id est canis angina. Bonum quoque est,  
si in pectore magnum œdema oriatur,  
aut insigne erysipelas. Egregius vero  
medicus, aut cucurbitula in pectus ma-  
lum detrahit, aut sinapim ossibus pe-  
ctoris, aut partibus iuxta maxillas im-  
ponens extrinsecus vlcerat difflatio-  
nemque molitur. Quibusdam sanè bre-  
ui tempore vitium his auxiliis exterius  
tractum fuit: absolutum verò, subito re-  
currit, & ad interiora reuersum est.

Causę vtique infinitę sunt, refrigera-  
tiones magis, exustiones minus, plagę,  
ab ossibus pisciũ penetrationes in ton-  
sillas, frigida potus, ebrietates, faturita-  
tes, & mala à respiratione prodeuntia.

## DE AFFECTIBVS COLV-

mellę, cap. VIII.

CORPUS solidum ex palato pendens,  
inter tonsillas positum, columna &  
gurgulio



DE ACVTIS LIB. I. 17

gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomen est. Columella natura neruus est, sed humidus. nam in humido loco situs est. Iste itaque gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim plegmone crassescit, æqualisque à basi vsque ad extremum terminum efficitur in longum protentus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & increfcit, liuet, atque subnigricat, vua huiusmodi affectus cognominatur: omnia enim vuae similia sunt, & figura, & color, & magnitudo. Tertius affectus est membranarum ab vtraque parte iacentium, quæ veluti squammæ latæ, aut vespertilionum alæ conspiciuntur. id genus morbi lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem & oblongam membranam columella definat, veluti vrinaculum in extremis habens, craspedon Græci hunc affectum nominant, quod montis radicem vel pedem significat: Latino caremus vocabulo. Prouenit au-

B



tem & id ex fluore, quemadmodum & alia vitia: fit verò & per abscissionem obliquè factam ab vno tantum latere membranam relinquente medico. sin autem bicornis columella reddatur, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, nomen quidem nullum obtinuit, verum affectus ipse perspicuus est. omnia verò hæc facillè fuerit introspicientè dignoscere. Omnibus ipsis strangulatus accidit, & ægrè cibū potumque deuorant. tussis quoque omnibus adest, sed præcipuè loro vexatis, & craspedo. quædam enim arteriæ titillatio à membranis oritur: nonnunquam verò & aliquid humoris in arteriam clanculum instillatur, ynde ad tussim prouocantur. Vuam autem & columnā maior spiritus difficultas sequitur, & magis impedita deuoratio. in his enim humor in nares repellitur, quoniam tonsillæ vna malè habent. Senibus columna accidere consuevit: iuuenibus autem ac viris, vna. siquidem hi sanguine repleti sunt, & inflammationi magis obnoxij. pubescētes & pue-



## DE ACVTIS LIB. I. 19

ros membranarum vitia saepius instant. Secari autē omnia citra noxam queunt: sed in vna adhuc rubentibus locis sanguinis effluuium, & dolores, & phlegmones incrementū superueniūt.

## DE TONSILLARVM Vlceribus, cap. ix.

Vlcera in tonsillis fiunt, aliqua familiaria, mitia, non ledentia: aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non altè descendunt, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pingua, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia. Id genus vlcera aphthæ nuncupantur. Quod si cōcreta illa sordes altius descēderit, affectus ille eschara est, atq; ita Græcè vocatur, Latinè crusta. Crustā vero circūueniūt rubor excellēs, & inflāmatio, & venarū dolor, quemadmodum in carbunculo, & exiguae raræque pustulae, quas Græci exanthemata vocant, orientes, hisque aliæ superueniētes in vnum



coalescunt, atque inde latum vlcus efficitur. Id si interius in os depascendo serpit, ad columellam vsque peruenit, ipsamque exedit, & linguā etiam occupat, & gingiuas, & fræna, id est dentium alueolos: dentesque inde labefactantur & denigrescunt. In collum etiam phlegmone erūpit. atque isti haud ita multis diebus post phlegmone, febribus, foetore inediaque cōsumpti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangulat. pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatem, neque vlcera, neque saniosos humores sustinent: sed tussis spirandique difficultas enascitur. Causa maleficij tonsillarum est, frigidorum, asperorum, calidorum, acidorum, adstringentiumque deuoratio. quandoquidem hae partes pectori ad vocem spiritumque edendum inseruiunt: & ventri, ad alimentij transmissionem: & gulæ, ad eiusdem deuorationem obsequio sunt. Internis verò partibus si quod contingat incommodum, ventri videlicet, gulæ, & pectori, ad isthmum, & tonsillas, & lo-



ca ibi posita mali consensus & eructationes perueniunt. Quapropter pueri usque ad pubertatem maximè hoc morbo tentatur. præcipuè nanque pueri multum frigidumque aerem inspirant. quoniam in his plurimum caloris inest, & ad cibos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, & excandescunt ac ludentes altiùs vociferantur. Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempora hæc vitia visitata sunt. Regio Aegypti horum affectuum planè fecunda est. aer enim spirando ficcus adducitur: varios præterea cibos suggerit. radices enim, herbae, atque olera ibi largè proueniunt, & acris semina, & potio crassa, utpotè Nili aqua. sibi vero Aegyptij ex ordeo, & ex flocibus seu vinaceis potiones acres conficiunt. Syria quoque, maximè illa, quæ coele, id est caua nominatur, huiusmodi morbos procreat. unde Aegyptia & Syriaca vlcera id genus appellant. Modus vero mortis quæ miserimus accidit. dolor quidem acer, & calidus, qualis in carbunculo, spiritus vi-



tiatus. exhalant enim maximæ putredinis odorem, eundemque vehementer in pectus spirando adducunt. Immundi adeo sunt, ut neque suum ipsorum odorem ferre queant. Pallida his seu livida facies, febres acutæ, fitis, ut igne accensi videantur: potum, veriti dolores, non admittunt. tristantur enim, cum tonsillæ comprimuntur, aut potus in nares resilit. cumque decubunt, surgunt ut sedeant, decubitus non ferentes. quod si sedent, quiete carentes, iterum decumbere coguntur. plerunque autem recti stantes obambulant, nam quiescere nequeunt: solitudinem fugiunt, dolorem tollere dolore tentantes. Inspiratio magna est. frigidum enim aerem ad refrigerationem desiderant: expiratio verò parva. nam veluti igne exusta ulcera cum sint, à calido præterea spiritu inceduntur. raucitas adest: vox nihil significat. atque hæc in peius ruunt, cum subito in terram collapsis anima deficit.



DE ACUTIS LIB. I. 23  
DE PLEVRITIDE,  
id est morbo lateris, cap. x.

**S**ub costis, dorso, & internis pectoris  
ad iugula vsq; tenuis membrana ro-  
bustaq; ossibus inhærens substrata est,  
cui nomen succingens inditum est. In  
hac cum phlegmone suborta fuerit,  
ignis adest cum tussi & sputis variis.  
pleuritis morbus iste à Græcis appella-  
tur. Opus est autem omnia hæc inter se  
cōsonare atque conspirare, ab vna cau-  
sa pendentia. quotquot enim ex his  
sparsim alia ab alia causa proueniunt,  
etsi omnia simul ingruunt, pleuritis nō  
vocatur. Hunc affectum comitatur  
dolor acutus ad iugula ascendēs, ignis  
acer: decubitus in latus inflammatum  
facilis est. in sua enim ipsius sede collo-  
catur: in oppositam vero partem decu-  
bitus dolorem cōcitāt. à pondere enim  
& phlegmone, & suspensione in omnes  
membranæ continuas partes ad hume-  
ros vsque & iugula: quibusdam vero &  
in terga, & in dorsi scapulas dolor pro-  
tenditur. pleuritida veteres Græci ap-

B 4



pellarunt, Latini morbum lateris, vel  
costarum. Eam vero sequitur diffici-  
lis spiritus, vigilia, ciborum fastidium,  
malarū rubor hilaris, tussis arida, spu-  
ta ægrè exeuntia, pituitosa, aut biliosa,  
aut abundè cruenta, aut subflaua: & hæc  
ordinē non seruantia, sed aliās alia ad-  
uenientia ac recedentia. ex omnibus  
verò peius est, si cruentum sputū desit.  
Delirant autem, & nonnunquam co-  
mate occupantur, atque in soporē gra-  
uem inclinantes, mentis alienationem  
patiuntur. Itaque si in malum vertatur  
morbus, omnibus in peius vergētibus,  
intrā septimam isti in syncopam lapsi  
consumuntur: at si in secunda heb-  
domada educi sputa incipiant, & mala  
augescant, decimoquarto die pereunt.  
Nonnunquam sanè intra huius tempo-  
ris spatium, omniū in pulmonē transi-  
tus est. trahit enim in seipsum pulmo ra-  
rus, & calidus, & ad proxima trahenda  
sefe commouēs: tūcque morbi trans-  
positione repente homo strangulatur.  
Cæterum si diem hunc agrotus transie-  
rit, atque intra vicesimum non moria-



DE ACUTIS LIB. I. 19

tur, in empycum, hoc est pectore suppuratum euadit. Hæc profectò, si morbus ad perniciem tēdat, eueniunt. At si in melius vergat, sanguinis ē naribus larga profusio cū impetu succedit: tūc que repente morbus discutitur. quandoquidem & somnus oritur, & pituitæ reiectio aduenit, postea biliosorum tenuium, deinde multo tenuiorū, rursus verò cruentorum, crassorum, carnis formam referentium. Quòd si post cruenta iterum exeat bilis, post ipsam pituita, secuta est hæc in pristinum restitutio. Hæc si tertio die incipiunt, & facile extusciunt, læuia, æqualia, humida, rotūda, septimo die liberantur, quando & venter biliosa exturbat, spiratio conquiescit, mens ad se redit, febres decrescunt, ciborum appetentes sunt. Si secunda verò hebdomada hæc inchoantur, decimoquarto die sanantur: sin minus in empyema, hoc est pectoris suppurationem morbus vertitur. Id verò rigores indicāt, dolorésque punctorij. sedere cupiunt, spiritus deterius ducitur, tūc metus maior est, ne pulmo pus



multum subito attrahens hominē suffocet, qui prima & maiora mala euaserat. Verum enim verò si inter costas morbus irreperit, easque disiunxerit, & phlegmones fastigiū extrorsum deprompserit, aut versus intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni tempora hyems maxime huius morbi ferax est: secundò autumnus: ver minus, nisi interdum frigidum sit: estas verò minimè. Quātum ad ætates attinet, in primis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæpius quā alij liberantur. neque enim magna phlegmone in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est: quippe qui est in senectā quā in alia ætate frigidior, quādo & spiratio parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autē & viri haud ita frequenter in hūc morbum incidunt: verum neque admodum frequenter euadunt. nam neque ab exigua causa, neque ob exiguam phlegmonem ægrotant. in magnis autem maius inest periculum. Et pueri minimè pleuritide



DE ACVTIS LIB. I. 27

corripiuntur, minúsq; ab ea periclitantur. quandoquidem puerilia corpora rara, humida, fluxáque sunt, ac multa est in eis difflatio atq; digestio: quocirca neque magna contrahitur phlegmone. ea est huius ætatis in hoc morbo felicitas.

ARETÆI CAP  
padocis medici

DE CAVSIS ET SIGNIS  
acutorum morborum, Liber secúndus,

IYNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

Hæc insunt in secundo libro.

De pulmonaria,	cap. I.
De sanguinis reiectione,	cap. II.
De syncopa,	cap. III.
De ardoribus,	cap. IIII.
De cholera,	cap. V.
De voluulo,	cap. VI.
De iecinoris acutis morbis,	cap. VII.
De caux venę acuto morbo,	cap. VIII.



De renum acutis affectibus, cap. I X.

De vesicae acutis affectibus, cap. X.

De uteri strangulatu, cap. X I.

De satyriasi, cap. X II.

## DE PULMONARIA, cap. I.



B duo potissimū viuunt animalia, escam videlicet & spiritū. ex his multo magis vitæ cōducit spiratio. hanc enim si quispiam supprimat, non diu feret incolumis, sed protinus interibit. Huius instrumenta multa parata sunt. initium sunt nares: via est arteria: locus cōtinens, pulmo: pectus autem pulmonis est vallum & conceptaculum. Verum cætera vt instrumenta solū animali subseruiunt, pulmo verò attrahendi causam in se continet. Nanque in ipso medio calidū viscus sedet, cor, vitæ spirādique principium. id pulmoni quoque attrahendi frigidi aeris cupiditatem iniicit. siquidē ipsum incendit, verū cor est quod attrahit. In pri



mis igitur si cor affectū est, nō diuturna est mortis dilatio: si pulmo male habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitam agit, mors tardissime aduenit; si quis medelam adhibet. Si vitium insigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, vocis spiritusque sublatio: subitanea perniciēs imminet. Hæc est ægrotudo ea, quā Græci peripneumoniam, Latini pulmoniam dicunt, vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur, quippe qui naturaliter dolore immunis sit, ob corporis raritatē, lanis assimilis. asperæ arteriæ in ipso insertæ sunt, cartilaginosa, & ipsæ dolorem non sentientes. Musculorum pulmo expers est: nervos habet exiguos, graciles, ad motum ciendum opportunos. his de causis pulmo dolorem non percipit. At si quæpiam ex membranis eum ambientibus & ad pectus deligantibus inflammatur, adest tunc & dolor, spiritus est deprauatus, calidus: sedere volunt laborantes: ad spiritum du



cendum, corpus rectum statuitur: ad id enim hic est situs aptissimus. rubescit facies, sed malæ præcipue: oculorū album nitidissimum ac pingue est: summæ nares finæ sunt, venæ temporum vel etiam colli elatæ apparent: cibos auersantur, arteriarū pulsatus initio magnos habent, inanes, creberrimos perinde ac si festinare coacti sint. calor in exterioribus membris modicus humectusque est: in interioribus, ingens, aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, lingue siccitas, frigidi aeris aueritas: mētis ambiguitas superuenit: tussis adeſt plerūque sicca. sin aliquod sputum mouet, id vel spumans pituita est, aut aliquid exquisitè biliosum, aut cruentum floreo colore valde perfusum. id vero cruentū aliis perniciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, vigilæ auſcunt, somn<sup>o</sup> paucus, torpidus, haud abſimilis ſopori, qui à Græcis coma nominatur. cogitationes vanæ insurgunt, mens alienatur, non admodum ecstasi corripiuntur: præſentia mala ignorant. nam eos si de morbo interroges, nihil



periculi instare respondent. eorum al-  
 gent extrema: liuescunt vngues cur-  
 uanturque. motus arteriarum parui fre-  
 quentissimiq; sunt & deficientes: quan-  
 do ipsis proxima mors est. nam septimo  
 die plerūque moriuntur. Porro si non-  
 nunquam morbus subsistit, & aliquan-  
 tulum in melius vergit, vehemens de  
 naribus sanguinis eruptio conspicitur:  
 aut per aluum cum perturbatione mul-  
 torum biliosorum & spumantium suc-  
 corum deiectio. qui ex pulmone in fa-  
 crum ventrem depulsi fuisse videri pos-  
 sunt, si multi liquidiores & facile dei-  
 ciuntur. nonnunquam verò & per vri-  
 narias semitas euocantur. Cæterū qui-  
 buscunque hæc simul eueniunt, hi quā-  
 primum ægritudine subleuantur. qui-  
 dam vtique sunt, quibus magna vis pu-  
 ris in pulmone procreatur: aut ex pleu-  
 ritide fit permutatio, si maius bonum  
 suboritur. Quod si ad intestina aut ve-  
 ficam ex lateris morbo sanies deriuata  
 fit, tunc quidem continuè pulmonis vo-  
 mica liberantur: sed diuturnum vlcus,  
 quod demū sanescet, in latere patien-



tur. quibus vero in pulmonem plus irrumpit, nonnulli ob subitanam & copiosam effusionē, & reiiciendi infirmitatem suffocantur. At quicumque suffocationis periculū ex tumoris eruptione subterfugiunt, hi longo tēpore pulmonis vlcere cruciantur, & in phthisi prolabantur. Verum ex abscessu & phthisi pauci admodū senes liberantur, sicut neque à pulmonia iuvenes & florentem ætatem agentes.

DE SANGVINIS EXITU  
ab ore, cap. I I.

Sanguis ab ore duobus modis emit-  
titur, primo, ex ipso ore, capite, & va-  
sculis quæ ibi sunt. via est palatum &  
fauces, vbi est gulæ & arteriæ princi-  
pium. screantes vero & cum parua tus-  
si, vel etiam citatiore in os sanguinem  
eructant. Nam cum ab ore fertur, ne-  
que screatu opus est, tum expuere di-  
citur: cū vero paucissimus & gutta-  
tim sanguis exit, aut etiam si copiosus  
de capite, vel ab ore eruperit, nondum  
reiectio



reiectio est appellanda, sed idem vel sputum, vel sanguinis eruptio, Græce hæmorrhagia dicitur: si ab inferioribus ascendat à pectore visceribusque ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, locisque spinæ finitimis, huiusmodi nō sputum, sed reiectio Latine, Græcè anagoge vocitatur, ascensionis ac viæ per quam fertur, nomen habens. Signa verò vtriusque communia, exigua & pauca sunt, quātum & locus permittit, in quem reiectio & sputum cōueniunt: singulorum autem propria, magna & multa, & periculosa sunt, quibus vtrunque effusionis sanguinis speciem internosse leue est. Igitur si à capite sanguis decurrit, vbi multus est, plura maioraque aderunt: pauca minoraque, vbi raro pauciusque expuitur. caput graue est, dolet: sonant aures, facies rubet, venæ distentæ sunt, vertigo infestat. Et ante hæc causa euident fuit, percussus, frigora, calores ingētes, vinum largius epotum. quippe id subito ac valde caput implet, repentēque multum sanguinis effracta vena profundit: modica

C



ebrietas rarefacta vena sanguineum  
 sputum mouet. Interdum per nares san-  
 guinis consuetum profluuium sistitur:  
 ad palatum verò conuersum, reiectionis  
 imaginem præbet. Igitur si de capi-  
 te profluit, titillatio in palato gignitur:  
 creber screatus fit: post quē sputum e-  
 rumpit: inde irascuntur, tussique ma-  
 gnopere agitatur. Si ex palato in arte-  
 riam defluit, tum per tussim sanguinem  
 extrudunt: idque multos falsos habuit  
 ex profundis visceribus reiectionē fieri  
 suspicantes. Nonnunquam & ex capite  
 decurrit in gulam, sicque cum nausea  
 euomitur: falsoque multis ita persuasit,  
 vt ex gula ferri sanguinem crederent.  
 Qui expuitur sanguis, haud ita crassus  
 est, colore ater, leuis, æquabilis, alienæ  
 materiæ non permixtus (screantibus  
 enim confestim in linguā cadit) rotū-  
 dus, auulsioni que obediens. Tu vero si  
 palatū etiam introspecies, id sordidum,  
 vlcerosum, & sæpius cruentum videbis.  
 Huic simplex curatio breuisque suffe-  
 cerit, adstringentia videlicet medica-  
 menta palato adhibita, & ea frigida. si-



DE ACVTIS LIB. II. 35

quidem calefacientia, & quæ rara faciunt corpora, & quæ dilatant, fluxum maiorem citant: eaque sit à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque, vel per venæ sectionem, vel per nares, vel per aliam difflationem euacuandum est. & hæc mature facienda sunt. nã si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursui exercitatio, eiusque loci membra suscipiendo sanguini assuescent. vlceratur autem & arteria: vnde tussis, non scretus exoritur: atque inde fit corruptionis initium. Si verò à pectore inferioribusque visceribus sanguis effluerit, reiectio Latine, Græcè anagoge nūcupatur. Vtique valde mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manauerit, aut à concaua cordis vena, sanguinem ab iecore illi suggerente, aut à magna arteria secundum dorsi spinam discurrente. nam erumpente sanguine, perinde ac si iuguletur homo ac stranguletur, mors instat celerrima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito in-



tereunt: verū tamen in suppuratione pē-  
toris, Grece empyema dicitur, & in  
phthisin incidunt. minus periculi ab a-  
spera arteria portēditur. Si gula aut vē-  
trculus sanguinem vomunt, non ita  
terribile est: & si valde copiosi sangui-  
nis vomitus est, neque lōga curatio est,  
neque varia. Si à iecore aut liene pro-  
deat, non facile id fit, neque continen-  
ter. nanque in ventriculum & intesti-  
na expeditius hæc viscera sanguinem  
propellūt: haud ita tamen, quin creden-  
dum sit, hæc eadem ad superiora, vide-  
delicet pulmonē & arteriam posse re-  
trudere. Siquidem in febribus à liene  
& iecinore per narem illam sanguis e-  
rūpit, quæ è regione patienti visceri op-  
ponitur. Locos, vnde fit exitus, iam re-  
cenfuimus: eorūque periculi vel mor-  
tis discrimina. Effusionis autē san-  
guinis tres sunt modi, vel rupta vena  
aliqua, vel exesa, vel rarefacta. Rumpi-  
tur quidem repente vel ictu, vel feren-  
do onere, aut tollendo, vel ab edito lo-  
co desiliendo, vel clamore, vel magna  
excandescencia, aliave id genus causa.



cum subito in arteriam copiosus sanguis effunditur. Si ab erosa parte, hominem interrogare opus est, num prius tussierit, difficulter spirauerit, nausea vomitusve antea infestauerit. in his enim diuturnis affectibus copiosa & acri fluxione perfenerate vascula exeduntur. Vbi igitur detrita & attenuata, ad extremum consumpta fuerint ambientes membranulae, hac atque illac sanguine perfluunt. A rarefactio citra rupturam est: proinde non subitanea, neque cum multi, aut crassi sanguinis exitu. nam cum rarescunt venarum corpora, tenuis pars excernitur. Quod si multus in aliquo inani spacio sanguis collectus rursus emittitur, crassior se ipso redditur: non tamen multo crassior neque ater, quale concrementum aut grummus est: sed copiosior, ut potest qui vnum in locum prius confluxerit. Id genus autem repentini exitus plerumque foeminis, quibus menstrua non respondent, euenire solet, idque singulis mensibus euenit, iisdemque menstruae purgationis circuitibus apparet,



necnon iisdem statis cessationis diebus  
supprimitur. ac nisi mulieri laboranti  
succurratur, per multos circuitus san-  
guinis emissio reuertetur. Nempe qui-  
busdam vasa rupta sunt, sed multitudi-  
ne reiectio euariat. Et ab arteria, an à  
vena feratur, interest. quoniam ater est  
sanguis, crassus, & facilè spissescens, qui  
à vena mittitur: præterea minus discrimi-  
nis affert, celeriusque compescitur.  
Ab arteria, flauus tenuisque prolabitur,  
haud ita cogitur, citius hominem peri-  
mit, & maiori negotio supprimitur. nã  
arteriæ agitatio, sanguinis fluorem mo-  
uet, vulnusque frequenti concussione  
dehiscit. Erosionis autem curatio ma-  
gnam diligentiam postulat, cùm sit lon-  
ga, difficilis, & periculosa. Etenim par-  
te membri deficiente, ad solidationem  
vltus non ducitur. vltus enim, nõ vul-  
nus efficitur. Rupturæ verò facilior so-  
lidatio, quia vulneris orẽ se cõtingunt:  
& hæc secũdo periculi ordine consistit.  
Minimus in rarefactione, metus subest.  
spõte enim sanguis cõquiescit, & adstri-  
ctio refrigeratioque in medendo satis



est. Cæterum & sedes vnde sanguis proficiscitur, obseruandę sunt. siquidena multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioque diuersa. A gula igitur haud ita sæpe per rarefactionē solet sanguis effluere, cum ob cibos potionēsque refrigeratio & adstrictio eius partes cōdeset. Quinetiam rosiones haud frequenter fiunt, ac minùs quàm rarefactio, gulam infestant. quippe fluxiones erodentes non multum temporis in ea subsistunt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. Frequentius gulæ incidit ruptio: itaque si interdum rupta est, non tam magnæ, sicuti à pectore, sanguinis profusiones fiunt. in causa est venularum quæ ibi sunt, arteriarumque tenuitas. sanguis verò exiens non magnopere nigricat, subflauus est, non exactè læuorem habet, aut salinæ permixtus est. cū nausea & vomitu reiicitur. leuis tussicula citatur, modò humidum quippiam mouēs, modò arida. id euenit, quoniam gulæ affectum arteria quoque participat, secundum illam extenta & adhærescens.



morsus vel adstrictio vlceris inter deuorandum percipitur: idque praesertim, si bene frigida, aut calida, aut acerba sint quae deglutias. nonnullos autem & gulę ipsius dolor inuadit, ad interscapulum usque interdum pertinens. vomunt pituitosa. nonnunquam si morbus producit & inualescit, cibum reiiciunt, cibos summopere fastidiunt. febres haud ita multum continuę, sed erraticę sunt. E ventriculo niger concretusque sanguis euomitur, etiam si ab arteria fluxerit: si a vena, multo nigrior, compactiorque est. nausea multa adest: pituitosus, biliosusque vomitus: si prius homo comedit, cum cibus mixtus sanguis eiicitur. in eodem enim loco cibus sanguisque colligitur. ructus crebri fiunt, & virus olentes. Quod si multa materia collecta est, angor animi vertigoque sequitur: cum materiam vomuerunt, subleuantur. resoluuntur tamen, penitus exstuant, assidueque dolet ventriculus. Ab aspera autem arteria paucus sanguis, vehementer flauus, per tussimque expellitur: qui nisi expellitur, continens



tussis inhæret. sensus verò & dolor in gutture est, paulum suprâ aut infrâ. vox rauca & obscura fit. Si à pulmone, repê-  
tè vberiorq; sanguis emanat, idque ma-  
gis, si erosio in causa fit, tussis permole-  
sta est: sanguis verò exacte flauus, spu-  
mans, rotundus sic vt pars eiecta à par-  
te distincta fit. Cæterum & in commu-  
ni vase corruptio eorum quæ de pecto-  
re exeunt, alia est: cõparatione autem,  
permixta discernas: alioqui pectoris  
partes specie carnosas pulmonis esse  
partes censueris. verùm pectoris graui-  
tas, indolentia, ruborque in facie mul-  
tò magis in pulmonis vitio reperitur.  
Si in pectore noxa sit, in parte priori se-  
cundum os pectorale quod vocant, do-  
lor laceratam partem ostendit. ingens  
tussis adest, vix aliquid extrudens: san-  
guis nō multum flauus est, modicè cras-  
sus spuma carēs. Quòd si & pulmoni in  
transitu noxâ impertiat, aliquid etiam  
spumæ consequitur. quandoquidem ex  
pectore in arteriam per pulmonem iter  
datur. Si à membrana costas vestiente,  
per tussim quidē sanguis funditur: sed



niger, lævis, tetri odoris virosique, qualis ex putridis rebus exhalat. dolor fuc-  
cipientis membranae acutus vexat. multi  
ex his cum febre, ut pleuritici solent, in-  
tereunt. Tempus anni humidum cali-  
dumque sanguinis emissionem maxi-  
me procreat. tale est humidum & cali-  
dum ver: secundo loco æstas, autumnus  
minus, hyems minimè. Aestate maxi-  
mè moriuntur ob sanguinis effluuium:  
quo tempore haud ita magnæ phlegmo-  
næ oriuntur: vere secundo phlegmo-  
nis & vrentibus febribus consumuntur:  
autumno plurimum tabes, quas Græ-  
ci phthoas dicunt, eueniunt. Ut semel  
autem dictum sit, omnem sanguinis re-  
iectionem, quantumvis modicam, quanvis  
iam rupta vasa coierint, comitatur mœ-  
ror, diffidètia, vitæ desperatio. quis enim  
est adeo firmo & constanti animo, qui  
se iugulationi simile quiddam passum  
esse conspiciens, non futuram mortem  
vereatur & perhorrescat? graviora nan-  
que animalia & robustiora, quales tau-  
ri sunt, sanguinis profusione celerrimè  
perduntur. Verum hoc haud magnope-



DE ACVTIS LIB. II. 43

re mirandum est: illud summa admiratione dignum, quòd in sola ex pulmone reiectione, quæ omnium sæuissima est, homines animum non despondent, cùm tamen in extremo discrimine versentur. Pulmonis indolentiam huiusce rei causam ego statuo. quilibet enim dolor, quanuis exiguus, interitus metum iniicit, & plerumque terribior est quàm periculosior: contrà indolentia in plurimis vel magnis morbis à morte securitatem præstat, damnosiorque est quàm terribior.

DE SYNCOPA, cap. III.

**R**ECTè planè medicus & vulgus, rectè, inquam, huic affectui nomè indiderunt. OCyphon, cuius mali est nomen? Ecquid enim maius, ecquid celerius syncopæ facultate? ecquidnam aliud nomen ad hanc rem appellandam significantius? quid verò corde ad mortem vitamve potentius? Neque syncopam cordis ægritudinè esse, aut vitalis in eo potestatis detrimentum, non cre



dendum est. tanta est mortis celeritas, & talis morbi species. Quippe is affectus vinculorum potestatis vitam fouentis dissolutio est, hominis constitutioni aduersarius. hanc enim tenaciter corripuens nō dimittit, sed dissoluit ac dissipat. Neque id magnum est miraculum. nam & alij affectus quorundam membrorum quibus inhærescunt, indēque accenduntur, proprij sunt & periculosi. Inguinū quidem tumores pestiferi & permaligni (bubonas Græci nuncupāt) iecoris foboles sunt, nullāque alia ex parte prodeunt. Tetanus autem neruorum labes est: comitialis morbus caput obsidet. Pari igitur ratione & syncopa cordis & vitę ægritudo est. Quicunque verò stomachi affectum syncopam esse opinantur, quoniam cibus vinóque, in nonnullis & frigida vires resectæ sunt, & ægritudo sublata, iidem mihi videntur capillorū capitis, & cutis affectum esse phrenitin suspicari: quoniam capillorum detensione & cutis irrigatione phrenitici releuantur. Verum cordi stomachus vi-



DE ACVTIS LIB. II. 45

cinus perniciosus est: vnde in cor tam noxia quàm vtilia deriuantur. Etenim per pulmonem etiam, vt spiret, acrem cor accersit: veruntamen pulmo haud ex æquo spirandi facultatis particeps est: cū facultates non in instrumentis, sed vbi est vitæ fons atque roboris, statuuntur. At stomachus, vitæ neq; principium neque sedes est: aliquis tamen ab eius imbecillitate lædi potest. Nam & cibicordi nocētes nō stomacho offi- ciunt, sed cordi per eum noxam infligunt. Siquidē & ab illis morientes cordis affecti notas representant, arteriarū motus paruos debilesque, cordis concussionem cum vehementi palpitatione, vertiginem, animi deliquium, torporē membrorū, resolutionēque, copiosum sudorē, qui supprimi nequeat, refrigerationem in toto corpore, sensus vocisque priuationem. dicendumne est hæc stomachum perpeti? Sed quænam ei propria? Nausea, vomitus, cibi fastidium, singultus, eructatio simplex, vel acida. Illi præterea, quibus cor laborat, sensus aciem exquisitiorem ha-



bent, vt videant, vt exaudiāt plus quā  
antea. mente etiam sunt firmiore, & a-  
nimo puriore. proinde non tantū prae-  
sentia declarant, verum etiam futura  
verissima diuinatione prēdicūt. Nūm-  
ne igitur & hae stomachi potestates  
sunt? Hercule minime, sed cordis, vbi &  
anima & ei<sup>9</sup> natura inhabitat, ad quod  
& virtutum ibi sitarum calamitas per-  
tinet. Huius verò morbi est tenoris na-  
turae destructio, auctore frigido humi-  
doque. quippe hoc oppressi intus & in-  
cute refrigescunt, non sitiunt: frigidum  
spirant, quanuis magnis ac perurenti-  
bus febribus, vnde ipsa syncopa depen-  
det, affligantur. Natura enim robusta  
& probe temperata omnia superat, o-  
mnibus dominatur, ac per humore &  
spiritum & solida, horūque omnium  
cōuenientem ordinem & modum ho-  
minis vitā administrat. Quod si natu-  
rae nexus, id est tenor, dissolutus sit, tūc  
affectus oritur, cuius prēgrediens cau-  
sa est comburēs febris, quae Græcè cau-  
sus dicitur. ea verò huiusmodi est.



**I**Gnis passim & acer & tenuis est: sed  
intus maxime. Spiritus tanquam ab  
igne, calidus: aeris vehemens attractio,  
frigidi cupiditas, lingua arida, in labiis  
& cute squallor, algēt extrema, lotium  
quàm biliosissimū, insomnietas, arte-  
riarum motus crebri, parui, imbecilli:  
oculi puri, lucētes, subrubri: facies bene  
colorata: si morbus vltorius crescit, om-  
nia maiora & seuiora fiūt. arteriæ mi-  
nimis motibus & creberrimis agitan-  
tur. ignis aridissimus & acerrimus.  
mens delirat, omnia ignorat, siticulosi  
fiunt. omnia frigida attrectare cupiūt,  
parietem, vestem pauimentum, humo-  
rem. manus frigēt, sed palmæ perquàm  
calidæ: vngues liuent, spiratio crebra  
est, roscidus humor circa frontem & iu-  
gula. Cū ad summam ariditatem ca-  
lorēque corporis natura peruenerit,  
tum calidum in frigidum, squallor in  
imbrem conuertitur. Rerum nāque ad  
maximam molem incrementa in con-



trarium statum prolabuntur. Vbi ergo naturę nexus soluti fuerint, ea syncopa est. tunc sudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto cōpescitur. Spiratio frigida est. vapor è naribus multus exhalat. Siti non vexatur. cætera enim exaruerunt. quinetiam alia instrumenta sitiunt, os & gula. vrina tenuis & aquea redditur. Alius plurimum adstricta est: nonnūquam tamen pauca quædam biliosa descendūt. copiosa & aliena humiditas redundat. ossa quoque tabescentia diffluunt: & vndique, vt in flumine, ad exteriora omnia dilabuntur. animus stabilis & cōstās est: sensus omnis purus & integer, subtile ingenium, mens vaticinando idonea. Primū quidem seipso de vita migraturos præsentiant, deinde præsentibus futura denūciant. Nonnulli verò interdum eorum dictis fidem non habendam putant, sed dictorum euentus homines in eorum admirationem concitat. Aliqui præterea ex his cum quibusdam vita defunctis sermonem habent: fortasse quidem ipsi soli præsensu acumine & puritate

eos



DE ACVTIS LIB. II. 49

eos adesse cernentes: aut forte ipsorum animo viros cū quibus versaturi sunt, prænoscere, atque enarrante. Quippe antea in lutulentis humoribus & caligine demersus erat: quos vbi morbus exhaustit, & ab oculis tenebras deterfit, quæ in aere fiunt prædicant, exutoque sordibus animo veracissimi vates efficiuntur. Sed quorum succi & ingenium adeo extenuati sunt, hi non diu admodum solent esse superstites, cū eorum vitalis potentia iam in aerem cesserit atque abierit.

DE CHOLERA, cap. V.

**C**Holera est materiæ à toto corpore in gulam, ventriculum & intestina retro fluens motio, vitiū acutissimū. supra enim per vomitum erumpunt, quæ in ore ventriculi & gula congesta fuerant. infra deiiciuntur humores in ventriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt: quæ anus effundit, stercorea, liquida, tetrūq; odoris sentiuntur. siquidem longa cru-

D



ditas id malum excitauit. Quòd si per clysterem eluantur, primo pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, dolore vacas: postea verò tensiones in ore ventriculi & gula, tormina in ventre nascuntur. Si magis sauiat morbus, & tormina augeantur, anima deficit, membra resoluuntur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumultu nausea & vomit<sup>9</sup> inuadit, tum syncerè flaua bilis expellitur: deiectiones quoque similes sunt: nerui tenduntur, tibiaram brachiorumque musculi conuelluntur, digiti incuruantur: vertigo oboritur, singultiunt: ungues liuent, algent extrema, totum corpus rigore concutitur. Si malū ad vltimum venit, tum verò aegrotus sudore perfunditur: bilis atra supra infraque prorumpit. cōuulsione impedita vesica, lotium cohibetur: quod tamē, cū in intestina humores deriuentur, abundare non potest: voce priuantur, arteriarum pulsus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in syncopa proposuimus. co-



## DE ACVTIS LIB. II. 51

natus ad vomendum perpetui ac inanes fiunt. inclinatio ad deiiciendū prōpta, quam tinesmon Græci vocant. sicca tamen, nihilque succi egerēs. mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum & inanem vomitum. Id genus maxime ætate grassari consuevit: secundò per autumnū, minus vere, hyberno tempore minime. Inter ætates autē iuuentā, & ea quæ robustior est, hoc ferè corripuntur: senectā rarissimè: pueri magis quàm senes, sed non mortiferè.

## DE ILEO GRAECE

vocato, Latine voluulo, cap. VI.

**P**Hlegmone in intestinis gignitur, perniciosum dolorē mouens. quippe innumeri torminibus acerbissimis necantur. In hisce & frigidus flatus & lētus colligitur, nec infra, nec supra facile penetrans. Commeratur autem diu, pērque superiorum intestinorū angustos anfractus reuoluitur. vnde & affectus ilei Græce, Latine voluuli nomen

D 2



accepit. Quod si ad tormina compres-  
sio & remollitio intestinorum accesserit, id vero iam chordapsus est: quod no-  
men vltima parte elixationem remol-  
litioneue significat: chorde autem inte-  
stinorum vocabulū est. lactes enim epi-  
chordida Græci veteres nominarūt, ner-  
uos scilicet interiacentes, & vascula, &  
membranas, quæ intestinorum stabili-  
menta & fulcimina sunt. Voluuli cau-  
sa est, perpetua ciborum multorum, di-  
uersorum, inusitatorūque corruptio,  
& alia super aliam cruditas: præcipue  
ab esu ciborum qui voluulum excitare  
consueuerunt: quale est sæpię attramen-  
tum in ferculis sumptum. idem existi-  
mandum de plaga est, de frigore, de fri-  
gidæ potionē: si, dū quis sudat, eam lar-  
gè abundēque ingurgitauerit. Ad hæc  
his voluulus accidit, quibus intestinum  
cum stercore in scrotum procidit, neq;  
in ventrē repulsum, sed per vim retentū  
fuit: his inferiora intestina phlegmone  
vexari solita sunt. Pueros hic affectus  
crebro male habet: vtpote quos sæpe  
cruditas infestat. hi tamen sæpius etiam



sanescunt, cum ob consuetudinem, tum ob humiditatem intestinorum. lubrica enim sunt. Senes raro afficiuntur, sed multo perniciosius. Aestas magis quam ver huius mali referta est: autumnus quæ hyems: æstas vtrunque superat. Multi quidem vi torminū repente intereunt: aliis intestinū suppurat, deinde nigricans, tunc & putrefactum excidit, atque ita deficiunt. Mediocre[m] voluulū hæc symptomata comitantur, dolor oberans, in stomacho humiditas superans, exolutio, mollitia, ructus inanes, nihil proficientes: aluus flatibus perstreperens, qui ad podicem usque properant, sed ibi exitus intercluditur. Si autem ex toto voluulus occupet, omnia sursum petūt, flatus, pituita, bilis: hæcque vomitu prodeunt. fiunt perpallidi, frigēt toto corpore, acerbo dolore cruciantur, male spirant, sitiunt. Quibus verò iam iam mors instat, gelidus sudor emanat, vrina difficulter exit: anus tam arcte clausus est, ut neque vel tenuem acum possis adigere: sterqus per os redditur, vox aboletur: arteriæ raro inter initia &



parum micant: instante morte minimè,  
creberrimè, tandem micare desinunt.  
Hæc sunt quæ tenuibus intestinis affe-  
ctis incidunt. Verum & in pleniore  
intestino, quod Græci colon vocant,  
iidem affectus oriuntur, eadèmq; sym-  
ptomata eandem formam retinentia.  
Sed nonnulli, quibus colon suppurat,  
huiusce morbi discriminè effugiūt. Cau-  
sa est huiusmodi affectus carnosæ inte-  
stini crassitudo. Dolor autem in graci-  
libus quidem intestinis tenuis est & acu-  
tus: in pleniore verò intestino est re-  
dundans humiditas, & incumbens gra-  
uitas. dolorque modò ad costas vsque  
superiores ascendit, quando & speciem  
lateralis morbi præ se fert, siquidem &  
isti febricitant: modò sub spurias costas  
in dextram aut in læuam partem de-  
scendit sic vt iecur aut lienis dolere vi-  
deantur: item & ilia nonnunquam do-  
lore torquentur. Colon nanque præ-  
grāde est, & quoquo versum se circum-  
uoluens. Quidam sunt etiam quibus &  
in sacro osse dolor inhaerescit, & in fe-  
moribus, & illis in locis quibus testes



DE ACVTIS LIB. II. 55

appenduntur, Græci cremasteras appellant. Qui hoc genere tentantur, vomitione plerunque inani laborant. quòd si quid reiecerint, id est subtile, biliosum, olei simile. In hoc malo periculum tanto leuius est, quanto laxum intestinum tenuibus corpulentius, pinguius, & noxæ tolerantius est.

DE ACVTIS IECORIS  
affectibus, cap. VII.

**Q**Vibus iecur male habet, hi non celerius quàm qui corde ægrotant, sed maiore cruciatu perimuntur. maxima enim iecoris pars sanguinis cõcrementum est. Si in huius autem visceris portis aliqua incidat causa mortifera, æque ac si ex corde laborarent, celeriter cõsumuntur. Ratio in promptu est, quia videlicet hæ partes mēbranis, tonis gracilibus & magni ad vitam momenti, grandioribûsque venis cõtexusuntur. præterea, vt sapientum quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animæ domicilium est. Sanguinis vtique pro-



fluuia è iecore omnium maxima fiunt: neque ab re. venarum enim radicatio iecur est. Itaque in ipso magna vomica haud ita frequenter, neque in particulis magis præcipuis oritur. homo enim vita excedens præuenit. At exiguae frequentius eueniunt. inde fit vt mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti crucientur. Iplius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neque dilatio: atque hinc ad cor & ad viscera infra septum sanguis diffunditur. At si qua magna iniuria, vtputa verbere, longa ciborum multorum, vitiosorumque corruptione, ebrietate, vehementi refrigeratione, phlegmone in portis iecoris excitatur, tunc ægrotus celerrime iugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. venarum motus torpent. Doloris species variae & diuersae sunt. nonnunquam enim dextra in parte defigitur, adeo vt acutum telum adactum esse videatur: interdum torminibus similis est: rursus verò interdum dolor cum summa grauitate con-



DE ACVTIS LIB. II. 57

iungitur: atque inter dolendum virium debilitas vocisque casus incidit: transuersum septum, & interna costarum tunica inferius detrahuntur. quoniam inde iecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad iugulum è regione oppositum vehemens dolor peruenit. Tussicula quædã imperfecta, seu potius tantum ad tussim inclinatio est. si quando verò tussiunt, nihil reddunt. vitiose spirant. neque enim pulmoni transuersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum morem gerens. paulum aeris adducunt, plus expirant. colore ex atro viridique permixto infecti sunt, plumbea scilicet specie. cibos odierunt. quòd si quid sumpserint, eis inflantur præcordia. ructus biliosi, acidi, graue olentes exeunt, nauseant, vomere frustra conantur. venter solutus multa biliosa excernit, viscida pauca: sed perpetuò augescunt mala. mens haud ita multum delirat: torpida, suspensa, & attonita est. magna est in corpore segnities: extrema frigent, tremor adest, horrores, singultus inanis, conuulsioni simi-



lis, morbus regius: pura bilis, totumque corpus bilioso colore suffunditur. Quin morbus regius ante septimum diem si apparuerit, plurimos sustulit. Quibus autem vel sanguinis profusio, vel per aluum multorum biliosorum exturbatio, vel vrina syncera plurima effluens mortem depulit, post tres septimanas iecur his suppurat. Quod si multum temporis citra abscessum praetereat, in hydropem ineuitabilem terminatur. Hi siticulosi sunt, parum tamen bibunt. eorum corpus squallet, pinguedine carens. appetunt acida, sed gustatus sapor non percipit. Autumnus hoc malum fert, multorum variorumque fructuum esum sequente cruditate. Inter aetates florens ei magis obnoxia est.

DE VENAE CONCAVAE  
acuto morbo, cap. VIII.

**A**B iecoris portis inter eius extrema magna vena ingreditur: quae semper in tenues pluresque dum scinditur, denique in tenuissimas visumque laten-



## DE ACUTIS LIB. II. 39

tes toto iecore dispergitur. Istarū sum-  
mis osculis aliæ venarum extremitates  
comittuntur: quæ ex gracilibus & plu-  
ribus maiores amplitudine, sed nume-  
ro pauciores constituuntur. demum in  
medio iecore in venam vnicam gran-  
dem coalescunt. Inde hæc in duas par-  
titur, quæ iecoris extrema petunt. Ha-  
rum altera superius primam fibram pe-  
netrans, in eius cōuexa egreditur: mox  
transuersum septum perforans, in cor  
inferitur. hæc vena concava nomina-  
tur. Altera vero quintam fibram, quæ  
inferius iacet, traiciens vsque in ieco-  
ris gibba ad spinam peruenit: & eo lo-  
co ad coxendices vsque porrigitur. Ea  
quoque eodem nomine concava nun-  
cupatur: quoniam vna & eadem vena  
est ab initio de iecore exoriens. Si quis  
enim aliquid de superiore vena caua  
cordi infixæ in eam quæ iuxta spinam  
protenditur, aut à spina per iecur ad  
cor velit impellere, eundem descensum  
ascensumq; inueniet. Hæc igitur vena,  
vt arbitror, vniuersa egritudines & acu-  
tas & validas patitur. nam tota vna est



atque continua. à nōnullis autem medicis ea pars duntaxat quæ secundum dorsum discurrit, agrotare creditur. quoniam eius quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. intra pectus enim rei nulli adhærens, sed in pectore subleuata protenditur, donec transuersum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc venam corripit, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena cedmata oriūtur, (sunt autem cedmata diuturni affectus ex defluxu materiæ prouenientes) quando sanguis copiosus erumpēs citissime vitam delet: per superiora quidem, per pulmones & arteriam effluens, si in pectore fiet effractio: si iuxta principium, in imū ventrem descendens in intestinis continetur, atque adeo intestina replentur. cū prius quàm deiectus sanguis in conspectū detur, homines intereunt; & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venam phlegmone, quæ & ipsa si magna sit, celeriter hominē tollit. ignis enim acer mordāxq; in ambabus cavitatibus inclusus accenditur, paucisque



DE ACUTIS LIB. II. 61

duntaxat foris apparet, vt tāgenti flamma tenuis esse videatur: æger verò sese comburi existimat. pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi. frigus adest extremorū, fitis aspera, oris ficcitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidū est: præcordia dura sunt atque reuulsa. dolor in dextra parte maior, & cum eo palpitatio in lōgitudinem ad ilia vsque perueniens. quibusdam & arteria secūdum dorsum inflammatur: quod pulsatio in alteris præcordiis manifestat. nā & ipsa venæ cauæ morborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, vtpotè ea quæ in omne corpus diducitur, nihil leuaminis afferente, neque cum tim emolliēte. cutis autem sic affectorum squallida, rugosa atque aspera est: sed in partibus prominentibus atque ossibus, vt in cubitis, genubus, digitorūque articulis magis talis conspicitur. somni tumultuosi fiunt. alius quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. lotium acre mordaxque est. mens vtique his constat, sed quadam



segnitie torpet, & corpus tabe cōsumitur. tum quotquot hunc habitum viderunt, cum causi, id est ardoris speciem appellarunt. quandoquidem quæ adfuit, sub ardoris genere collocantur.

Per autumnū hæc labes exoritur, cū ferum quiddam & immane sapit. Viros ac iuuenes occupat, quibus mala viuendi ratio laborēsque tenuem corporis habitum compararūt. Decimoquarto die hi plerunque moriuntur: quibus morbus diutius trahitur, duplo lōgiori tempore pereunt. Quotcunque autē aut ab initio pusillam phlegmonem habēt, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem euadunt, sed nondum morbo liberantur. Hi longo sanē tempore causo laborant, verū omnia periculosa iam desinūt, dolores, præcordiorū distentiones, & pulsuum malitia, & mentis ignauia. adhuc tamē fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes: simulque & ardor, & sitis, & linguæ orisque siccitas ægrum discruciant. multum diūque trahentes spirant, & subito totum aerem vna spiratione refrigerandi causa ad-



DE ACVTIS LIB. H. 63

ducunt. Verum si frigidam quamplurimam affatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur. postmodum ipsi sitis accenditur: rursúmque vberime aquá ingurgitant. & hec est mali successio & reciprocatio. At egregius medicus, frigidam liberaliter citra noxam propinare potest, vt in aliis ardoribus assolet: sed longe tutius ardore à vena caua oriente laborantibus eam concesserit. Quòd si ventriculus aut vesica potam aquam expellant, neque vomitione opus est: sin id facere nequeant, à multa frigida epota multum vomendum est. homo enim disrumpetur, si tãto bibito humore nihil aut per sudores, aut per vrinam, aut per vètrem effunderet.

DE RENVM ACVTIS  
affectibus, cap. IX.

**R**enes quantum ad corporis speciem attinet, haud ita multú periculis patent, tametsi in aliquod acutum vitium incidant. glandulosa enim ipsorum na-



tura est. ad mortem verò inferendam bene habiles sunt: ipforum enim actio peropportuna est, vrinę videlicet à sanguine secretio, eiusdémque expulsio. sed eam cohibet aut calculus, aut ingenta phlegmone, aut sanguineum concretum, aut id genus: quando quidem ex cōsensu affectionis ob formam corporis prouenientis nulla creatur offensio. Vrinę autē interclusio omnia facina & acerba facit, ignem acrem & fastidium inferentem, dolorem grauem secundum lumbos in dorso, partium distentionem, sed magis circa præcordia. Suppressio autem lotij non ex toto fit, sed stillatim quidem meiunt, multum verò effundere cupiunt. redundantiam enim sentiūt. Quòd si & acre mordaxque lotium inest, frigent, tremunt, conuelluntur, distenduntur præcordia & replentur. Hæc morbi forma perceptioque doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneque prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac sēgnes: si malū plus vrgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati. somni



## DE ACVTIS LIB. II. 65

somni tenues, dolore vexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, profiliunt: postea in soporem tanquã lassitudine oppressi delabuntur. mentis alienatio haud ita magna est: nugãtur, facies liuet. At si quãdo rursus meiendi auuiditas redeat, cū distentionibus magnisq; doloribus modicum quiddã, idque stillatim eiiciunt. tum paulum cruciatibus leuãtur, postmodum in eadem relabuntur. Inter hos illi celerrime pereunt, qui nihil prorsus emittunt. Quicunq; vero non moriuntur (plures enim liberantur) hi aut calculo in vesicam per vrinae semitas delapso, aut phlegmone suppurante, paulatimve per distillationem exhalante discrimen euadunt. quanquam enim paulatim & auarè effundatur vrina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus contabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusque labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni verò tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in vena caua laborante fe-

E



rebant. Nonnūquam è renibus sanguis multus subitaneus erupit, multisq; diebus continenter effluxit. verum nemo ex huiusmodi profluuiio moritur: sed phlegmones ratione, quæ simul cū profluuiio nascitur, & sanguinem coercet. plerunque autem ex retentione, quam ingens phlegmone facit, moriuntur.

DE ACUTIS IN VESICA  
ægritudinibus,  
cap. X.

Vesica difficiles in acutis morbis dolores patitur: etsi ab aliis vitium participet. difficiliiores magisque mortiferos, si per se laborare inceperit: quandoquidem omni corpori & nervis & menti labem communicare valentissimè potest. Quippe vesica nervus frigidus albusque est, & ab innato calido quamlongissimè, quamproximè vero externo frigori posita. Nam in imo sacro ventre ad aures thoracis sita est: nobili quoque munere fungitur, urine videlicet emissionem. Hac porro si tan-



tum calculis, aut sanguinis grūmis, aut qua alia propria, peregrināve calamitate interclusa fuerit, perniciosum est. In mulieribus enim iplis & vteri phlegmonas comprimit, in viris autem extremum rectū prēlongūque intestinum. In plerisque verò ob inuolūtariam praeuerecundia retentionem in coetibus hominum, aut in conuiuuiis repleta distenditur, constringerēque non valens nihil amplius excernit. Igitur ubi vrina supprimitur, superiores quoque partes, renes videlicet, replentur: vrinae ductus, (Græci vretēas appellant) distēduntur. ilia dolor pōderosus infestat: neruī cōuelluntur: tremunt, horrent, desipiunt. Verum si ad hæc & vlcus accedat & inflammatio, multa sanè damna eueniūt: sed mors ab vlceribus sanè quàm celerima inuadit. Cæterū de vlceribus abscessu, suppuratione, & id genus aliis, quæcunque non acutissima sunt, in libro de Lōginquis morbis tractabitur. Quæcunque verò peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriūse hominē perimunt, qualis phleg



mone est, aut grūmi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus, de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inciderit, vrina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum ventrem occupat. vesica turgēt: decimo die luteus sudor exit: pituita vomitur primò, deinde bilis: vniuersum corpus friget, sed pedes vehementius. Si malum vires maiores acquirat, tum febres cum singultu hominem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est, sitiunt: animo ancipites sunt, mens nō constat: nerui contrahuntur. Medicamentis præterea venenosis, & cantharidibus, aut bupreste & pneumatibus vesica deurit: & tota alius maiorem vim patitur, ac prorsus in peiorem statum delabitur: neque longa mortis mora interponitur. Nonnunquā & sanguinem vesica effundit. Flauus autem ac tenuis vesicæ sanguis est. Sed perraro hac de causa homines pereunt, quanuis haud facile sanguis supprimitur. Grummi verò & phlegmonæ mi-



DE ACVTIS LIB. II: 69

nantur interitum. refrigeratio enim & extinctio caloris ingenti sequitur, quæ necrosis Græce dicitur, & gangræna, & quæ eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit. Hæc vitia hyeme & autumnò grassantur. In ætate virili, magis etiam in senectâ vigent. Reliqua anni tempora & ætates neque assidue hos morbos ferunt, minimèque mortiferi sunt. Pueri omnium maxime his calamitatibus vacant.

DE VVLVAE STRANGULATU, cap. XI.

**I**N mediis ilibus mulierum vulua posita est, muliebri viscus animalis ferme naturam adeptum. Siquidem per se huc atq; illuc versus ilia mouetur: quin etiam ad superiora è regione pectoris cartilaginem subit: in latera quoque in dextram videlicet, aut laeuam partem, aut ad iecur, aliave intestina mouetur: & ad inferiora natura procliuior est. vtque paucis absoluâ, penitus errabunda est, & iucundis odoribus delectatur.



ad ipsosque se recipit: contra foede olen-  
 tibus contristatur, & ab ipsis longius se  
 proripit. ac prorsus est in homine vul-  
 ua perinde atque in animali quoddam  
 animal. Hæc itaque si repente superio-  
 ra petierit, ac diutius ibi commoretur,  
 visceribusque violenter incumbat, in-  
 terdum homo veluti comitali morbo  
 correpta citra neruorum distentiones  
 strangulatur. angustis nanque iecur,  
 transuersum septum, pulmones, cor ce-  
 leriter opprimuntur. Qua de causa spi-  
 ritus priuatio, imbecillitasque adesse vi-  
 dentur. Præterea & venæ somniferæ (ca-  
 rotidas Græci vocant) cordis vitium  
 participantes affliguntur: vnde capitis  
 granitates & sensuum abolitio cum no-  
 no quodam sopore adueniunt. Incidit  
 etiam ipsis aliud vitium proxime dicto  
 non absimile: in quo spiritus & vox au-  
 feruntur: sed à vulua non prouenit. quip-  
 pe & viros infestat instar morbi, quem  
 catochon nominant. At mulieribus à  
 vulua malè habentibus tetra odora-  
 menta naribus subiecta, iucunda verò  
 naturalibus apposita opitulantur. alte-



ro autem affectu laborantibus hæc frustra adhibentur: nihilque opis afferunt. Præterea mēbra in vuluæ morbo agitantur, in altero affectu quiescunt. Amplius tremores spontini, & non spontini, sed ex ambrothriæi subiectione excitantur. vuluæ refrigerationes vehementes, copiosæ sanguinis profusionis retentio, & id genus alia in causa sunt. Itaq; si in superiora subeunte vulua vexari mulier incœperit, ad obeūda negotia pigrior redditur, exoluitur, infirmatur, gēua labant, vertigo infestat, extrema debilitantur, caput dolet grauescitq̃ue. in venis ab vtroq; nasi latere iacentibus dolorem mulier percipit: quòd si ceciderit, stomacho mordetur. iuxta præcordia ilia, vbi vuluæ domicilium est, inania sunt. motus arteriarū intermittunt, ordine carent, deficiunt. spiritus magnopere angitur, vox intercipitur, sentiēdi facultas impeditur. spiratio ignota obscuraque est, celerrima necopinatò mors aduenit. nihil enim adest quod mortē instare significet. color nanque viuidus est, ac multo post



mortem tēpore, magis rubent, oculi parū admodum extantes fulgent, haud ita multū intenti, neque tamē valde remissi & conuiuētes. Carterū si prius quā malum ad extremum venerit, aliquando vulua in sedem propriam migret, à strangulatione liberantur: quando aliud submurmurat, humiditas ad est locorum muliebrium, spiritus asperior manifestiorque redditur, nequaquā tamen ab affectu excitantur, aut subleuantur. immo quā celerrime interitus aduenit. nam facilē superiora vulua petit, facilē quoque inde recedit. Quippe vulua suapte natura superfluitat: membranæ verò eam sustinentes humidae sunt: humidus est & locus, vbi reconditur. Amplius fuga & appetentia tristiū iucundorūque mouetur: quocirca labascit facile, ac veluti arboris ramus huc & illuc, susque deque impellitur. Propterea & iuuenes foemine id vitij patiuntur, seniores immunes sunt. Quibus enim ætas, & vita, & mens vaga magis & erratica est, his vulua quoque errabunda instabilisque sit necesse est. Quibus



## DE ACUTIS LIB. II. 73

verò firma ac stabilis ætas, & vita, & mens fuerit, his & vulua similiter afficitur. Hæc utique à vulua proueniens ægritudo, strangulatus videlicet, mulieribus duntaxat infesta esse potest. Veruntamen cōmunes quoque viris ægritudines in vulua oriri consueverunt, phlegmone videlicet, & sanguinis profusio. communes etiam sunt quæ comitantur notæ: vtpotè febres, pulsus abolitio, refrigeratio, vocis amissio. In sanguinis autem profusione & maturius mors ingruit, quemadmodū cū quis animal iugulat.

## DE SATYRIASI, cap. XII.

Satyri Dionysio sacri, qui pictura, quique statuis exprimuntur, arrecto pene figuratur. quod diuinæ rei signum est. Est verò & affectus species, qui laborantis penem excitat erigitque: atque ob Dei figuræ similitudinē satyriasis nuncupatur. Est autem inexplibilis coeundi appetitus. Verum neque si ad veneris opus accedant, quicquam iuuantur: ne-



que multo assiduóque concubitu sedatur arrectio. Conuulsiones autem omnium neruorum fiunt, & tendonũ distentio, & inguinum, partisque eius quę inter inguina & scœmen est, plechada Græci nominant: genitalium præterea inflāmatio & dolor. in facie rubor inest, & vapor quidam roscide humiditatis similis. porrò ipsi ægri sese incuruant & comprimunt: quiescūt tristes, demissi, utpotè calamitatem suam grauatim ferentes. Quòd si hominis verecūdiam id malum superet, turpiter admodũ lingua intemperantes efficiuntur: intemperantes quoque in aluo exoneranda, in venerem lasciuientes, mentēque indecenter titubantes. nam se continere nequeunt: siti laborāt, pituitam largius euomūt: quoniam labris spuma, quę admodum hircis in libidinem ruentibus, infidet. quinetiam haud absimilis odor est. lotium post longam retentionem effunditur album, crassum, geniturę simile. aluus resoluitur, costę & axillę sponte pruriunt ac titillantur. conuelluntur: à cibis abhorrent: sed cum eos



DE ACUTIS LIB. II. 91

assumunt, rapaciter assumunt: conturbantur. Sin ad interitum ægritudo spectat, inflantur, ventérque in tumorem effertur: tendones & lacerti omnes contenduntur, ægrè admodum corpus mouetur, membra contrahuntur, arteriæ paruo motu, debili, inordinatòq; agitantur. Hæc omnia quandoque discutuntur, si alius perturbata multaspiruitosas biliosasque humiditates eiecerit: easdem quoque vomitus non absque discrimine effuderit. Nempe medela non vacat discrimine: ea per somnum profundum longissimùmque præstatur. Si quid refrigatio & resolutio stupor:que neruorum multus somnus est: stupor verò ac refrigeratio satyria sin medicatur. Id morbi genus vere potissimum atque æstate sæuire consuevit.

Inter ætates autem adulescentia iuuentúsque ei maximè patet: præcipueque illi omnes quorù natura in venerè propensior est. Acutissimùm id malum, triste scèdumque est. nam plerunque in septima die hominem cõsumit. Memoræ proditum est mulieres etiam in hanc



labem incidere, & eūdem in libidinem  
 impetum, ac cætera omnia similia per-  
 peti. Verum ego impudicū quendam li-  
 bidinis ardorē mulieres inuadere mi-  
 hi persuadeo, mulieres inquam humi-  
 ditate affluentes, vt ipsius redundantia  
 profundatur: sed satyriā fin id esse mi-  
 nimè cōcesserim. Neque enim ipsarum  
 natura atque temperies, cū frigida  
 fit, huic vitio habilis atque exposita est.  
 præterea neque partes ad arrectionem  
 idoneas, quemadmodum Satyrus, vnde  
 affectui nomen est inditum, mulier ob-  
 tinet. quandoquidem neque viri stran-  
 gulatione ab utero vexantur: quoniam  
 viro vterus datus non est.



# ARETAEI CAP padocis medici

DE CAUSIS ET NOTIS  
diuturnorum affectuum,  
Liber primus,

IUNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

De longis affectibus,	cap. I.
De cephalæa,	cap. II.
De vertiginosis,	cap. III.
De morbo comitiali,	cap. IIII.
De melancholia,	cap. V.
De furore,	cap. VI.
De resolutione neruorum,	cap. VII.
De phthisi,	cap. VIII.
De suppuratione in pectore,	cap. IX.
De vomica pulmonis,	cap. X.
De anhelitu,	cap. XI.
De pulmonariis,	cap. XII.
De iecore,	cap. XIII.
De liene,	cap. XIIIII.
De morbo regio,	cap. XV.
De cachexia, i. malo corp. habitu,	c. XVI.





diuturnarum ægritudinum dolor multus est, tempus colliquationis longū, & medicatio instabilis. vel enim haud ex toto deleti sunt, vel ex qualibet leui offensa morbi deleti reuertuntur. Nam laborantes æquo animo ferre vsque in finē non audent. quin etiam si æquo animo ferunt, in victus ratione nimis longa delinquūt. Si verò & dolor adest, laboriosa curatione perficitur, famem, amara medicamina, & dolorem excitātia, aut per sectionem, aut vstionem, quibus in diuturnis morbis egenus, miser ægroti cruciātur, vt mortem quam iam pridem appetebant, effugiant. vbi me Hercule in magna animi constantia diu præstanda, auxiliis variandis, iucundis citra noxā ægro concedendis, ipsoq; decipiendo medici vir-



DE DIVTIVR. LIB. I. 95

tus atque excellentia dignoscitur. Ceterum & ager fortis fit, & cum medico aduersus morbum cōspiret, necesse est: qui non solū corpus tenaciter arripiens ipsum celeriter tabefacit & exedit, verū etiam sensum magnopere subuertit, animāque insanam reddit. Nāque ab intemperie corporis id genus furorem atque insaniam, quam Græci melancholiam vocant, proficisci nouimus: de quibus in sequentibus dicam: in præsentia de cephalæa, id est de vetere capitis dolore, sermonem instituam.

DE CEPHALÆA,

cap. II.

SI caput repente obuia quaque de causa, per plures etiam dies dolorem patitur, hic affectus cephalalgia Græcè nominatur: si multo tempore dolor insistere assuevit, & per longos frequentēque circuitus, ac in dies maior violentiorque insultat, difficulter sanationem admittens, id genus cephalæam Græco



vocabulo appellamus. Eius formę infinitę sunt. quibusdam enim perpetuus dolor inhæret, exiguus quidem, sed nō intermittens, nonnullis per circuitus reuertitur, vt his qui quotidiana intermittente febricitant: nonnullis ab occasu solis vsque in meridiem, & tunc ex toto remittitur: vel à meridie in vespēram, aut etiam vltērius vsq; in noctē permanet: sed non multum hæc durat circuitio. Præterea dolor modò est in toto capite, modò in dextra magis, modò in sinistra, modò circa frontē, aut sinciput: hæcque eodem die incertē & erraticē fieri solent. Quidā dextra tantum parte dolent, quidā læua, quā tempus, vel auris, vel supercilium vnū, vel oculus ad medium vsque terminatur, vel quā nasus in æquas partes diuidit: vltra quem terminum dolor non progreditur, dimidium tantum capitis occupans. Id vitium solū heterocrania dicitur, haud leue malum: quanuis intermitte, quanuis exiguum esse prima specie videtur. nam si acutē interdum impetum faciat, fœda atq; atrocissima

trimenta



DE DIVTIVR. LIB. I. 81

trimenta affert:nerui distenduntur, facies obtorquetur: oculi vel contēti instar cornu rigidi sunt, vel huc atque illuc interius conuellūtur, ac vertiginose agitantur: in ipsisque dolor profundus vsque ad intimas tunicas descendit. sudor ex tēdonibus immodicus effluit repente, neque cohiberi potest: neque vlla causa præcessit, perinde ac si quis ligno plagam inflixerit. Nausea & vomitus biliosus comitantur: homo consistere nequit, sed in terram delabitur. Quod si vitium quandoque increscit, de hominis vita actum est: at si debilius est, & citra vitæ periculum, diutius permanet: pigritia multa adest, & capitis grauitas: animi pendent: vitam ægrè ferunt. fugiunt enim quodā modo lucem, tenebræque his ægritudinem solantur: neque quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinent. olfactorius in iis sensus infectus est, neque quicquam eos bene olens oblectat: pariter quoque graueolentia detestantur. Vita ipsis inuisa est, mortēque discipiunt. Harum calamitatum fons & origo est, cum aridi-

F



tate frigiditas. Si diu teneat, magisque inualeſcat ægri- tudo, poſt id genus dolores vertigo ſubſequitur.

DE VERTIGINE, cap. III.

**S**i tenebræ oculis præ- tenduntur, & caput in turbinis modum circumduci videtur, & auribus murmur veluti delatentis cū ſtrepitu fluminis inſonat, aut tanquam ventus flatu vela percutiens, aut tibi- arum fiſtularumque cantus, aut veluti ſtridor plauſtri currentis obſtre- pit, vertigo huic vitio vocabulum eſt: malum quidē, ſi capitis ſymptoma eſt: malum quoque, ſi cephalæ ſucceſſit, aut ex ea vetuſta ægri- tudine ortū eſt. Nam ſi priora vitia non re- ceſſerūt, ſed remanet ſcotodine, id eſt tenebræ oculorum & apparens motus in orbem, aut longiori tempore cum propriis ſymptomatibus nulla adhibita curatione ad ſummum peruenit, vitium quod à Græcis ſcotoma dicitur, à Latinis vertigo, procreatur. Cauſam habet frigidam & humidam: aliorumque ſæpe mor-



## DE DIVTIVR. LIB. I. 99

roborem, cum insanabilis euasit, initium  
est, ut furoris, melancholiae, morbi comi-  
tialis, cuique suis symptomatibus acce-  
dentibus. Vertiginis autem forma ita  
se habet, grauitas adest capitis, splendi-  
da quaedam oculis inter multas tenebras  
se offerunt, suimet æger propinquo-  
rumque ignarus est: cumque morbus au-  
gescit, tunc tibi soluantur, atque humi  
reput. Nausea fit atque vomitus pitui-  
tae, bilisve tam atræ quàm flauæ. quan-  
do flaua per vomitum reiecta furor e-  
nascitur: atra verò, melancholia: ac pi-  
uita exeunte, morbus comitialis effi-  
citur. omnium quippe morborum talis  
conuersio est.

## DE MORBO COMI- tiali, cap. III.

VARIUM ac portentosum morbi ge-  
nus est epilepsia quæ dicitur à Græ-  
cis, Latine comitialis morbus. terribilis  
tunc in accessionibus, & peracutus, &  
perniciosus: quædo quidē nōnunquā ac-  
cessio vna hominē rapuit. At si diligen-



ti cura vim morbi sustinet laborans, ægre tamē vitam ducit inter fœditates, ignominias atque dolores. Morbus autem non facile recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore viget. vexat etiam pueros & adolescentes. interdū secunda fortuna euenit, vt per succedentem prouectiorē ætatem abi-gatur: quādo simul cū ætatis flore euanescit: sed & tum quosdam abiens deformes efficit, pueros quoque pulchritudinis inuidia perdit: aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquē prorsus auferens. Quod si malū hoc penitus infederit, atque radices altius egerit, neque ipsum medicus, neque ætatis mutatio submouent, sed cum ægrotante viuit atque commoritur. Interdum morbus iste membra oculósque conuellens ac distorquens, dolores ciet: interdum & mētem in furorem adegit. Triste medijsfidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio & spontina ventris solutione. Ipsius quoque morbi origo mirabilis, & præter



hominum opinionem est: quippe non-  
nulli flagitiosis hominibus à luna im-  
mitti existimant: cuius rei causa & sa-  
crum morbum hunc nominant. Verum  
& aliis rationibus id nomen ei fuit im-  
positum: aut ob magnitudinem. omne  
enim magnum, sacrum dici consuevit:  
aut quòd non humana ope tolli queat,  
sed diuina: aut quoniam dæmone cor-  
reptus esse homo videatur: aut ob hæc  
simul omnia sacer morbus appellatus  
est. Quæcunque sane huic tanquã acu-  
to morbo symptomata eueniunt, supe-  
rius memorauimus. At si diu perma-  
net: neque per intermissiones citra no-  
xam degunt torpentes, abiectione animo,  
mæsti, hominum aspectum consuetudi-  
nemque vitantes: neque ætate procedē-  
te mitiores fiunt: vigilant, per quietem  
multis formidolosus imaginibus terrē-  
tur: cibum sumere fastidiunt, sumptum  
malè conficiunt: decolores, faciēq; plū-  
bea sunt. ob ingenij sensusque tardita-  
tem ægre discunt. auditus hebet, aures  
tinnunt, capiti bombi veluti quidā in-  
sonant. Lingua in sermone perplexa est

*ita hom*  
*Cum uult*  
*exprimere*  
*magnitudi-*  
*nem alicu-*  
*ius rei po-*  
*nt sacra*  
*pro magno.*  
*IXTVES*  
*12 p o i Sacri*  
*piscas pro*  
*magnis*



ac titubat, aut ex vi morbi, aut ob vulnera, quæ tempore exacerbationis accipit. tunc enim ob convulsione neruorum motum lingua in ore variis modis torquetur. Rationem quoque usque eo morbus conturbat ac deiicit, ut prorsus denique infatuentur. Atque horum omnium causa est cum humiditate frigiditas.

## DE MELANCHOLIA,

cap. V.

**A** Tra bilis in acutis ægri tudinibus, si in superioribus apparet, oppido quàm mortifera est: si ad inferiora descendens exiit, non valde vacat discrimine. In tardis autem longisque morbis, si ad aluū bilis atra decurrit, in tormenta iecorisque dolorem finitur: mulieribus verò purgatio vice mensū aduenit, si in cæteris abest mortis periculum. At si superius, ut puta stomachum, septūve transuersum petit, insaniam parit, quam Græci melancholiam nominant. flatum nāque gignit, & ructus



foetidos piscium odorem exhalantes: infra vero & flatus cum crepitu transmittit: necnon & mentem simul alienat. Proinde melancholicos iuxta & flatuosos medici veteres sic affectos appellarunt.

Porro quidam reperiuntur, in quibus neque flatus, neque bilis atra colligitur: sed ira immoderata, & moeror, & ingens animi consternatio. hos quoque nihilominus melancholicos nuncupamus. Bilem quidem in istis redundare iracundia significat: atram vero bilem, iracundiae vehementia ac feritas. testis autem Homerus est, ubi inquit, Inter hos autem surrexit heros atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem valde praecordia atra circum oppleta erant: eiusque oculi igni fulgenti similes erant. Tales evadunt melancholici, cum ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in una cogitatione defixus atque inherens absque febre. Mihi profecto melancholia mania, quae Latine furor dicitur, initium atque pars esse videtur. siquidem furentibus animus modo ad excandescentiam, modo



ad voluptatem conuertitur: at melancholici in tristitia & animi angore dūtaxat versantur. Furentes etiam plurimum vitæ sic transeunt desipientes, & fœda atrociâque committētes. Melancholici verò non vna tantum insanix specie laborant, sed aut venenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum consuetudinem perosi, in solitudinem aufugiunt: aut ad supersticiosam religionē conuertūtur, aut lucem hanc vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis aduenit. hi vero in furorem præcipitāt. Sed quomodo quibūsq; sedibus affectis id vitium plerumque contrahitur, subiiciā. Porro si in præcordiis residet, causa circa septum trāsuerfum immoratur, bilisque supra infrave melancholicis prorumpit. Si caput etiam per consensum afficitur, & excandescentiæ delirium in risum hilaritatemque per longum vitæ spacium commutatur: hi verò morbi potius magnitudine, quàm affectus dolore in furorem prolabun-



## DE DIVTVR. LIB. I. 89

tur: in vtrisque nimirum ariditas accusanda. Viri sanè & furore & melancholia corripiuntur: rarius autem quam viri, sed deterius mulieres furis agitantur. Aetas quæ prope statum est, & ipse status huic malo subiiciuntur. Aestas tempus, & autumnus hunc morbum procreant, ver autem iudicat. Inter notas euidetiores hæ sunt, quod videlicet quieti aut tristes, abiecti torpentesque sunt absque ratione: nullaque de causa melancholia initium sumit. præterea in iram facile incidunt, male sunt animati, vigilant, ex somnis tumultuose excitantur, ingenti quoque pauore trepidant, cum morbus cremetum suscipit: quando & insomnia vera sunt, terribilia atque euidetia. quotquot enim à naturali statu valde aliena sunt, ea non protinus huic malo insunt, sed per quietem sese offerunt: cum in aliquid impetu rapti sunt, postea facile eos poenitet: mutabiles sunt, turpes, de minimis quibusque solliciti, auari: sed non ita multo post simplices, prodigi, multa largientes, non virtute animi, sed morbi varietate.



Quod si malum exasperatur, homines  
oderunt, ab eisque fugiunt, de inanibus  
conqueruntur: vitæ maledicentes mor-  
tem expetunt. Atque istorum multis sen-  
sus ac mens usque eo stupore fatuitatē-  
que capiuntur, ut omnium ignari sui que-  
met immemores in morem bestiarum  
vitam degant. corporis quoque habitus  
in peius labitur: colore fædo, & ex atro  
viridique commixto tinguntur: nisi in-  
ferius bilis descendat atque exeat, sed  
quoquo versum per corpus cum sangui-  
ne diffundatur. multi cibi capaces, ni-  
hilominus tamen extenuati sunt. quo-  
niam somnus in eis neque potu, neque  
cibo membra confirmat, sed vigilia ad  
exterius mouet, ac dissipat. proinde &  
alvus arida est, nihil deiiciens. nonnun-  
quam verò deiicit sicca, rotunda, atro  
quodam biliosoque circumfusa. vrina  
pauca redditur, acris, biliosa. multum  
flatuosi spiritus in præcordiis est. ructus  
putidi feruntur, graueolentes perinde  
ac si ex maris lacuna exhalarent. non-  
nunquam & humidum quoddam acre  
cum bile reiiciunt. arteriarum motus fe-



## DE DIVTVR. LIB. I. 107

re parui sunt, pigri, inualidi, crebri, frigori similes. Fama est, ex his quempiam insanabiliter se habentem, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego vero suspicor, eum ab initio in puellam exarsisse, inde tristem & languenti animo, quod ea non potiretur, euasisse, suisque popularibus melancholicum visum esse. at iste ubi puellae amatae se coniunxit, moestitia recessit, ira, & animi languor discussus est, gaudium tristiciam deleuit, & mens amore medico prorsum sanata est.

## DE FVRORE, cap. VI.

FVroris modi specie permulti sunt, genere tantum vnus. est enim ex toto mentis alienatio diuturna, vacans febris. Etenim si febris quandoque coniungitur, id non ratione furoris proprie, sed alio quouis casu incidit. Quippe & vinum mentem inflamat, & per ebrietatem delirare cogit: praeterea quaedam esculenta amentiam pariunt, ut man-



dragora & altercus. sed neutiquam hi inter furentes numerandi sunt. nam repente hæc adueniunt, & celeriter conquiescunt. furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectæ calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignauia ex refrigeratione proueniens: at furor ex calida siccaque causa exoritur, functionesque tumultuosas præstat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per interualla desinit, simulque commoritur: furor verò & intermittit, & diligenti curatione radicitus vellitur. sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut tēporis anni clementia curatur. Nonnullos nanque qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in victu, aut ira casu aliquo prorritata denuo ad furorem reuocauit. Porro illi huius vitio facile patent qui natura sunt iracundi, acriter exardescientes, negotiosi, faciles, hilares, qui iocosus puerilibusque delectantur. Illi



DE DIVTYR. LIB. I. 93

etiam qui contrario his sunt ingenio, quicūque videlicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseuerantes, & qui cū demum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt. hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verū & in ætatibus quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, vt puberes, iuuenes, & viri. In quibus autem calor ex atra bile accenditur, corporisque habitus ad ariditatem vergit, his in melancholiam cadere facillimū est. Item victus ratio, multi cibi assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, venenis appetentia hanc ægritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi mūdetur corpus, furor infestat: cū ipsarum vteri ad virilem congressum apti euaserunt. aliæ verò haud ita facile, sed admodum acerbè in furorem aguntur.

Causæ tales sunt: vir nimirū furiosus fit, si consuetus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor voluptati est, ridet, ludunt, saltant die noctūque: ira-



scuntur palam: nonnunquam coronati  
 incedunt, ac si ex aliquo certamine vi-  
 ctiores redeāt: quibus obuiam fiunt, non  
 sunt infesti. ita se habet huiusmodi fu-  
 roris species. Alij verò ab ira furentes  
 nōnunquā sibi vestes prosciderūt, & fer-  
 uos interfecerūt, & sibi ipsis manus in-  
 tulerunt, & obuios quosque male ha-  
 buerūt. Species vtique infinitæ sunt. in-  
 geniosi nāque ac dociles astronomiam  
 callent sine doctore: philosophiāque  
 possident à nemine traditam: poeticam  
 quoque veluti à musis infusam norunt.  
 aliquid enim & in morbis emolumenti  
 præbet docilitas. Rudes autē atque in-  
 docti homines hoc malo circumuenti,  
 graui pondera ferunt: figulinam exer-  
 cent aut fabrilē, aut lapides cælant.  
 Præterea & monstrosa quædam cogi-  
 tant. timebat enim quispiam ne vasa o-  
 learia prociderent: alius non bibebat,  
 se laterem esse existimans, ne humore  
 dissolueretur pertimescens. Id etiā fa-  
 ma diuulgat: carpētarius quidam olim  
 fuit, cū domi esset, prudens operator:  
 ligna bene metiebatur, scindebat, com-



DE DIVTVR. LIB. I. III

planabat, clavis iūgebat aptabátque: in  
domo extruenda sobrius cum exactori-  
bus operū versabatur, paciscebatur, pro  
laboribus iustam mercedem poscebat.  
porro iste in loco vbi arte sua fungeba-  
tur, mente constabat: at si in forū quan-  
doque discederet, ad balneum aut ad a-  
liud quippiam necessarium, instrumen-  
ta deponens, primo suspirabat, deinde  
egrediēs humeros cóstringebat: postea  
cū ē seruorum, fabricæ, locique illius  
cóspectu abiisset, tum penitus insanie-  
bat, & furore rapiebatur: quòd si ad eū-  
dem locum celeriter recurrisset, iterum  
ad se redibat. Hæc erat inter locum il-  
lum & viri mentem cognatio. Cau-  
sa morbi huius in capite præcordiisque  
còtinetur: modò vtroq; mēbro pariter  
laborare incipiente, modò alterū alte-  
ro inuicem lædente. Verum præcipua  
furoris & melancholiæ sedes viscera  
sunt: quemadmodum caput & sensus in  
phreniticis plerunque laborant. in qui-  
bus vis sensoria oblæsa est, & quæ non  
adsunt, tanquam iam præsentia conspi-  
ciunt: & aliis non conspicua, ipsorū sese



oculis representant. At furentes tantū-  
modo vident quæ videre oportet: sed  
de illis non sentiunt, vt sentiendum est.  
Itaque si magnū est malum, promptio-  
re ingenio sunt: sensibus acutiores fiunt,  
suspiciosi sunt, iracundi nulla de causa,  
mœrentes præter rationem, cum in se-  
uerum & tetricum furor vertitur: cum  
verò ad animi hilaritatem inclinat, læti  
& alacres fiunt. prius dicti sine lædente  
causa vigilant. vtrisque visio deprauata  
est. capitis dolor, aut saltem grauitas co-  
mitatur. auditu prompti sunt, mente tar-  
dissimi, in quibusdam sanè peculiariter  
sonant aures, & bombis adeo perstre-  
punt, vt tubarū fistularūque voces au-  
dire sese existiment: idque fit, cum mor-  
bus ccrementum accepit. multo vento  
inflantur, anxij sunt, in sumēdo cibo vo-  
races atque auidi, vigilant enim, & vi-  
gilia famem suscitāt. verum neque, vt  
ægri solent, emaciantur: sed magis pe-  
culiaris melancholicis corpulentia est:  
item pallore quodam suffunduntur. si  
quod autē viscerū phlegmone inuase-  
rit, tunc appetentia nutritiōve hebe-  
tatur:



tatur: oculi caui fiunt, non conniuentes: ob quos cœruleæ atræq; imagines sese obiiciunt, si ad melancholiam affectus vergit: sed rubicundiora & punicea visa sunt, si ad furorem inclinât. plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, paûorque eos veluti instantis fulminis occupat. nonnullis vero & rubent oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu variis secûdum quietem visis perturbâtur, immoderateque venerem concupiscunt: neque eos etiam in publico ventrẽ exonerare pudet. ad mutua & familiaria colloquia pigri sunt: cômonefacti & increpiti ad iram excitantur, atque furore penitus insaniunt. Exinde alius alio modo furit, quidam immensum spacium decurrunt: & quo peruenturi sint, nescientes, eodem vnde discesserant, cursu feruntur: alij per longum iter eos quibus forte occurrerint, comitantur. Item nonnulli vociferântur, latrocinium, aut viâ illatam querentes: alij ab hominum cōspectu in solitudines fugiunt, secumque tantummodo versantur. Cûm verò

G



iam inclinatus est morbo, stupidi, quiescentes, moesti que sunt: in notitiā enim morbi venientes, sua calamitate miseriamque tristantur. Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilacerant pia cogitatione. Diis suis tanquam id postulantibus gratificantes. Id furoris genus à persuasionē quadā dūtaxat proficiscitur. in ceteris hi temperantes modestique sunt. excitantur autem tibia cantu, aliōve animi oblectamento, aut temulentia, aut praesentium hortatu. Deorum afflatu hic furor prouenit: qui cum remittitur, hilares sunt & curis vacui, tanquam diis initiati. praeterea decolores & macie affecti sunt, diūque ex vulnere doloribus infirmum eorum corpus est.

## DE NERVORVM RESOLUTIONE, cap. VII.

**A** Poplexia, paraplegia, paresis, paralysis, omnia genere eadem sunt. aut enim motionis, aut tactus, aut vtriusque defectus est: interdum & metis, in-



terdum & reliquorū sensuum. Sed apoplexia totius quidem corporis & sensus, & mentis, & motionis resolutio est. proinde apoplexiam fortē solvere nulla facultas potest: debilem verò tollere non facile est. Paraplegia est tactus motusque remissio, sed in membro vno, ut puta manu crurēve: paralyfis autē motus tantū ferē est, actionisque defectio. Quod si nonnunquam solus tactus deficiat (raro autem id euenit) potius anæsthesia, id est sensus abolitio, quàm paresis, id est defectio, nominatur. At si Hippocrates apoplectō, id est attonitū, crus secundum rectum dicat, illud tanquam mortuo simile, inutile & insanabile vult significare. quod enim in toto corpore est vehemens apoplexia, illud in crure paraplegiam vocat. Vrinæ autem in vesica aut suppressio, aut retinēdi impotētia, paresis propriè est. Palpebrarum verò & malarū, musculorūmq; in maxillis, & genę in alterutrā parte in diductio, si per conuulsionē torqueantur, canina cōuulsio nominatur. Genuū resolutionem, sensusque per aliquātam



temporis stuporem, & exanimationem,  
& casum lipothymiam, id est animæ de-  
liquium, vocitamus. Verū nonnunquam  
membra singulatim resolvuntur: super-  
cilium, exempli gratia, solum, aut digi-  
tus, aut maiora etiam, vt manus crūſve:  
nonnunquam simul plura: & aliās dex-  
tra tantū, aliās sinistra, aut vnum post  
aliud omnia resolvuntur exquisitè, aut  
debiliter. neque tantum quæ distantia  
sunt, & quæ eodem censentur nomine  
coniugataque sunt, vt oculi, manus, cru-  
ra: verum etiam cōiuncta, cognataque,  
vt nares vsq; ad medium, & lingua vs-  
que ad fines, qui in ipsa mediā positi  
sunt: vna tonsilla, & isthmus, ipsaque gu-  
la dimidia resoluitur. Ego sanè stoma-  
chum etiam, & intestina, & vesicā, ob-  
longūque intestinum vsque ad prin-  
cipium, id est anum, idem vitium pati  
existimo. Sed interiora membra reso-  
luta latent, obscuraque sunt: imperfecte  
verò sunt ac dimidiatae eorum func-  
tiones: proinde mihi & membra dimidia  
pati videtur in duas partes à morbo di-  
ducta. Hæc res nimirū documento est,



quo dextræ partis facultas & natura à  
 finistræ partis natura & facultate diffe-  
 rat. Quippe assidens causa æqualis est,  
 & vtriq; cōmunes morbi occasiones, si-  
 ue frigiditas sit, siue cruditas. sed vtraq;  
 haud æque pati idonea est. Natura ve-  
 rò æque valens est, vbi subiecta sunt æ-  
 què valentia: idem autem inæqualibus  
 inesse nullo modo potest. Igitur si infra  
 caput aliquod principium affectum sit,  
 qualis medullæ dorsi mēbrana est, quæ  
 nominis eiusdē sunt & contigua, dextra  
 in dextris, & in finistris lēua resoluun-  
 tur. Verum si caput primo in dextra pa-  
 tiatur, sinistra: si in lēua, dextra neruorū  
 resolutione laborant. Hoc ideo euenit,  
 quòd neruorum initia permutata sunt.  
 neque enim dextri nerui in dextras par-  
 tes secundum rectum vsque ad extre-  
 mum progrediuntur: sed ab initio ena-  
 ti protinus ad oppositos transeunt, se in  
 vicem in figuram huius literæ X, quam  
 Græci chiasmon vocant, permutantes.  
 Utque semel dicā, siue omne simul cor-  
 pus resolutionem neruorum patiatur,  
 siue aliqua membra, siue ab alterutra,



siue ab vtraque parte, nerui de capite  
fluentes alia ratione patiuntur. Nam  
sensu quidē, vt paucis dicam, hi priuan-  
tur, non admodum autem facile ex se  
motum amittunt. Quod si per commu-  
nionem cum his qui mouentur, aliquid  
vitij cōtraxerint, paulum & ipsi motus  
perdiderint. Nam & per se ipsi motum  
tamen si minorem naturaliter possidēt.  
Nerui enim à musculis ad musculos  
transeuntes motionis principatum ob-  
tinent, & his qui à capite manant, imper-  
tiunt. Nerui enim capitis ab illis pluri-  
mum motus participant: tamen ex se  
quoque licet minore, vim mouendi ha-  
bēt. Atque hi nimirum in motu noxam  
magis patiuntur. Rarò autem vsu venit,  
vt per se iacturam sensus faciant: neque  
tunc ex toto eam facere videntur. At si  
qua copula neruorum ab osse quopiam  
enatorum, & ad ossa pertinetium, solu-  
ta aut rupta sit, tum membra proprio si-  
tu non continentur, luxantur, locòque  
dimouentur: non tamen sensu priuan-  
tur. Hæ sunt autem paraplegiæ species.  
quandoque enim membra resoluta in



longum porriguntur: neque, quando extrema longissima apparent, iterum possunt recuruari. nonnunquam in orbem flectuntur, neque in longum extenduntur: si quis autem ea, ceu ligna adaptans & poliens, violenter protrahere nititur, breuiora ea seipsis inueniet. Vtrunque id vitium & in oculis pupilla sustinet. aut enim in amplitudinem magnam diffunditur: idque platycorien, id est pupillæ amplificationem, appellamus: aut hæc eadem in angustum contrahitur: idque phthisis, aut etiam mydriasis à nobis dicitur. Vesica etiam in suis obeundis muneribus deprauatur, & paresin quam vocant, patitur. aut enim per extensionem resoluitur, cum retinendi impotens lotium effundit: aut in se ipsam conuoluitur, cum urinæ plena reddere nihil potest. Morbi huius, paresis videlicet, causæ prægredientes sex numerantur, vulnus, percussio, refrigeratio, cruditas, venus, vinolentia. Ceterum & animi immodicæ perturbationes, ut repente incussi pauores, timores, animi consternatio, & mæror: præterea



& in pueris terrores: interdū inopinatum atque ingens gaudium, item risus vsque ad mortem implacabilis nervos resolvere consueuerūt. Hæc utiq; morbi prima initia sunt sed vltima atque potissima causa est ingenitæ caliditatis refrigeratio, quando ab humiditate aut siccitate iniuriam patitur. ab hac verò magis quàm ab illa sanatu difficilis læsio est: necnon & à vulnere, neruiq; intercisione malū insanabile prouenit.

Quantum ad ætates attinet, senes & ipsi curationem vix recipiunt: pueri facile ad sanitatē redeunt. Inter anni tēpora hyems hanc ægritudinem gignit præcipuè, secūdò ver, tertio autumnus, æstas omniū minime. Habitus corporis pingues natura, humidi, desidēs, belluini, hoc vitio facile corripuntur. Affectus hi iam perfecti talibus signisprehenduntur, immobilitate, sensu sopito, qui neque calidum, neque frigidum, neque vellicantes, aut scalpētes, aut aliter contingentes percipiat. Raro euenit, vt istis extremitates doleant: verum sanitati recuperandę indolentia non le-



DE DIVTIVR. LIB. I. 109

uiter prodest. Porro morbus hic repente inuadere solet. nonnunquam tamen etiam prælonga habet initia, grauitatem, motum difficilem, torporē, frigoris sensum, aliàs caloris excessum, somnos breues, cogitationes siue apparitiones vehementiores, atque tunc subito resoluti sunt. Nempe in canino, vocato spasmo, id est neruorum conuulsione, omnes faciei partes conuelli, non magno pere vsitatum est. Sed ad dextras partes læuæ, ad læuas dextræ feruntur: quando buccæ atque os huc aut illuc, tanquā ex sede propria discedente maxilla longius detorquentur. Etenim quibusdam nonnūquam articulus luxatus est, cū valde hiantibus maxilla ad inferiora delapsa fuit. in læsa mala oculi inuersio & strabositas (vt ita dicā) fit: in palpebra inferiore palpitatio: palpitat & superior aliàs quidem cum oculo, aliàs verò sola. Contenduntur & labia seorsum alterutrum: nonnunquam verò & ambo collapsa balbutiunt: quibusdam & exacte ocluduntur, postea repente ac late dehiscunt, & solitum sputum cum stre-



pitu eiciunt. conuellitur & lingua: si-  
 quidē & ipsa musculus est & nerui: quā-  
 do ad palatum secundum latitudinem  
 tota coharens subito sese remouit, &  
 concussionis sonum reddidit. conuel-  
 litur & columella: ac si os quæ interius  
 sunt in vnum cogat, inopinatus sonus  
 redditur: si vero dehiscat, columellam  
 intueberis nonnunquam palato secun-  
 dum latitudinem adhærentem: nonnū-  
 quam violentia quadam in longū pro-  
 ductam, ac descendantem, fistulæ per-  
 similem: quandoquidem & ipsa sonum  
 edit. Porro caninæ conuulsiones deci-  
 piunt, quippe integræ ac sanæ partes æ-  
 grotare spectantibus videntur. Nam in  
 omnem partem tentione, colore, oculi  
 amplitudine, sanæ partes lesionem pati  
 existimantur. Deprehenduntur verò &  
 ridēdo & loquēdo, & cōniuedo. siquidē  
 læsæ partes omnes cum violētia & stre-  
 pitu quodam trahuntur: labium risu ca-  
 ret: inter loquendum non mouetur: pal-  
 pebra non volubilis, oculus intentus ac  
 rigens est: sensus tangendi nihil perci-  
 pit. At sana membra loquuntur, conni-



uent, sentiunt, rident.

## DE PHTHISI, cap. VIII.

SI ab externa causa abscessu in pulmone facto, aut à lōgīnqua tussi aut à sanguinis reiectione & puris extusīāt, pye & phthisis nominatur. Si pectus autem costave suppurauerit, materiāque per pulmones traducatur, id genus homines empyi Græcè vocantur, purulenti à Latinis dici possent. Quòd si & ab his pulmo exulceretur à præterlapso pure corrosus, hoc vitiū non vltius empyema, id est purulentiam, sed phthoen, id est corruptionē appellato. Simul autem adest & ignis assiduus, qui nūquam intermittere videatur, interdū latens sudore atq; corporis frigore. Hæc enim propria phthoen sequuntur, quòd videlicet caliditas excitatur, & in noctē emicat, interdū rursū in visceribus delitescit. patet autem istorū angor, & imbecillitas, & colliquatio. Nam si per dē corpus ignem euaderet, cur non fieret tūc homo carnosior, & robustior, & mor



bi tolerantior? ut enim recessit, grauiamagis intenduntur: arteriarum motiones paruae & imbecillae sunt: vigilant, color languet: & alia omnia patiuntur, quotquot febricitantes comitari solent. At species humorum prope infinitae sunt, liuidorum, atrorum, purorum ac syncerorum, aut pallido alboque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rarorum diffluentium, aut odore carctium, aut foede olentium. Omnes autem hae puris formae ac species sunt. Quicumque vero aut igne, aut aqua humiditates explorant ac notant, hi haud ita multum phthoen mihi dignoscere videtur. Namque visio quolibet alio sensu certior est, non modo his quae reiciuntur, intuentis, sed etiam aegrotantis specie consideranda. Siquis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc vera phthoe laborare pronunciat. Quinetiam quibuscunque quidem ulceratus pulmone non fuerit, nihilominus tamen diuturnis febribus consumpti sunt, saepiusque



DE DIVTVR. LIB. I. 109

duriter, & absque effectu vlllo tussientes nihil reiiciunt, hos quoque phthysicos haud ita multum improprie nominarunt. Simul verò & his adest pectoris grauitas: pulmo enim infirmus est: angor, intolerantia, cibi fastidiū, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: sudor vsque ad pectus caliditate molestior: per tussim varia, qualia memorauimus, extruduntur, vox raucescit, ceruix nonnihil tortuosa est, gracilis, nō versatilis, sed veluti rigens atque intenta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt: ossium duntaxat species remansit. siquidem & carnes extabescunt. vngues adunci fiunt: digitorum ventres rugosi & lati. nam præ macie neque fasciam ambientem, neque rotunditatem obtinet. quam ob rem & vngues aduncisunt. ea est enim ipsorum requies & fulcimen, quæ ipsorum extremitates replet: quoniam & ipsi laborem sustinent, vtpote qui solida membra sunt. Item nares iisdem acuminatæ, graciles: malæ extates & rubidæ: oculi caui, lucidi, micantes: tumida, excarnis, pallida, seu li-



uida facies est. buccarum tenuia dentibus inhaerent: ridentibus assimulantur: in omnibus denique cadaueris speciem referunt. Hunc in modum & cætera sese habent. tenues enim & carnibus priuati sunt: brachiorum muscoli non apparent: mammarum neque vestigia extant: solæ autem papillæ cernuntur. constas non solum dinumerare perspicuè licet, verum etiam vbi definant, intueri facile est. neque enim cum vertebris factæ articulationes occultantur. patent etiam in os pectorale costarum insertiones: quarum interstitia inania & caua sunt, rhombi figuram secundum ossium circûductû ostédentia. præcordia vacua ad superiora cõuulsa sunt. abdomen & ilia spinæ dorsi cohærescunt. artus cõspicui, prominētes, & macri sunt: perinde se habēt & tibia, & coxendix, & brachiū, at spina vertebris superextat, à priori parte caua, vtrisque musculis per tabem dissipatis. scapula operta tota sese conspectui offerunt, atque auium alas imitatur. Huiusmodi ægrotis si alius perturbetur, actum est: sin ad sani-



DE DIVTIVR. LIB. I. III

tatem vergant, perniciosis contraria signis adueniunt. Porro senes in hoc malum frequenter non incidunt, sed minime euadunt. Iuuenes autem usque ad florentem consistentemque ætatem post sanguinis reiectionem in phthisin prolabuntur: inde sanescunt quidē, sed non facile. Pueri assidue tussi usque ad phthisin nonnunquam diuexati facile ad sanitatem redeunt. Habitus verò in id vitium proni sunt graciles delicatique, fecilibus tabulis similes, alarum instar habentes, prominenti gutture, albidiori pectore. Regionibus autem frigida atque humida huiusce affectus germanæ sunt.

DE PVRVLENTIS,  
cap. IX.

Quibus hominibus in cauis locis et regione pectoris, aut inferius subtransverso septo puris abscessus fiunt, si per os id eiciunt, empyi hoc est purulenti vocitantur: si per alium pus deicitur, apostematia Græco vocabulo di-



cuntur. Ac si in pectore quidem, cum est  
ulceratū, in pulmone verò, cum phthoe  
laborat, aut in sublinente costas mem-  
brana circa latus, aut os pectoris, quod  
Græci sternon vocant: aut inferius, vbi  
pulmo cum spina dorsi committitur co-  
hærescitque, aut si quo alio pectoris lo-  
co vitium sit, omnibus ad pus excernē-  
dum via per pulmonem munita est. Sub  
intersepto verò in visceribus, iecore,  
liene, renibus per vesicā: in mulieribus  
etiam per vterū transitus datur. Nempe  
cuidā ego aliquando abscessum laxio-  
ris intestini dextra in parte prope iecur  
dissecui: multūque inde puris effusum  
est: multū quoque per renes & vesicam  
ad plures dies emanavit: vnde & sanita-  
tem homo adeptus est. Causæ verò cō-  
munes omnium hæ sunt, plaga, crudi-  
tas, frigus, & id gen<sup>o</sup> alia. Porro & qui-  
busdam in pectore diuturna tussis incū-  
bens, & lateris inflammatio, & vomica  
pulmonis, & fluxio longinqua, necnon  
& acuti morbi in aliquod istorum de-  
cubitus purulentia originem præbent.  
At humor aliàs iners imbecillusque  
alij



alij inhæret, aliàs acris & mordax, & ad mortē vsque putrefaciens. Nam & species infinitæ sunt, quas suo loco postea memorabimus. Sed magnum profectò miraculum est, quomodo id fiat, ut ab exili tenuiq; membrana nihil crassitudinis habente, membrana inquam costas interius obtegente, tanta copia puris effundatur. multum enim colligi in multis deprehensum est. Huius rei causa est inflammatio ex sanguinis multitudine oriens, ob quam mēbrana crassescit. verum ex multo sanguine multum in medio pus contrahitur. id si ad interiora subeat, costarum ossa suam propriam sedem obtinent, sed phthisis altera species superius à nobis memorata secundum naturam eueniet: sin ad exteriora prorurat, ossa disiunguntur. in aliquod enim inter costas medium spatium ipsius abscessus acies exeritur: quando in hanc atque in illam partem costarum ossa pelluntur. Notarū autem quædam omnium cōmunes, quædam singulorū affectuum propriæ sunt: grauitas potius quàm dolor, commune



signum est. Pulmo enim dolorem non percipit. febres obscuræ, horrores vespertini, sudores in remissione, vigilia, tumores in extremis pedibus, manuumque digitis subinde consistentes, atque insurgentes: inquietas, cibi abominatio, totius corporis macies. Quod si & in longum mutatio producit, habitus phthisicus redditur. neque enim ultra in officio natura perseverat: quoniam concoctio non fit, qualis antea. inde caro consumitur: color qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis peior, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. quinetiam tussis ab initio tantisper vexat, donec inflammatio quæ urget, perseverat. quando & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & vigilia, & spiritus difficultas adhuc magis crescunt. Venarum motus parvi, torpentes, imbecilli fiunt: mens delirat, pectus distenditur. Verum enimvero si ad suppurationem inflammatio veniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parva est cum maiore tussi, & ex violento abscessu. in primis pituita fertur bile



DE DIVTIVR. LIB. I. IIS

infecta, ad nigritiem vergens, tanquam admixta fuligine, adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proximè rumpenda inflāmatio est, quæ reiiciuntur speciem carnis habent, crassiora quæ sunt. At si iam rupta sit, strangulatus di-  
scrimen impendet, si multum subita-  
neumque pus emanavit: si pederentim verò emittatur, exactè sanitas aduenit. Porro si ad inferiora pus transire velit, partes quidem superiores, ubi erat ab-  
scessus, acutus dolor occupat: alius ve-  
rò humida est, primùm aquosa cum pi-  
tuitolis deiciens, deinde cruenta qua-  
dam circūfluentia: rursumque carnosā,  
cū iam effractus abscessus est. Hæc  
pus sequitur aut per aluum, aut per vri-  
næ vias elabens. Sed materiæ ad renes  
& vesicam trāsmutationes meliores o-  
mnibus sunt. At si pus infra suprāve fe-  
ratur, eius color varius est, pallidus, aut  
albus, aut cinereus, aut liuid⁹, aut ater.  
pus item aut olidum est, aut odore va-  
cans: crassissimum, aut mediocris cor-  
pulen- tiæ: aut læue æquale, aut asperum  
inæquale. Et frustra caruncularum simi-



lia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile abluantur, aut tenacia. Utque in summa de pure dictum sit, quæcunque alba feruntur, concocta, inodora, leuia, rotunda, & celerius extussumtur, aut per aluum deturbantur, hæc tuta & salutaria sunt: quæcunque autem perpallida, biliosa, & inæqualia sunt, ea praua esse scito: sed multo his peiora, liuida & atra. putredinem enim & exedentia ulcera significant. Ad hæc & habitum simul animaduvertere conuenit, & quæ morbum comitantur. nam si excretionem bene tolerat, febre vacat, recte concoquit, bene coloratus est, bene ad cibos se habet, si facile extussum, si arteriarum motus bonus est, si vires firmæ, ægrotus perniciem euadit. At si febris superueniat, omniæque in deterius conuertantur, de salute desperatum est. Præterea & loci abscessibus occupati simul noscendi sunt: quibuscunque enim in osse pectoris, quod sternon vocant, empyema, id est purulentia fit, tarde abscedit. nuda enim, & excarnes, & cartilagineæ partes illæ sunt: eiusmodi verò non fa-



DE DIVTIVR. LIB. I. 117

cile phlegmones redundantiam susci-  
piunt, & absque suppuratione multum  
temporis permanent: siquidem res fri-  
gida cartilagine sunt: sed earum pleg-  
monæ minime nocent. Ipsius verò ha-  
bitus colliquationes prauæ sunt, breui  
enim tempore suppurant. Lienis, iecur,  
& pulmo, & interseptū celerius quidem  
pus ducunt, sed periculosa & mortife-  
ra sunt.

DE PVLMONIS AB-  
scessibus, cap. X.

**Q**Vicunque pulmonia laborant, si pi-  
tuita sit, nisi diffundatur, super-  
stites erunt. hi verò morbi primum im-  
petum euadentes purulenti fiunt. Futu-  
ri quidē, aut iam perfecti abscessus in-  
dicia in capite de Purulentis exposui-  
mus. Cū perfectus iam abscessus est,  
non vi ac laboribus ad eum rūperidum  
reiicien dūmque, quemadmodum in a-  
liis corporibus vsu venit, opus est: sed fa-  
cile per superiora excernitur: cū magis  
in raritatibus, quàm in corporis habitus

H 3



distentio fiat. Rarus enim ac foraminu-  
lentus pulmo est, spōgia similis, humo-  
rem haud moleste ferēs: qui aliam post  
aliam inanitatē eo vsque donec ad aspe-  
ram arteriam deueniat, permutare so-  
let. Circuitus autē humori faciles sunt,  
quandoquidem flexile atque lubricum  
pus est. Respiratio etiam sursum spiritū  
efflat. Sæpius autem mortem effugiunt,  
nisi aliquando quā spiam subitanea ac  
multi humidi attractione stanguletur:  
quod arteria puris multitudine obstru-  
cta aerem non recipiat. Horum nonnul-  
li progressu temporis moriūtur, quem-  
admodum phthisici aut purulenti ex-  
tingui solent. Sputa verò candida sunt,  
spumantia, cum saliuā permixta, aliās  
cineracea, aut subnigricantia. Et bron-  
chia, id est asperæ arteriæ circuli, non-  
nunquam expuuntur ob vlceris varie-  
tatem, si altē abscessus penetrat: quando  
& fragmenta visceris expelluntur. Rau-  
cescunt, breue spirant, grauem vocem  
edunt: ipsorum pectora latefcunt, & la-  
tioribus humiditatis causa indigent: o-  
culorum nigræ partes fulgent, albæ ve-



DE DIVT VR. LIB. I. 119

rò albissimæ fiunt, ac pingues: malæ rubet, venæ in facie clatæ ac tumide sunt. Mirum est autem in his, quòd tenor quàm pro corpulentia maior est, animi verò alacritas & constantia tenore potentior.

DE ASTHMA TE,

siue anhelitu,

cap. XI.

SI à cursu, exercitationibus, & quolibet negotio spiritus ægre redditur, asthma Græcè, anhelitus Latinè vocatur. Morbus quoque ille, quem Græci orthopnœan dicunt, & ipse asthma nominatur. in accessionibus enim & ipsi anhelant. Orthopnœan verò appellant, quoniam erecto duntaxat corpore facile spiritum ducunt. decumbêtes enim strangulantur. propter extentionem igitur quæ in spirando adhibetur, affectui nomen orthopnœa, id est recta spiratio, inditum est. Erectus enim homo ad respirandû extenditur. at si supinus decubuerit, strâgulationis instat periculum. Afficitur autê pulmo, simul etiam quæ

H 4



spirationi conducūt, afficiuntur, inter-  
septum & pectus. At si cor vitiatum sit,  
nunquam diutius vita produci poterit.  
hoc enim loco spirādi viuendique ini-  
tium situm est. Causa est frigiditas spi-  
ritus, atque humiditas: materia verò,  
crassi interiūsque abditī humores.  
Huic vitio mulieres opportunæ sunt  
magis quā viri: quandoquidem & hu-  
midæ & frigidæ sunt. Pueri facilius q̃  
hæ liberantur. nam ipsoꝝ natura in  
incremento est, quæ valentissime cale-  
facere potest. Viri tamen nō facile hoc  
morbo capiuntur, citius tamen capti pe-  
reunt. Differtur autē interitus quibus-  
cunque opere cōficiendo, aut lanis ela-  
borandis pulmo incalescit, & accendi-  
tur: quemadmodum calcis opificibus,  
aut ærariis, aut ferrariis fabris, aut ignis  
in balneis excitatoribus. Morbi verò  
incipientis notæ huiusmodi sunt, gra-  
uitas pectoris, tarditas ad opus solitū,  
& ad aliud quodlibet gerendū: in cursu,  
aut ī accliu itinere difficilis & ægra spi-  
ratio: raucescunt, ac tussunt: flatus in  
præcordiis, atque eructationes præter



rationem excitantur: vigilant, noctu parum, & obscure incalescunt: nares acutatas, & ad spirationem paratas habent. Si malum in peius ruat, malæ rubent, oculi prominent, veluti in his qui strangulantur: stertunt, dū vigilant: multo magis, cū dormiunt: humida, obscura, sonoque carens vox est: multum & frigidum aerem cupiunt: sub diuo ambulāt. quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parua & angusta est. Erecti spirant, tanquam omni aere attracto potiri cupientes. præ aeris autem cupiditate & os aperiunt, patefaciuntq; , tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies præter malas, quæ rubent, pallida est: sudor circa frōtē & iugula emanat: assidua & aspera tussis infestat: reiiciuntur pauca, tenuia, frigida, veluti quædā spumę efflorescētia: inflante spiritu collum intumescit, præcordia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus parui, crebri, atque depressi: crura exilia. Quod si hæc ulterius crementum acceperint, instar comitialis morbi nōnunquā hominem strangulant. At si vertantur in melius,



tussis longior, & rarior fiet: plura excernentur saniosa sputa, & humidiora: multa per ventrem aquea exturbabuntur: vrina copiosa scateriet, licet nondum quicquam in ea subsidat: vox sonatior, clariorque reddetur: somni longiores, quantum satis fuerit, efficientur: praecordia remittentur: dolor interdum ad scapulas in remissione transiit: anhelitus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate fit. Ita sanè mortem effugiunt: sed in morbi cessationibus, licet ipsi nō decumbentes obambulent, secum tamen morbi signa circumferunt.

DE PULMONARIIS,  
cap. XII.

**A**Nhelitus species pulmonarium est, quod Græci pneumôdes vocant: & à pulmone vitium, quemadmodum & anhelit<sup>9</sup>, oritur. Quæ insunt enim, vtrique communia sunt, & exigua differentia est. nam spirandi angustia, & tussis, & vigilia, & caliditas vtrunque vitium comitantur. item in cibos odium, & to-



DE DIVTVR. LIB. I. 123

rius corporis extenuatio. Id enim malū  
cūm fœdum sit, producitur: neque tamē  
anni spaciū excedit. Nam si autumnī  
tempore ægrotare quis incœperit, vere  
aut æstate futura vitam finiet: sin hye-  
me, sequenti autūno moriturus est. In-  
terdum & senes in hanc labē facile in-  
cidūt, & exterriti. Ea correptis leuī mō-  
mento ad perniciem opus est. omnes si-  
millimē spiratione priuantur: arteria-  
rum motus parui, crebri, infirmi sunt.  
sed hæc & in anhelitu reperiuntur. Pri-  
uatim verò hi tussiunt, tãquam aliquid  
expulsuri, cūm tamen irritus eorum la-  
bor sit, nihil enim reiiciunt. verū si quid  
ex pulmone vi extruditur, illud exiguū,  
album, rotundum, grandinosumque est.  
Pectus in his latius vtique est, non ob-  
tortum, non vlceratum. Tametsi autem  
pulmo non suppuret, humorum tamen  
veluti concretorum plenus est. Tempo-  
ris intercapedines inter huiusce morbi  
accessiones lōgiores sunt. Nonnulli ex  
his celerius suffocati sunt, q̃ aliquid de-  
terius omne corpus inuaserit: nōnullis  
vero in hydropē circa ilia, aut in eum



qui anasarca dicitur, morbus iste mutatur ac desinit.

DE IECORE, cap. XIII.

**I**Ecur lieni in generationē æquilibre est. dextrā enim læuāque partē hæc viscera occupant, naturaliter paria numero, sed facultate tam in sanitate q̄ in morbis imparia. In sanitate quidē, quoniam principatum alimenti iecur obtinet. si quidem venarum radicatio iecur est. Quinetiam in morbis ad sanitatem consequendam multò quā̄ mors valentiorē causam habet. Igitur quanto ad sanitatem iecur melius est, tanto & deterius à morbis afficitur. Etenim celerius & violētius inflāmur: & frequentius perniciosiusque abscessum patitur. At duro tumore qui scirrhus Græce nūcupatur, affectū velocius, atque dolentius q̄ lienis, interficit. Quæ ad inflammationē attinēt, in libro de Acutis morbis proposui. Quòd si in pus conuertitur, dolor acutus ad iugulū vsq; , aut & ad summū humerū pertinet. Nam præ



DE DIVTIVR. LIB. 4 125

onere interseptū, vnde iecur suspensum est, detrahit: interseptū verò membranā costis substratā degravat: ipsum enim illa consequitur: quæ planè ad iugulū vsque & ad summū humerum extenta est, atque hæc omnia simul ad inferiora detrahuntur. Ignis acer cū horribus in suppuratione exoritur. tussis arida nō admodum crebra diuexat: colore herbaceo ægri tinguntur: si largius colorentur, in auriginem incidunt, in albidum vergentes: somni haud ita visis imaginibusque vacāt. Prudētes verò cū sint in omnibus, in aliquo tamē ad tempus oblato repente delirant, ad seque protinus reuertuntur. Tumor sub māmīs, aut sub costis oritur: multi autē membranæ peritonæi tumorē esse falso crediderūt. Verū si tumor sub spuriis costis fiat, cū premitur, dolor excitatur: iecur intumescit. humiditate nanq; refertum est. At si non sub osse remaneant, inflatur membranæ signum. Et ipsius quidem circumscriptio & fines patent: post enim fibrarum circumductum in vacuum abdomen comprimēs



manus descendit ac subsidet. Peritonæi  
verò interminata duritia est: & extremi-  
tatis processus nequaquā cernitur. Por-  
rò si ad interiora subit abscessus, longè  
medico natura præstat. aut enim ad in-  
testina, aut ad vesicam pus cōuertet. ve-  
rum multo innocentior est in vesicam  
via. At si extra feratur abscessus, ipsum  
non secare utique malū est. nam si præ-  
termittatur incisio, à pure iecur erodi-  
tur, nullāque mortis dilatio est. Si seca-  
re autem malis, profluuij sanguinis pe-  
riculum instat, statimque hominē perdi-  
contingit. nam sanguinis è iecore pro-  
fusio coerceri nullo modo potest. Igi-  
tur si aliquando necessario ad sectio-  
nem venire cogeris, vstorium ferra-  
mentum candens perspicuumque ab  
igne accipito, & vsque ad puris locum  
intrudito. idē enim tibi & secat & cō-  
burit. Quòd si homo periculum euadit,  
tum pus album effluet, concoctum, læ-  
ue, olidum, quoniam crassum est. istis  
febres & acerba remittunt, omniāque  
facile mulcebuntur. Verum si in in-  
testinū pus effunditur, ex aluo primum



DE DIVTIVR. LIB. I. 127

aquea feruntur, postea humori in quo  
sint lotæ carnes, simila: item qualia in  
torminibus, vbi vlcerata intestina sunt,  
exire solent. interdum cruentum virus,  
interdum cōcretus sanguis effunditur.  
fertur & bilis flaua, syncera aut porra-  
cea, & postrema interitum afferens, ni-  
gra bilis. Si non suppurat vlcus, & mali  
odoris quædam veluti putredinem ven-  
ter expellit, crudum alimētum præter-  
fluit ob ventriculi intestinorumque in-  
temperiem. neque enim bene se habēs  
iecur iterum ea concoquit. postea ignis  
acer suboritur, omniæque in malū pro-  
labūtur. carnes colliquatione tabescūt,  
motus arteriarū parui sunt, & ægra spi-  
ratio. vbi haud ita multo pōst vitæ finis  
imponitur. Cæterum quibusdam dif-  
ficultas quidem intestinorum vlcusque  
sanata sunt, morbus tamen in aquā in-  
tercutem desit. Quod si omnia remit-  
tantur, pus album sit, læue, æquale, ino-  
dorum, venter deiiciat, & cibaria con-  
coquat, homo in bona spe est. Optimū  
verò est per lotiū crisin fieri. hac enim  
securior est, minúsque maleficus puris



transitus. Verum si à phlegmone iecur  
nō suppurat, nemini dubium fuerit, tu-  
morem durum subsidētem in scirrhū  
mutari ac stabiliri: quando continuus  
dolor non infestat: cūque adest, ob-  
tus inērsque sentitur: rara verò & ca-  
lidity: à cibis alienatio, ab amaris dele-  
ctatio, à dulcibus contristatio: horrore  
afficiuntur: subalbicāt, virent: lumbi ac  
pedes tument: facies corrugatur: venter  
squallet: deiectiones crebrę fiunt. malo-  
rum autē colophon aqua intercus. Post  
aquam intercutē, si multa vrina & cras-  
sa feratur, multūque in ea limosi sub-  
fideat, & cum impetu erumpat, humorē  
illum intercutaneum effluere posse spe-  
randum est: si tenuis autem, subfidentia  
carens, paucāque vrina exeat, aquā in-  
tercutē auget fouētque. Quòd si pri-  
stinas vires natura recipiat, & quando-  
que per vētre[m] cum impetu materia  
deturbet, post multorū, crassorū, aquo-  
sorūque depulsionē & ipsum hydro-  
picum morbum tollere consuevit. Ve-  
rum id genus auxiliij cum periculo est:  
post enim subitas & copias inanitio-  
nes,



## DE DIVTIVR. LIB. I. 129

nes, extremosque casus prostratis interdum viribus, quemadmodum in sanguinis profluvio accidere solet, agri interierunt. cum minori autem noxa morbum sudor, si liberalius effluat, dissolvit. Hydropici nanque haud ita multum in summa cute humectari solent. atque morborum iecoris hic finis est. Quando in iecore pus nascitur, \*

Adolescentes, & qui usque ad consistentem aetatem pervenerunt, his vexantur morbis: mulieres minus his patendis expositae sunt. Huiusmodi vitiorum causae numerantur, victus intemperantia, & longa valetudo. praesertim post difficultatem intestinorum, & colliquationes. quandoquidem & eos syntecticos, id est colliquatos nominarunt, qui post ulcera iecoris tabefacti moriuntur.

## DE LIENE, cap. XIII.

**L**eni familiaris locus morbus est, quem scirrhum nominant. Purulentia vero haud ita facile, quandoque tamen efficitur: cum dolor non asper, tumor au-



tem ingens spiratione maior exoritur. Siquidem in dextram partem ad iecur usque tota communione increfcere visus est. vnde multi vt fallerentur in causa fuit, tanquam nō lienis, sed membrana affecta esset. nam peritonæon quod Græci vocant, inflammatione occupari isti existimant. contumax autem atque indomitus instar lapidis tumor est. talis plerunque à scirrho lienis efficitur: quando & ambiguitas difficultasq; maxima simul adest. Verum si forte suppu- ret, tractabilis est utiq; & in parte summa, vbi puris quoque creatio est. tactui cedit. quando verò pus non ducit, tactui omnino resistit. Porro nonnunquā scirrhus totus super ventrem suspensus est, in hanc atque in illā partem, prout impellitur, delabens: donec, pusillus cūm sit, locum ad fluitandum habet. Adest nausea & anxietas: maxime cum instat eruptio. Incrementi autem notæ sunt febres, dolores, & horrores, multoties enim horrent: nonnunquam verò non horrent, cūm breui caliditate & dolore vacent. hac de causa interdum & in sple



ne abscessus oriens latuit. rarum enim, & sensu carēs in sanitate quoque viscus est. Turgēt isti, atque humoris, tanquam hydropici, pleni sunt, atro colore viridi admixto suffusi, ægre omnia patientes, pectore veluti pondere oppresso graviter spirantes. evidens enim malum est. usque ad superiora spiritu venter impletur crasso, caliginoso, humido quidē ad speciem, cū tamen non sit humidus. tussis adest, multūque irritantur, sed pauca sicca extruduntur. Venter si quē infra depellit aquosa, primò paulū subleuat, deinde si largius deiecit, hominem quidem tabefacit sed nihilominus iuuat. At si & abscessus ruptus fuerit, pus utique purum & concoctum nunquam excernitur, sed subalbidū & cinereum, quandoque sæculentum, aut liuidum. quòd si & profundior abscessus fuerit, nigra etiā fertur humiditas: quando & aliqui fucci lienis, qui simul tabescit, particula exprimitur. Quibusdā præterea & integræ lienis partes exierunt: siquidem & natura dissolubilis lienis est. Cæterum si morbus ulcere nō



substitit, sed in longum tempus extrahitur, cibos auersantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu foedi, multis vlceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent. rotunda, liuida, concaua, sordida, ægre sanabilia vlcera sunt. sicque demum tabefacti interiере. At in exiguo tumore cum duritia & renixu indolentia est. vnde fit, vt isti longiorem vitam ducant. Verùm si ab affectu superentur, aqua intercus, aut phthisis necessario sequitur: & corporis eliquatio superuenit. atque iste sanè pernicioei modus ipsos è vita migrare compellit.

I. ueri ac iuuenes facillè calamitatem hanc patiuntur, facillèque inde liberantur senes verò non facillè utique larduntur, sed affecti euadere interitum nequeunt. Quinetiam seniores quidam nescientes ipsi vitio lienis absumpti sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque aegritudo tabidos facit: & iuuenibus ocium maximè nocet, quicunque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidiaque tradant: loca palustria, aquæ



DE DIVT VR. LIB. II. 133

exuberātes, falsæ, virosæ. Inter anni tempora ferinus autumnus.

DE MORBO REGIO,

cap. XV.

**S**I bile flaua, vitellina, aut crocina, aut nigra cū viridi mixta omne corpus à viscere suffusum sit, affectus hic à Græcis icterus, à Latinis regius morbus, siue arquatus, siue aurigo dicitur. Difficile utique in acutis malum est: quia nō solum ante septimum apparens, sed etiam post septimū infinitos necauit. raro autem ad extremum febrem bene indicauit: ipse verò haud facile discutitur. Neque vitio iecoris tantummodo prouenit, vt nonnulli medicorum existimant: sed & ventriculus, & lienis, & renes, & laxum intestinum in causa sunt. & ab iecinore quidem nascitur, si phlegmone, aut scirrho viscus illud opprimitur, à solito tamen munere non impeditur. creatur enim in iecinore bilis, eamque in iecinore posita vesica secernit. Verum si meatus ad intestinum bilem deferentes phlegmone, aut scirrho in-



terclusi fuerint, vesica autem exundauerit: bilis retro labitur. Cū sanguine igitur miscetur, qui per totum corpus discurrens, secūmque bilem vehens in omnia membra diffundit: atque ita corporis species bile tingitur. Stercora vero albida sunt, & argillam referentia. neque enim bile colorantur, quoniā humoris eius affluxu carēt. idcirco & venter valde siccus est: siquidē bile nec maddet, neque stimuletur. color autem ad albedinem vergit. Si morbus regius ab liene ortum habeat, color est ater cum viridi mixtus. ipsius enim atra bilis alimentū est: cū sanguinis atrī effigies quādam ac simulacrum sit. cuius purgamenta non suscipit, neque elaborat lienis agrotans. inde fit vt per omne corpus cum sanguine dilabantur. Propterea lienis arquato laborantes cum viriditate quadam nigricant. ipsorum quoque consueta stercora nigriore colore imbuta sunt. nam quod alimenti in splene abundat, ad vias exitus tanquam recrementum propellitur. A laxo etiam intestino & ventriculo arquatus proue-



nit. vbi concoquēdi facultas in ventri-  
culo & laxo intestino, quod Græci co-  
lon nominant, læsa fuerit. nam & in co-  
lo concoctio efficitur, & ab ipso alimē-  
tum in iecur digeritur. Igitur si aliud  
alimentū crudius iecur susceperit, pro-  
prium quidem elaborat, & cōficit, alic-  
nū verò dimittit. sanguis enim qui di-  
stribuitur, coli cessationē atque inertia  
retinēs, in omnē partē labens eam disse-  
minat. in colo autē cruditas ipsius bilis  
effectrix est. Hūc sanè in modum ab om-  
nibus vīceribus arquatus oriri poterit,  
non modo ab iis quæ iecori escā sugge-  
runt, sed etiam ab iis quæ à iecore su-  
scipiunt. Neque enim per canales dūta-  
xat sensiles, sed multo copiosius per ha-  
litus natura in omne corpus alimēta di-  
stribuit. qui à toto in totū natura ipsos  
per solidas ac densas partes dirigēte di-  
scurrere facilè queunt. gignuntur itaq;  
halitus bile infecti: & corpus, vbi insede-  
rint, colorāt. Nempè per aluū laborante  
colo non fit albida excretio: iecur enim  
creandis succis nullam noxam patitur,  
exitūque bilis ad intestina patentem



habet. Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandum sum-  
mopere efficax est. habet enim & in to-  
to causam, quæ huiusmodi est: In omni-  
bus corporis partibus calor ad conco-  
quendum insitus est: in omnibus item  
humorum est creatio ac separatio. sed  
aliorum alia, singulis autem propria.  
ut puta in carne sudor, in oculis lachry-  
ma, in articulis & naribus mucus, in au-  
ribus cypselis Græcè dicta, Latini auriū  
marmorata, seu cerumina vocāt. Itaque  
si ad singula obeunda munera calidum  
fatigatū lassatūque fuerit, ipsum qui-  
dem in acre atque igneum vertitur, hu-  
miditates autē omnes in bilem abeunt.  
ignis enim opera amara & bile infecta  
sunt. quod si & in sanguine cruditas in-  
cidat, sanguis biliosus efficitur, & quo-  
quo versus nutriens dispergitur. Pro-  
pterea & ubique bilis conspicitur. Planè  
acerbum id malum est, color verò spe-  
cie horribilis. etenim colore aurum re-  
præsentant: sed non hominē decet, quod  
in lapide pulchrum fuerit. At superua-  
uum mihi videtur, vnde id nomē iſte.



DE DIVT VR. LIB. I. 137

rusticū fuerit, explicare: praterquam  
à terrestribus feris quadrupedibus, quas  
Græci ictidas, Latini viuerras, aliqui  
martes vocāt. & syluestris mustellæ spe-  
cies est. his enim bestiis oculi huiusce-  
modi colore tincti sunt. Due sunt huius-  
ce labis species aut enim in flauum cro-  
ceūque vergit, simulq; albicat & vi-  
rescit: aut in liuidum nigrūque decli-  
nat. atque adeo istorum causa & ipsius  
bilis causa est. Aliqua enim bilis flaua  
est, subtilis, perspicua, tenuioris generis:  
aliqua magis colore saturata, ut crocū,  
aut vitellum eiusdem speciei quis affir-  
met. Secunda bilis species nigrioris co-  
loris est, porri, aut illatidis herbæ colo-  
rem referens, atra. inter hæc extrema  
infinitæ sunt colorum varietates. penes  
autem calorē atque humiditates ista-  
rum mutatio fit. Quinetiam viscera hu-  
iusce varietatis causæ sunt: ut puta si fla-  
uum viscus sit, quale iecur est: aut liui-  
dum, qualis lienis. Quocirca si ab ali-  
quo viscere atquat' oritur: à iecore qui-  
dē iecoris notæ sunt: à liene, lienis: sin-  
gulorūque, vnde oritur, membrorum:



indicia apparent. Si nullius membri signa videantur, vniuersi habitus ægritudo est. Perspicua vero sunt & ea quæ in albisimis oculis cernuntur. Frontis autem secundum tempora, in corporibus naturaliter albis præcipuè, & in paruo arquato color exquisitior efflorescit. Porro quicunque nigro arquato laborant, in his ater color viridi commixtus apparet. iidem frigēt: imbecilli, desides, tristes atque demissi animo sunt. tetrū odorē exhalant, gustatum amarum habent: spiritus non facile ducunt: in ventriculo morsum percipiunt: alui excrementa porracia, subnigra, arida sunt, ægrèque descendunt. vrina bene colorata est, ad nigrius vergens. ad hæc cruditate laborant, cibum detestantur, vigilant, mœrent, melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & viridi temperatus: mente sunt hilariores: cibos accipere primò eos piget: sed vbi cœperunt, nauiter comedunt, facilius quàm priores concoquunt: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea. lotium reddunt flauum, pallidum, cro-



cinum. In vtrisque corpus omne pruriginosum est: calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam biliosum distrahit laniatque: gustatus amarorum quidē non amarus, quod mirum est, non tamen dulcis: dulcium verò amarus. in ore nanque bilis in lingua residens, & prius cibis occurrēs sensum hunc ludificatur ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos nō sentit. atque antea quidem ieiunij tēpore bilis quiescit: neque idcirco lingua propter consuetudinē ægre fert: verūm si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis obiecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, amari sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. bilis enim sensio preuertit. Falluntur autem qui amara videri dulcia existimant. res enim haud ita se habet: sed quoniā membrum amaro aliquo delibutum duntaxat propter morbi cōsuetudinem amaritiem non percipit, ideo speciem dulcescētis repræsentat. verūm in dulcibus & amaris cibariis idem status reperitur. fallacium igitur ciborum velamentum



bilis est. Vtique si nullius visceris calefactio evidens fuerit, plerunque sine noxa arquatus est, sed diuturnior. si perseverauerit, atque insuper viscus inflammatione vexatū fuerit, in aquā intercutem, & malum corporis habitum ut plurimum definit. Plerique & sine aqua intercute colliquati interiire. Id malū adolescentulis iuuenibūque familiare est: quibus & minus officit. Tueris autē non admodum inusitatum, non omnino tamen innoxium est.

#### DE CACHEXIA, SIVE

malo corporis habitu,  
cap. XVI.

**O**Mnium simul vitiorum malus habitus conuersio est. Siquidem ab omnibus morbis propagatur & emanat. Verum & ipse solus citra alios morbos materiam multū lutulentam nactus, à principio noua agritudo gignitur. Et habitus quidem malus, simplex, cōmunis est, & symptomata multa comitantur: nomenque ipsum significāter inditum est.



DE DIVTIVR. LIB. I. 141

Gracilitas verò, aut pallor, aut tumor,  
& si quid aliud infit, ad tempus durās in  
corpore exoritur: malus autem habitus  
vnius ingentis affectus species est. eique  
nomen tale fuit impositum. Nam homi-  
nis ad omnia bonus habitus est: & ad cō-  
coctionem, aut ad distributionem san-  
guinis creatio, atque omnis naturæ fun-  
ctio inde provenit. hæc consequitur fa-  
cilis spiratio, validæ vires, florid⁹ color,  
sed prima omnium sanitas. Quod si ad  
imbecillitatem vitiosorum corporis hu-  
morum, quæ caco-chymia à Græcis di-  
citur, natura conuersa fuerit, id iam ni-  
lus habitus est, quem Græci cachexiam  
nominant. Valetudo hæc vix sanabi-  
lis est, malūque longissimum. longo  
enim tempore acquiritur, neque ab vno  
corporis vitio, neq; ab vno viscere pro-  
diens. sed omnium est in deterius con-  
uersio. Quocirca ab hac enascētes mor-  
bi inevitabiles sunt, vt puta aqua inter-  
cus, aut phthisis, aut eliquatio. Siquidem  
& mali habitus causæ colliquationis ger-  
manæ sunt. Morbus autē in multū tem-  
pus extrahitur: intestinorum difficultas



adeſt continua: quibuſdam morborum  
reuerſiones eueniunt. bene utique cibos  
appetunt, tametſi multos ingerant, ac  
repleantur: crudi vero & nō cōfecti di-  
geruntur. quoniam alimenti elaboratio  
ad cōctionem pertinens, debilis admo-  
dum atque inualida eſt. Labis hu-  
ius cauſae ſunt & ab hæmorrhoidibus  
quas vocant, venis eſſluuij ſuppreſſio,  
& vſitatorum vomituum retentio, &  
ab exercitationibus quies, & ſudorum  
exiccatio, & ab ingētibus laboribus o-  
cium. quando enim horum ſingula, quę  
aderant, non amplius reuertuntur: tunc  
ſequitur corporis grauitas, pallor ſub-  
inde repetens, venter flatibus reſertus,  
oculi concaui, ſomni graues torporem  
afferentes. Verum enimuerō hęc ſi erra-  
ticę, & non ſtatis temporibus ſiant, mor-  
bi inconstantiam infirmitatē que ſi-  
gnificāt: ſi autem exactis radicibus ma-  
neant, neque deſiſtere velint: ingētis ma-  
li nūcia ſunt. Stantibus pedes tibięque  
intumeſcunt, decūbentibus autem par-  
tes decliues atque iacētes. Quod ſi de-  
cubitum mutauerint, tumor in illas de-



DE DIVTVR. LIB. I. 143

cūbentes partes deuoluitur: humidique  
aut frigidi in grauitatem fit circuitus.  
nam si calor humidum euaporet, id ve-  
rò nō effundatur, postea delabetur. Mul-  
tos vtique cibos appetunt, edaces admo-  
dum sunt: celerior concoctione distri-  
butio fit crudiorum magis q̄ inconco-  
ctorum. nutritio non perficitur. Sed  
hoc inde prouenit, quoniam in toto ali-  
mentum à natura non concoquitur. in  
ventre enim atque in omni corpore ca-  
loris imbecillitas eadem est. quapropter  
neque optimus, neque boni coloris san-  
guis procreatur. cūque crudorum suc-  
corum omne corpus refertum fuerit, &  
ciborum appetentia euanescat: sic malo  
habitu vsque ad ventriculum grassante,  
& affectu iam summam potentiam ob-  
tinente, tunc sanè tumidi fiunt, imbecil-  
li, & ad omne opus abiecto prostratoq̄  
animo. Alius ficcior est: plerunque re-  
crementa bile priuata, alba, aspera, cru-  
daque deiciunt: corpore squalent, fu-  
dore carētes & pruriginosi. somnus ne-  
quaquam firmus est, sed decūbentes cō-  
niuent tarde spiritū ducunt: arteriarum



motus languidi sunt, debiles, frequētes: post quālibet autē vel exiguam actionem frequentissimi fiunt. Post hāc respiratio cum anhelitu fit: venæ in temporibus elatæ apparent: partes enim quæ circumiacent, emarcuerūt. verūm & in brachialibus longe grādiore inflatōne venæ redditæ sunt: sanguis atro colore viridi admixto infectus est. Ab his phthisis, aut colliquatio hydropē anasarca vocatā, aut ascitem adducit: istorūque procreatio ineuitabilis est.

Ætates huius morbi feraces sunt in primis senectus, neque mortem euadūt. Pueri & celeriter pati idonei sunt, & liberantur facilius. Florentes ætate haud ita valde huic malo patent, non tamen penitus facilē sanantur. Tempus anni non vnum hanc fert ægritudinem, neque vno tempore finitur: verūm autumnus cōcipit, hyems alit, ver ad vltimā vehementiam perducit, æstas verō interficit.



AR ET AE I CAP  
padocis medici

DE SIGNIS ET CAUSIS  
diuturnorum morborum,  
Liber secundus,



IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

Hæc insunt in hoc libro.

De hydropo,	cap. I.
De diabete,	cap. II.
De affectibus renum,	cap. III.
De vitiis vesicæ,	cap. IIII.
De seminis effluuio,	cap. v.
De stomachi vitiis,	cap. VI.
De ventris affectu,	cap. VII.
De dolore intestini coli,	cap. VIII.
De difficultate intestinorum,	cap. IX.
De læuitate intestinorum,	cap. X.
De affectibus vteri,	cap. XI.
De articulorum & coxendicis morbis,	cap. XII.
De elephantiasi,	cap. XI I.

K



## DE HYDROPE, HOC EST

aqua inter cutem, cap. I.



Qua inter cutem, quā  
Græci hydropa vocāt,  
iniucundum aspectu  
vitium est, & toleratu  
difficile. ab ipso enim  
perpauci liberantur:  
icq; felicitate quadam, ac Deorum po-  
tius quā artis auxilio. Maiora enim  
omnia vitia soli Dij medicantur. Nam  
aut in viscere primario morbus delite-  
scens totum in malum habitum conuer-  
tit, aut omne corpus ingruente pestilen-  
tia in malum succum viscera permuta-  
uit. quādo sibi vtraque vicissim ad per-  
niciem suffragantur: nullaque est pars  
noxa carens, quæ vel modicam naturæ  
opem afferre possit. Est autem ad hume-  
ctationem fluxio frigida, crassa, qualis  
est nebula vniuerso: aut cōuersio ab hu-  
mida & frigida causa in talem habitum  
hominem permutante. Neque enim in  
inferiori ventre fluctuans humidū hy-  
dropa nuncupamus: quandoquidem ne-



DE DIVTIVR. LIB. II. 147

que ibi vitium est: sed cū morbū con-  
sequitur tumor, inflatio, coloris fœdi-  
tas, iste in aquam habitus colliquescent  
hydrops & est & appellatur. Nā tamet si  
nonnunquam foras sponte aqua prorū-  
pit, aut aliquis præcordia rescindens ef-  
fundit: adhuc in sede sua permanent hy-  
dropici. Princeps itaque causa malus ha-  
bitus est, species autem plures. verū &  
eius nomen aliud atque aliud. nam si sit  
humida suffusio, quæ in ilibus fluitet, &  
præ inflatione, cū verberantur, tym-  
panum quodammodo referant, tympa-  
nias nominatur: at si aqua copiosa in pe-  
ritonæo continetur, natantq; in humo-  
re intestina, ascitem eam cognomina-  
runt. sin autem ilia nihil istorum ha-  
beant, sed omne corpus intumescat, si ex  
alba pituita crassa, & frigida, phlegma-  
tias ei nomen est: si in humorem sangui-  
neum, aquosum, tenuem, carnes liqua-  
tæ fuerint, hydrops anasarca generatur.  
præva quidem est harum singularum  
constitutio, peior autem multo ipsarum  
permixtio. Nam earum quæ in ilibus  
sunt, vna vni earum quæ totum corpus

K 2



inflant, sociari nonnunquam consuevit. Difficillimus est autem tympanias cum anasarca vocato copulatus. Ex occupantibus enim ilia, tympanias ascite improbius est: ex intestatibus verò totum corpus, leucophlegmatias quam anasarca benignior. Mitis quidem ut in desperatis morbus est, si minor species cum minori pariter coniungatur: peior verò, si aliqua ex minoribus cum altera ex maioribus admisceatur. Quòd si duarum maiorum mixtio exactè facta fuerit, grauius inde malum exoritur. Notæ autem maximæ sunt, & visu, & tactu, & auditu facillimæ. In ascite nanque in ilibus tumorem, in pedibus inflationem videre licet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intumescunt testes, præputium, & totus colis ob inæqualitatem tumoris tortuosus est. tangito verò, & aliquam in partem manum imprimens: intrò moderate pellito. ad alias enim partes humiditas transluet. Verum etiā in corporis ad alterutrum latus conuersionibus humor in locum declinans & tumorem & fluctuationem facit, flu-



Et quantisq̃ liquoris sonitus exauditur.  
 quinetiam sicubi digitum impegeris, lo-  
 cus cauus efficitur, & multum temporis  
 cauus perseverat. Hæc utique ascitem  
 signa declarant. Tympanias autem vl-  
 tra tumoris spectaculum, etiam auditu  
 sonorus est. nam ad palmæ percussum  
 abdomen sonum edit: neque ad corpo-  
 ris conuersionem spiritus locum mutat.  
 etsi enim locus ambiens aliquorsum in-  
 clinat, spiritus tamen æqualis supra &  
 infra vbique permanet. Caterum si in  
 nebulam & aquam spiritus vertatur,  
 (nam ascites ex tympania gignitur) si  
 non perfectè mutatus aliquando fuerit,  
 ex dimidio factus in ventre fluitat. Cæ-  
 terum anasarca & leucophlegmatias  
 ilia inania occupant: tumidam faciem  
 & brachia reddunt: & quæcunque in a-  
 liis vacua sunt, in huiusmodi ægrotis op-  
 plentur. Quandoquidem in leucophle-  
 gmatia alba pituita, frigida & crassa  
 redundat: hac omne corpus impletur: fa-  
 cies, collum, brachiaque tumescunt: ab-  
 domenq̃ ex inflatione crassescit. mam-  
 mæ quoque in tumorem excitantur il-



lis scilicet, qui iuvenes robusti in ætatis  
prospera fortuna cōsistunt. At in hydro  
pe anasarca vocato, carnis liquamētum  
fit in succum speciem carnis referētem:  
faniesque cruenta, qualis ab intestino-  
rum vlceribus emanat. talis verò & à  
membris aliquo graui, quod superinci-  
derit, contusis, si paulum superficiem se-  
cueris. humor effunditur. Ex duab<sup>9</sup> qui-  
dem speciebus permixtio ambarum in-  
dicia obtinebit. Omnibus verò simul  
inest pallor, spirationis difficultas, tuf-  
fis. diuersis temporibus segnes sunt: pi-  
gritia multa, à cibo alienatio. quòd si a-  
liquid assumant quanuis modicum, &  
flatu carens, nihilominus valde inflan-  
tur: distentiones patiuntur, quales ex fa-  
turitate fiunt. citra madorem eorū cor-  
pus est: iccirco neque in balneis fudore  
madescent. præterea albidifunt, & ef-  
foeminati. Anasarca laborantes colore  
ex atro, viridique permixto infecti sunt:  
obscurasque & nigras venas habent: in-  
ascite atque tympania conspicuæ at-  
que admodum euidentes sunt in bra-  
chialibus atque in abdomine. In ana-



sarca verò atque phlegmatia tumore omnia delitescunt: somni sunt graues, torpentes, breues, animæ deliquium, circa minima quæque sollicitudo, viuendi cupiditas. tolerantia non ex animi alacritate, ac bona spe, vt in iis est qui prospera fortuna vtuntur: sed ex ipsa morbi natura. neque causa dici potest, sed mirari tantum id licet, quod me Hercule magnum est. nanque in aliis haud omnino perniciosus affectibus ægrotantes abiecto sunt animo, tristes, mortis amatores: in his vero & bene sperant, & vitæ cupidi sunt. Ambo hæc contraria morbi efficiunt. Aqua inter cutem nonnunquam à copioso frigide potu continuo prouenit, cum præ nimia siti ad saturitatem quispiam multam aquam gelidam ingurgitauerit: postea humidum in peritonæum delatum sit, atque inde in ventribus insitus calor refrigeratus fuerit. deinde in ilia guttæ effluunt, quæ prius in aerem versæ per transpirationem digerebantur. Id igitur si incidit, facilius est huius morbi curatio, antequam viscus aliquod, aut totus homo affectus sit.



Cæterum & ventosus cibus, & cruditas,  
& buprestes aqua intercutē pepererūt.

Est hæc omnibus communis calamitas, viris, mulieribus, cuicunque ætati: præterquam quod alij in aliam speciem sunt propensiores. In vocatam anasarcam, & leucophlegmatiam pueri: Iuvenes autem ad consistentē vsque ætatem inundationi ilium obnoxij sunt. At senes omnibus quidē generibus sunt expositi, cum inopes sint caloris: frigida enim senectus est. verum ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt. ipsis igitur tympanias accidere consuevit. Omnes quidem species prauæ: hydrops enim morborū omnium vitium est: sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur: nā multæ & variæ sunt eius tollendæ prosperæ occasiones, fudoris aut lotij excretionē, aut alui nonnunquam in huiusmodi ægrotantibus copioso effluuiō, iam abeunte aquæ intercutem habitu. Difficilis autem tympanias est, adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim medicum hoc in morbo totum hominem permutare.



DE DIVT. R. LIB. II. 155

Quod per Iovem neque diis ipsis facile fuerit. Nonnunquam & exigua in parte homo aquam inter cutem patitur: ut secundum caput in eo morbo qui hydrocephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut iecinore, aut liene, aut in mulierum utero. & cæteris hæc species sanabilior. Nam si eius ostiolum à priori cōclusionē hiare cœperit, humorem quidem si habeat, effundit: si spiritum, efflat. quod si uterus anasarca laboret, plurimum tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quædam hydropici morbi species talis agnoscitur: in ea vesiculæ quædam pusillæ, crebræ, humoris plenæ in loco ubi ascites fieri solet, excitantur. Cæterum, quod humore multo refertæ sint, illud indicio est, si abdomen perforaveris, parum admodum humoris effundes. Ab interiori nanque parte vesica occlufit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succus emanabit. Hæc utique aquæ inter cutem species haud levis est: unde enim id genus vesiculæ eruperint, via haud facile reperitur. Alij nanque affir-



mant huiusmodi ampullas per intestina transisse. Ego verò id nunquam vidi: idcirco neque nunc scribendo affirmo. nam siue ex intestino colo, siue ex ventre ferantur, qualis sit ipsarum generationis modus, quid dicam nihil certi habeo. iter enim ad omnium excretionem per sedem lubricum, ac patens est. at ipsius humoris in ilibus collecti per intestinorum rupturam egressio credi non potest. neque enim innoxium, neque citra perniciem intestini vulnus est.

DE DIABETE, SIVE VRINAE profluio, cap. II.

**D**iabetes qui vocatur affectus, miraculum quoddam est, haud ita saepe hominibus vsitatus, carniū, ac membrorum, in vrinam colliquatio. Frigida atque humida, vt in aqua inter cutem, causa est. Transitus autem consuetus renes & vesica. Neque enim cum intermissione lotium reddunt: sed perinde atque canales laxati sint, indefinēs est profusio. Diuturna est huius morbi creatio, & lō-



DE DIVTIVR. LIB. II. 133

go tempore parturitur. Brevis erit autem hominis vita, in quo affectus iste perfectus fuerit: velox enim est colluctatio, & festina interdum mors advenit, & vita fœda est, ac vexata doloribus. Sitis intoleranda est, potus copiosus, multitudini tamen lotij non respondens. copiosius enim lotium redditur: neque eos quisquam neque à potu, neque à mictu inhibere potest. Quòd si vel punctum temporis inhibeantur, si quidem à potu os siccatur, corpus arefcit, viscera ipsi sua conflagrare opinantur, omnia fastidiunt, de omnibus dubitant, haud multo post mortē obeunt, ardentissima sitis adest. Mictum verò quæ ratio suppresserit, aut quæ verecundia dolore potentior? Si autem vel parum temporis à meiando abstinuerint, intumescūt lumbi, testes & ilia: cūque remiserint, lotium quidem calefactione profundunt, tumidæ verò partes detumescunt: in vesicā enim confluit exundatio. Cū morbus iste iam perfectus est, facile omnes eum deprehendunt. Sed cū futur⁹ est, os humore priuatur:



saliva est albida, spumans, perinde atque  
in siti: nondum tamen sitiunt. praecordia  
gravia sunt. calorem aut frigus à ventre  
in vesicam tendere sentiunt, prout aduen  
tantis morbi processus est. quinetiam pau  
lo plus lotij quam moris erat, effundi  
tur: sitis adest, sed nondum vehemens.  
Cumque amplius cremetum accipit, ca  
lesfactio parua quidem, sed mordax vi  
sceribus inhaerens exoritur. abdomē ha  
bent rugosum, venas extantes, totū cor  
poris habitum gracilem, quando & vri  
nae profluvium, & sitis iam auctae in  
signiter sunt. cumque ad extremum colem  
vitij consensus peruenerit, protinus vri  
nam reddunt: atque inde mihi huic mor  
bo diabetes appellatio indita fuisse vi  
detur, perinde ac si pertranseuntem di  
xeris, quod in corpore humor non rema  
net: sed ubicunque in homine collectus  
stagnauerit, ad exitum labitur. Durant  
sanē aliquod tempus, licet non admodum  
diu: nam cum dolore meū, atque atrox  
sit liquefactio. neque enim ex potu ali  
qua insignis portio in corpus absorbi  
tur, & carniū magna copia in urinam



DE DIVTIVR. LIB. II. 157

eliquatur. Huiusce languoris causa aliquis acutus morbus esse potest, qui hæc in partem impetū fecerit, & in crisi aliquod malignum virus latenter morbi reliquerunt. Haud incredibile est etiam aliquod perniciosum venenum ex his quæ vesicam & renes infestant, huic affectui causam præbuisse. Quinetiam si quis à dipsade morsus sit, talis morsum affectus sequitur. Ipsas autem reptilis fera si quem percusserit, sitim non ferendam accendit, isque copiose bibit, neque siti medetur, sed ventrē obruit humore: adeo inexplebilis est bibendi cupiditas. At si quis ob ventris distentionem doleat, graueturque humoris copia, & ideo paulū temporis à potu abstineat. iterum sitiens largissime bibit. Atque hæc est malorum vicissitudo: se namque mutuo sitis & potus adiuvant. Alij præterea sunt, qui lotium non reddunt: neque vlla est alia eius quod bibunt, transpiratio. itaque potius insatiabili aviditate, humoris inundatione, vëtris distentione, repente ac penitus disrupti sunt.



## DE RENVM AFFECTIBVS,

cap. III.

**R**enes substantia glandulas, quas Græci adenas vocāt, referunt: colore autem rubidiores sunt, quale est iecur potius, quàm mammæ, aut testes. nã & hi adenes sunt, verum albiores. Figura testibus similes, lati magis sunt, iuxta & retorti. Sinus habent exiguos ad lotium excolandum, cribrorum instar foraminibus peruios. Ex vtroq; neruosi canaliculi tanquã fistulæ expullulant, qui in vesicæ terga vtrinq; sese inferunt. æqualis est autem lotij à renibus in vesicam via. Huiusce viæ multi atque varij affectus renes, prædictosque meatus male habēt: aliqui acuti sanguinis proflauio, & febribus, & inflammationibus iugulātes: hi verò sunt, quotquot ego ennumeravi: aliqui diurni hominē colliquatione dissoluentes, haud lætales quidem, sed insanabiles, & vna cū ægroto commorientes. Diurni itaq; sunt abscessus, vlcera, calculorū exortus, hæmorrhoides vocatæ. Vlcerata quidem hominis ex ab-



DE DIVTIVR. LIB. II. 159

ſceſſu facta omnia planè diuturniſſima ſunt, atque ægre ſanationem recipiētia. Calculorū verò diuturna eſt creatio, cū dolore obſtructiones: haud enim facilis eſt exitus. ad hæc difficilis eſt & lotij ſuppreſſio. At ſi multi ſint, & exigui calculi, ſeſe mutuò impediētes, remorantur: aut ſi vnus ſit magnus, locorum anguſtiis intruſus inhæreſcit. Atq; ſi vtroque in rene hæc fieri uſu veniat, intercluſa vrina, diſtentiſque locis, paucis diebus ſuperſtites ægri moriuntur. Rectè ſanè natura renum ventrem oblongum, & vrinæ canalibus magnitudi- ne æqualem fabricauit, exiguis quidem calculis ampliorem, quò ſuperius concretuſ calculus expeditiſſimum in veſicam iter inueniat. atque ideo lapilli oblongi generantur. Plerunque enim propè vrinæ fiſtulas id genus lapilli cō- creſcunt: & quotquot eo loco ſunt, inæqualis craſſitudinis ſunt. priori in parte ob canalium anguſtiam gracile- ſcunt, poſteriori autem craſſiores ſunt: quoniam renes deorſum vergunt. in ſo- lis autè renibus oriuntur, hiſque igneo



calore feruentibus. neque enim sedem  
in fistulis vrinae calculi obtinent, sed a-  
renulae cum lotio per eas fistulas infe-  
rius delabuntur, quae & indicia & ma-  
teria huius affectus sunt. Quod si ali-  
quando grandior effectus lapis con-  
cauo renis inhæserit, tunc dolores lum-  
borum circa musculos, quos psoas Gre-  
ci appellant, excitatur, & ad medias vs-  
que costas perueniunt. Multis sanè do-  
lor iste, perinde ac si morbi lateralis ef-  
fet, imposuit. præterea grauitas adest co-  
xendicis: dorsum ægre incuruatur: dif-  
ficulter annuunt: tormina dolores infe-  
runt grauiā, perseverantia: intestinum  
enim siuuosum est. cumque exūdat vri-  
na, & distentiones increſcūt, ad meien-  
dū, vt in parturiginibus prorritantur: fla-  
tuosi sunt, sed flatus excerni nequeunt.  
febres adfunt mordaces, præaride. squal-  
lida quidem lingua, sicca verò est aluus,  
macrescunt, à cibo abhorrent: quod si  
quid assument, neque concoquere, ne-  
que distribuere facile possunt. Sin au-  
tem in lotij canaliculum lapis incide-  
rit, concussio corporis fit, vt in rigore:  
calculi



calculi progressus sentitur cōmuni simul violento. Quod si in vesicam delapsus fuerit, lotium aquosum vberius effunditur: alius deicit: flatus inde exhalant: extensus stomachus est: ructus eduntur: à prioribus malis quies datur. interdum quoque vlcerato canali præter lotium cruor emanat. Secunda porro calamitas est, cum per colem calculus transmittitur. Nam si amplior sit, q̄ vrinæ iter, (Græci vrethram vocant) capere possit, in eo multum temporis hæsit, atque vesica multitudine vrinæ cōpletur: tūque eius maiore cum dolore suppressio fit. nam cum vesica & canales vretes vocati veluti incenduntur. A Egerrime autē tortuosi calculi exeūt: quosdā enim & hamatos vidi, in meatibusque adnatis quasdam callosas duritias. Plerunque autem oblongi propter canalium rectitudinem figurātur. At colore nonnulli albicant, argillā referentes, talesque sæpius in pueris generantur: alij flavi sunt instar croci, hi vero in senibus reperiuntur, quibus & in renibus creari solēt: crebrius enim pue-

L



ris in vesica lapilli oboriuntur. Con-  
cretionis autem causæ geminæ sunt: in-  
fenibus frigidum corpus, & crassus san-  
guis. frigidum verò crassas materias ce-  
lerius cogit. indicio sunt aquarum na-  
tura calidarum fontes. hæ nāque refri-  
geratæ in tophaceum lapidem conden-  
santur. At in pueris multum sanguinis  
limum elixatum generandi calculi ve-  
luti sedem ignis habet. Igitur in calcu-  
li creatione talis est affectio. Cæterum  
nonnulli sunt qui per quosdam circui-  
tus sanguinem meiunt: huiusmodi affe-  
ctus hæmorrhoidū profluuium similis est:  
similis est quoque corporis constitutio.  
nam valde pallescunt, torpent, ignavi  
sunt, cibum fastidiunt, cruditate labo-  
rant: & cum excretus est sanguis, lāgui-  
di fiunt, membra resoluuntur, caput ve-  
rò leuius & agili⁹ redditur. At si per cir-  
cuitum nihil sanguinis effluxerit, capi-  
tis dolore vexantur, oculorum acies he-  
bet, tenebræ eis obuersantur, vertiginem  
patiuntur. Inde alij infiniti in comitia-  
lem morbum incidunt, tumidi, veluti  
caligine perfusi, aquam inter cutem pa-



tientibus similes: alij morbo atræ bilis,  
 aut neruorum resolutione tentantur.  
 Nam ex cōsueti profluuij sanguinis re-  
 tentione huiusmodi mala proueniunt.  
 Siquidē à renibus defluat sanguis mun-  
 dus, lotio non permixtus, plerunque ta-  
 men cum vesicæ vrina circumfusus ema-  
 nat. Nonnunquam & ex renū disrptione  
 sanguis fertur multus collectim, ve-  
 rùm cogitur, & in grummos densatur:  
 vtque in sanguine extra corpus effuso  
 fieri assolet, interdum vtique & in vesi-  
 ca congelatur: quando atrociter vrina  
 supprimitur. Ruptionē verò vlcera diu-  
 turna, atque vix sanabilia sequuntur. in-  
 dicia sunt ramentum, aut membranula  
 aranæ instar rubida egrediens, aut pus  
 album meiendo profusum, modo purū  
 & sincerum, modo cum vrina permixtū.  
 Ab iisdem & abscessus dignoscēdi sunt,  
 si vesperi febres accesserint & rigores:  
 dolores circa lumbos, & pruritus. At si  
 ruptus fuerit, grummi purulenti car-  
 nisque formam repræsentantes eiiciun-  
 tur: quin etiam & albida sanies excerni-  
 tur. Vlcera verò mordacia sunt, modo



repurgata, modo sordentia: id pus manifestat: vrina quoque aut olida, aut nihil olens. Ver sanguinis profluvia & abscessus parit: hyems autem, autumnusque calculos. Quod si à calculis ulcera facta sint, insanabiles inde morbi nascuntur, cito colliquatio morsque adueniunt.

DE VESICAE AFFECTI-  
bus, cap. IIII.

**V**esicæ morborum nullus placidus est. quippe acuti inflammatione, vulneribus, conuulsione, febribusque acutis interficiunt. Vlcus verò & abscessus, aut resolutio, aut lapis magnus tolli nequit: neque enim potione, aut medicamento frangitur, aut circunteritur: neq; præter noxam exciditur. opus est enim & tenues vesicæ partes simul cedere. id verò aut eodem die hominem perdit, aut paucis diebus conuulsionibus, febribusque consumit. Nisi excidatur autem præter urinæ conclusionem doloribus, febribusq; aut liquationibus homo cōtabescit. fin



DE DIVTVR. LIB. II. 165

haud ita magnus fit calculus, frequen-  
tius lotium cohibetur: nam facilè in cer-  
uicem delapsus lotij transitum obstruit.  
securius autem quàm grandiores exci-  
ditur, sed vesica quoque necessario sa-  
ciatur. cùmque mortis periculum eua-  
ferint, in fistulam (Græci rhœada vocāt,)   
prolabuntur. quod licet periculo vacet,  
ingenuis tamen hominibus non est to-  
lerādum, perpetuum scilicet vrinae pro-  
fluuiū, siue quis ambulet, siue dormiat,  
ambulantibus verò maximè iniucun-  
dum. Valde parui autem plerunque ci-  
tra noxam exciduntur. Quod si vesicae  
inhæserit calculus, ex colliquationibus  
patefiet: sed neque dolorum, neque gra-  
uitatis expertes sunt, licet vrinam expe-  
ditè reddant: sin minus, & vrinae diffi-  
cultas accedet. Omnes verò calculos ex  
fabulosis vrinae subsidentiis deprehen-  
des: & quod istis virilia sæpius arrigun-  
tur. quando enim meiunt, subestque cal-  
culus, dolent, tractant, attrahuntque pu-  
denda, tanquam calculum cum vesica  
exempturi. Anus quoque vitij particeps  
redditur pruritu laborās. Prominet ve-



rò & rectum intestinum vi, contentio-  
nibus, imaginatione, perinde ac si iā la-  
pis excernatur. Ambo enim inter se co-  
pulantur anus, & vesica: quorum vno af-  
fecto, & alterum afficiatur necesse est.  
propterea inflāmato podice vrinae exi-  
tus clauditur: & vesica exacerbata sedes  
non deiicit, licet aluus admodum sicca  
non sit. Tales utique sunt ex calculis la-  
bores. At sanguinis effluiū tametsi non  
admodum cito enecet, tempore tamen  
procedente infinitos iugulauit. Ab eo  
verò grummi creantur, lotij suppressio,  
& matura mors non secus atque à cal-  
culis fieri compertum est. quanuis enim  
sanguis tenuis flauūque est, neque val-  
de crassus, neque concretus: vesica tamē  
longo tempore congregat, ac eadem ca-  
lesciens & elixans cogit conspissatque,  
atque ita grummi efficitur, & vrinae  
interclusio, quam Græci ischuriam vo-  
cant, inferendæ morti potētissima. His  
accedit dolor acutus, ignis acer, lingua  
arida: & ab his delirātes moriuntur. Sin  
autem à vulnere dolor excitetur, vul-  
nus utique mortiferum est: vlcus verò



et si non protinus interficit, febribus tamen, aut inflammatione insanabile red datur. Tenuis quidem est crassitudine vesica, nervus autē substantia. quocirca neque carnem contrahit, neque facile ad cicatricem ducitur. Accedit & vrina biliosa, acris, mordax vlcere, communis victus. Vesica enim cum repletur, distenditur: cum inanis est, subsidit. in extensione igitur & contractione eundem quem & articulus affectum patitur. In articulo verò nullum vlcus bene sanescit: suppurationem autem ex abscessu contrahit. Vesicæ signa eadem sunt quæ & in aliis membris inflammatis. Nam et si febribus rigoribusque succedat abscessus, eadem pericula impendent. Verum si pus crassum, album, non tetri odoris eiciat, ab his orta vlcera benigna sunt. At si depascantur, faculentam, mucidam, graueolentem vrinam reddunt. Huiusmodi ægrotantibus nō tarda mors aduenit. Mordax quidē vrina est, & cum dolore est eius emissio: ad summum usque colem dolor peruenit. Ipsos utique omnia etiam contraria lædunt, & satu-



ritas, & inanities, & otium, & exercitatio,  
& lauatio, & illuuias, & saturitas, & ie-  
iunitas, & dulcia, & acida: cum alia alios  
laedant, alios iuuent, in vnum autem con-  
uenire non possint.

DE SEMINIS PRO-  
fluuiis, cap. V.

Mortis quidem periculo vacat geni-  
turae profluuium, iniucundum tamen  
est & vel auditu insuauis. Nam si intem-  
peries & resolutio humida occupat, ge-  
nitaliaque membra, ut à frigidis, contin-  
gere solet, profluit semen: neque ipsum  
vel in somnis cohibere possumus. ve-  
rum seu quis dormiat, seu vigilet, con-  
tinens profusio est, neque id quod fit, sen-  
su percipitur. Aegrotant quoque & ta-  
li morbo mulieres, sed partibus illis pru-  
rientibus, & cum voluptate nonnullis  
genitura profunditur: quinetiam virile  
coitum impudenter appetunt. Viri au-  
tem nequaquam pruriunt: nam quod ef-  
fluit, humidum, tenue, frigidumque est,  
sine colore, infœcundum. Qui enim ge-



DE DIVTVR. LIB. II. 169

nitale semen refrigerata natura emiserit? Quod si iuvenes hoc vitio laborēt, omnes senilem corporis habitum induant necesse est: quippe qui segnes fiant, resoluti, exanimis, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignavi, pallentes, albidī, effœminati, à cibis abhorrentes, frigidi, membris graues & stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis sanè id genus ægrota-  
tio ad neruorum resolutionem (paraly-  
sin Græci vocant) viam strauit. Quo-  
modo enim neruorum facultas non afficia-  
tur, cùm natura ad vitæ generationem  
faciens refrigerata sit? Atqui & genitu-  
ra vitalitatem impartiens, nos viros ef-  
ficat, calidos, articulatos, hirsutos, voca-  
les, animosos, ad intelligendum operan-  
dumque valentes: id viri testantur. Con-  
trà verò quibus non inest vitalis geni-  
tura, rugosi sunt, debiles, acutæ vocis,  
glabri, imberbes, effœminati: eunuchi  
id manifestant. Si quis autē vir & femi-  
nis profundendi abstinens fuerit, robu-  
stus est, audax, neque vel feras expaue-  
scēs: testimonio sunt ex athletis tempe-



rantes. Nam & illi qui natura quibusdā præstant, ob intemperantiam deteriores multo peiores fiunt: contrā natura deteriores ex temperantia præstantioribus longè meliores euadunt. Neque fanē ab alio quopiam, quā à genitura robustū animal generatur. Vitalis itaque genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem, & ad generādum mirificè cōfert. A satyriasi in seminis profluuium corporis status deuoluitur.

DE STOMACHI AFFE-  
ctibus, cap. VI.

**S**Tomachus delectationis, tristitiæq; princeps est, cordi periculosa vicinia ad tenorem, animique alacritatem, siue abiectionem ob animæ consensum præcipue stomachi facultas confert. hæc mihi alio loco dicta sunt. Delectationis quidem hi fructus sunt, bona cōcoctio, carnis conueniens incrementum, floridus corporis color. Tristitiæ verò istorum contraria. nonnunquam & animi abiectionem cum alimento caret, indu-



DE DIVTVR. LIB. II. 171

cit, atra bile vexatur, cibū refugit. Cū  
itaque stomachus ægrotat, escas odit &  
abominatur, nō modo cū offerūtur, ve-  
rū etiam si non in conspectū dentur, sed  
eas memoria repetāt, aut anxietate, aut  
madore stomachi, aut eius ostioli dolo-  
re perciti. & salivam effundūt quidam,  
& vomitibus lācinantur, corpūsque si-  
mul ab his vexatur. Quōd si ventricu-  
lus istorum vacuus est, dolorem q̄ cibi  
sumptionem facilius tolerat. Sin autem  
interdum ad alimētum capiendum ac-  
cedere cogitur, id multo peius est. La-  
bor quidem famis est, ore conterere, in  
deuorādo dolor, & maior conflictatio.  
Cæterū non erga vſitata quidem ita  
se habet, erga aliena verò optimè: sed  
quæ naturaliter habent, in contrarium  
mutata sunt: & omnia grauati ferè: fu-  
gāque adest, & odium alimentorum. In  
interſcapulis præterea dolor inheret: sed  
longè maior si edāt, deuorētque, fasti-  
diunt, animi pendent, viſus hebetatur,  
aures sonant, caput grauatur, mēbra tor-  
pent, crura, brachiāque resoluuntur, pal-  
pitant præcordia: dorsum imaginantur



versus crura moueri, aliàs alio, huc atq;  
illuc sese ferri existimant, seu stent, seu  
iaceant, quemadmodũ à ventorum fla-  
tu harundines, aut arbores agitãtur: pi-  
tuitam frigidã, aqueam reiciũt. Quã-  
do verò & in biliosis redũdat bilis, isto-  
rum oculi tenebris caligant: siticulosi  
non sunt, etsi à cibis sitire videntur: vigi-  
lant, tardi sunt, dormitant, non vero ta-  
men somno: iis qui sopore graui (coma  
Græci appellant) occupantur, similia pa-  
tiuntur, macie confecti, valde pallentes,  
debiles, resoluti, animæ deliquium pa-  
tientes, animo consternati, meticulosi,  
quieti, repente tamen irascentes, valde  
melancholici. nonnunquã enim in atrã  
bileni, quam melancholiam Græci nun-  
cupant, id genus ægrotantes inciderũt.  
Talem vtique stomacho impartiente  
animæ affectũ esse oportet. Verũm ho-  
mines compatibilium membrorũ igna-  
ri, in quibus hæc grauissima vitia fiunt,  
stomachum esse causam opinantur. ma-  
gnũ autem ad ea quæ dico, probanda  
testimonium cordis contiguitas est, vbi  
omnium principatus collocatur. in me-



dio enim pulmone cor sedet: horum autem medium stomachum coniūgit:ambo verò dorso inserta sunt. propter hanc itaque cordis viciniam & dolor ille excitatur, quē cardialgiam Græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempè morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua verò pus multum à ventre per stomachum effusum. Familiare est etiam id vitium illis qui tenui victu, & duriore coacti sunt uti: quinetiam illis qui, ut erudiantur, laborāt, & eius causa multa perferunt. quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia & vigiliis macerātur, qui doctos sermones & res graues meditātur, qui victum pleniorē & varium contemnunt, sed famem pro alimentis habent, pro potu aquā, & in somnis vigilant: quibus molle cubile est nuda humus, stragula vestis, ignobilis, tunica lacera: ipsorum verò tectum est cōmunis aer: diuitiæ autem adeptio atque vsus diuinę sapiētīæ. Hęc utique ipsis eruditionis amore bonā cōparantur. Cūmq; cibum & illum quidem ignobilem accipiunt, id vitæ tan-



tum, non saturā dāe famis, neque potum  
vini causa assumunt: non eos abstrahit  
voluptas, non vagatio & peregrinatio,  
non corporū exercitatio, nec carniū cir-  
cumpositio. à quo enim disciplinæ amor  
non auocet? à patria, à parentibus, à fra-  
tribus, à seipsis vsque ad mortem. His  
igitur corporis macies adest, decolor fa-  
cies, & in iuuenta senescunt, & ob con-  
templationem stupidi habentur. animo  
autē feueri, non ridentes, immites sunt.  
Atqui ob stomachum erga cibos male  
affectum citò satiantur cibo vsitato, vili  
& ad manum. variis autem dapibus non  
sunt assueti, & erga omnes cibos pigri  
sunt. quòd si aliquem inusitatum cibum  
acceperint, læduntur, omnes alios pro-  
tinus auersantes. Iste est stomachi lon-  
gus morbus. Inflammationes verò, de-  
stillationes, oris ventriculi morsus (car-  
diogmon Græci vocant) aut dolor, sto-  
machalis affectus non dicitur. Hunc  
morbum æstas affert: quando & conco-  
ctionis, & appetitus, & omnium est im-  
potentia. Inter ætates verò senectū,  
quibus & absque morbo ob vitæ finem



DE DIVTIVR. LIB. II. 179

& appetentia ad extremum peruenit.

DE AFFECTV VENTRI-  
culi, cap. VII.

Ventriculus concoctioni destinatum viscus, in concoquendo laborat, cum alui profluuium, quæ Græci diarrhœam vocant, hominem premit. & est liquidum alimenti inconcocti profluuium: nisi à recenti & proxima causa vnum aut alterum tantum diem permanente oritur. præterea & totus homo debilis redditur, quia corpus non alitur, unde longus morbus, coeliacum quem vocant, efficitur, Latine ventricularis dici potest, ob concoctis caloribus imbecillitatem, frigusque ventriculi: cum liquefit quidem à calore alimentum, sed non concoquit calor, neque in succum proprium vertit, semicoctum imperfectumque relinquens, cum perfectionem assequi non possit. id verò concoctione destitutum ad prauum commutatur & colore, & odore, & consistentia. albus est enim bile priuatus color: olida excernuntur, & lu-



tulenta: liquida & inconsistens ob pro-  
fligatam actionem substantia est, virtu-  
tem modò atque principium coctionis  
præ se ferens. Hac de causa venter fla-  
tuosus est, ructus assidui, tetri odoris.  
Quòd si deorsum penetrent, stridēt in-  
testina, flatus erumpunt asperi, humidi,  
argillofi. videtur autem ipsis tanquam  
humidum quoddam effluere. Dolor vē-  
triculi grauis est, aut subinde punctio-  
nes referens: gracilis verò, & emacia-  
tus homo redditur, pallidus, iners, nihil  
ex negocijs vsitatis valenter efficiens:  
sed cū ambulat, membra labascūt, tē-  
porum venæ exertæ sunt. siquidē ob a-  
limenti penuriam tempora habent cō-  
caua, atque in omni corpore venæ in-  
signes apparent. non modo enim mor-  
bus iste non concoquit, verū statim ne-  
que in molem corporis distribuit. Nam  
haud solum cōcoctionis, sed etiam di-  
gestionis vitium mihi esse videtur. Por-  
rò si in incremēto morbus sit, materias  
ab omni corpore in ventriculum rursus  
adducit: tūc ea iam est corporis eliqua-  
tio, os est aridum, superficies squallida,  
nihil



nihil sudant: ventriculus nonnunquam  
vt ab ardenti carbone peruritur, aliàs  
tanquam à cryſtallo cōglaciatur. inter-  
dū verò ſanguis in extremo vitæ discrimi-  
ne conſtitutis in deiectionibus fla-  
uus deſluxit, purus, nō permixtus: vt ve-  
næ oſtiolum patefactum eſſe videatur.  
acredo nanque venas exedit. Longiſſi-  
mum & difficulter curabile vitium eſt.  
etenim ſi abſque manifeſta cauſa deſiſ-  
ſe videtur, iterum inuadit, vbi & ex leui  
errore iam denuo ſuboritur. Per circui-  
tum igitur morbus iſte reuertitur. Se-  
nibus hoc malum familiare eſt, & mu-  
lieribus magis quàm viris. Pueris autē  
ventris eſſluuium aſſiduum eſt ob quo-  
tidianam cibi intemperantiam, ſed non  
ventriculi debilitate morbus aduenit.  
Ex anni temporibus æſtas hoc malum  
ſæpius affert, ſecundò autumnus: deinde  
hyems frigidiffima, ſi proximè ad extin-  
ctionem calor deueniat. Diuturnū quo-  
que morbum & affectus iſte, & difficul-  
tas, & læuitas inteſtinorum conſequun-  
tur. Verum & largiſſimus frigida potus  
interdum hanc labem progenit.

M



## DE COLICIS, ID EST

intestini plenioris morbo laborantibus, cap. VIII.

Colici sanè voluulo & stropho, id est torminibus celeriter necantur. longè plurimæ sunt huiusce morbi causæ. Signa verò hæc sunt, grauitas in ieiuno, vni affect<sup>9</sup> maximè vrget: pigritia multa adest, tardi sunt, cibos refugiunt, graciles, vigiles, facie tumidi. Quòd si prope splenem ægrotet colon, id est laxius intestinum, colorem habent nigrū cum viridi mixtū: album verò cum viridi, si prope iecur. ab his enim proximis visceribus malum cōmunicatur. Sin autem ebum acceperint quantunvis paucum, & flitu vacantem, mirum in modū tumulantur, & difflandi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius exitus intercluditur: superius verò ructus violenter tē-  
tati neque ipsi finem assequuntur. Siqua verò parte flatus vi erumpunt, virosi planè odoris sunt, sursum petētes, & acidos ructus excitantes. Renes & vesica in partem huius doloris adducuntur: & vrina



DE DIVTVR. LIB. II. 179

cohibetur. istis alia pro aliis accedunt. Miraculum autem his maius est, quòd in testes & cremasteras, id est suspensor, inopinatus dolor inuadit. Non paucis medicorum hæc morbi communicatio in occulto est: siquidem nōnunquam & suspensores execuerunt, propriā morbi causam eos continere opinati. quo circa & his pro aliis alia fiunt. Ab hoc quoque vitio alia prodeunt, abscessus, & vlcera non mitia, aqua intercus, & phthisis, morbi insanabiles. nam à frigore & crassis humoribus, & longè glutinosa pītuita propositi intestini dolor exoritur. Quinetiam & ætate, & tēpore, & regione frigida & aspera hyeme prouenit.

DE DYSENTERIA, ID  
est difficultate intestinorum,  
cap. IX.

SVperiora ītestina ad cœcū vsq; tenuia & biliosa sunt: atque inde Græcè cholades nominātur. post hæc inferiora vsque ad ītestini recti initium crassa & carnosā sunt. In omnibus vlcera fiunt.

M 2



dysenteria verò est horũ vlcerũ species:  
iccirco & varij existunt morbi. Ali-  
qua etenim superficie tenus intestina ra-  
dunt,excoriationem tantũ facientia,  
& innoxia sunt:sed longè innocentiora,  
si in inferioribus intestinis consistant:  
alia paulò etiam profundiora vlcera.  
verũ neq; hæc immitia sunt. Alia pro-  
funda,non vno loco manentia,sed ex-  
dentia,glandulosa,serpētia,& sphacelũ  
inferentia,mortifera sunt.Venulę quo-  
que in hisce vlcerum passionibus circũ-  
rosæ apparent:& in his vlceribus stilla-  
tiones sanguinis largiores cernuntur.  
Alia est species vlcerum, quæ oris tu-  
mentibus aspera sunt, inæqualia, cal-  
losa,vt in ligno gemmã dicimus.id ge-  
nus vlcera vix medicabilia sunt. neque  
enim cicatricem facilè contrahunt,& fa-  
cilius aperiuntur. Dysenteriaē causæ  
plurimæ sunt:principes autem crudita-  
tes,refrigerationes assiduæ,acriũ cibo-  
rũ assumptio,opsonij,quod Græci myt-  
toton vocant,Latini moretum dicerēt:  
cœpæ ipsius,alij, carniũ vetustarũ, a-  
criũ esus: à quibus postea cruditas su-



peruenit. Super hæc humidum aliquod inusitatū, vt mixtura illa, quæ cyceon Græcè dicitur: aut potio ryteō appellata: aut qualia in singulis regionibus loco vini fiunt contra sitim remedia. plaga præterea, & refrigeratio, & frigida potus intestina exulcerāt. Excrementa verò, & quæ cū vlceribus sunt, alia atq; alia in aliis atq; aliis reperiuntur. Nam si in superficie sint, ex superioribus quidē tenuia, biliosa, inodora, præter eum qui ab intestinis fit, odorē: ieiuni autem intestini excrementa puriora, crocea, mali odoris: aliqua verò & cum alimento liquato quidem, sed aspero exeunt. at modo grauis odor ab vlcerum putredine fit, modo vt à solo stercore prouenit. Ab inferiorum autem intestinorum vlceribus aquosa, tenuia, sine odore feruntur. sin profundiora vlcera sint, saniosa effluunt, subrubida, vinosa, aut instar aquæ, in qua caro lota fit: & hæc modò sola, modò cum stercore. hocque liquidum est circūfuso humore dissolutum, non infectum bile, inodorum: aut compactum, siccūque, sed ob humorem



circūfluentum lubricum deiicitur. Cæ-  
terum si maiora leuioraque vlcera sint,  
& in superioribus intestinis, eorum ra-  
tione, à quibus, & per quæ transeunt, bi-  
liosa effunduntur. sedē enim vellicant:  
nam bilis acris est, eoque magis si ab vl-  
ceribus effluat. bilis verò & instar vn-  
guinis pinguis est. Ex profundiorib<sup>9</sup> au-  
tem vlce-ibus, sed inferioribus cruenta  
manāt, crassa, pituitosa, carnosā, nō val-  
de pinguis, rametosa: vtpotē quæ ab in-  
testinis abstrahātur. quinetiā & integræ  
intestinatorū partes commixtæ sunt. Ex-  
cernuntur quoque & albida, crassa, mu-  
cosa, adipis concisæ similia, humore cir-  
cumsusa. hæc vtique à recto oblongo in-  
testino feruntur. Nonnunquā sanē mu-  
cosa tantū vellicantia, parua, teretia,  
mordaciāque egerūtur, crebro surgere  
cogētia, & deiiciendi cupiditatem cum  
voluptate afferentia: sed quæ deiiciun-  
tur valde pauca sunt. tenesmus huic vi-  
tio nomē est. A cæco autem carnes lon-  
gè rubicundæ, & grandes excernuntur,  
circumscriptionē multò maiorem habē-  
tes: in ipso enim maiora fiunt vlcera,



crur etiam crassus, fæculētusque emanat: & hæc omnia multò quàm antè dicta fædius olent. Cæterùm postquã ferunt, & exedūt vlcera, & nullo remedio vlllo in loco coerceri possunt, à superioribus quidẽ nō solum exquisite biliosa, sed & crocina, spumea fæcem vini referentia, & nigra, issatidis, & porri succū representantia, antedictis crassiora, atq; instar putredinis graueolentia deiiciuntur. Alimentum nunc minus cōcoctum est, solūm vt à dentibus voracius cōtritum. At si inferiora intestina vlceribus erodentur, guttæ cruoris atræ, crassa, carnosæ, rubidæ, grummosæ, nonnunquã nigra, multis modis variantia, olida, nō ferēda per sedem expelluntur: humiditatumq; exitus inuoluntarij fiunt. Nōnunquam oblōgum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deiicitur: & ignaris rei suspiciōẽ præbuit intestini. At negotium ita se habet, intestinorum tunicæ perinde ac ventriculi geminæ sunt, & altera alteri obliquè superiniecta est. Igitur cū earum cōnexio dissoluitur, interior tunica se-



cundum longitudinem absistens foras egreditur: exterior sola intus remanet, & carnosae efficitur, & cicatrice solidatur: sanescuntque homines & viuunt. id verò inferi<sup>9</sup> intestinum solum patitur. in causa est tunicarum carnosae substantia. Quòd si ex quopiam vasculo cruor emanet flauus, aut niger, purus, nō cum cibo aut stercore mixtus effunditur: verum concretum quiddam latis araneolis simile extēditur. in grumum enim, cūm refrixit, obduratur: neque sanguinem excretum esse credideris. obsonū autem multum cū spiritu maior quàm pro effectu, excretionis est apparentia. Interdū & in pleniore intestino purulentus abscessus efficitur, nulla nouitate ab aliis internis vlceribus differens. etenim signa, & pus, & vlcerum medicatio penitus eadem sunt. Si res duræ, carnosæ, contritis asperisque corporibus similes excernātur, abscessus non benigni moris significatur. Nonnunquā ex laxo intestino aqua multa dysenteriae modo profluit, idque plurimos ab hydropico morbo liberauit. Vlcera



DE DIVTVR. LIB. II. 184

quidem intestinorum (vt paucis dixerim) huiusmodi sunt. Cæterum & ipsorum formæ, & ab ipsis purgamenta tot sunt, quot supra comprehendimus. Quæ singulis quoque ægrotantibus accidunt, explicabimus, seu placida, seu noxia ulcera sint. Itaque collectim dictum est: si exulceratio superficietenus fuerit siue supra, siue infra, febrem non habent, nec dolorem: ac sine decubitu tenui victus ratione diuersis modis sanescunt. Sin vicus altius descenderit, in superioribus quidē mordacia tormina & acria sunt tanquam à pauca calida bile. aliis atque aliis temporibus suppurant intestina: plerunque verò suppurant, aut coctiones dimidiatæ sunt, cibos tamen nō horrent. Si inferiora ulcerata sint, lōge superioribus sunt salubriora. hæc enim humiliora intestina multò carnosiora sunt aliis: sin caua & depascentia ulcera in superioribus grassentur, febres acutæ concitātur, non emicātes, in visceribus demersæ: extrema refrigerātur, cib⁹ fastiditur, vigilia adest, ructus male olēt, nauſeabūdi sunt, bilis vomit⁹, vertigo. cūque



multa expelluntur, (ea verò biliosiora sunt) tormina, atque alij dolores magis perseverant. His accedit viriū consumptio, genuūmq; resolutio: ardore estuāt, fitibundi sunt & anxij, atra per nauseam reiiciunt, lingua est arida, pulsus pusilli, debiles. atque his germana sunt, quotquot de perniciosis vlceribus mortifera exposui. oris etiam ventriculi dolore usque ad animæ deliquium torquentur. Quidam verò neque ex eo deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu vitam finierunt. Huiusmodi calamitates & inferiorum intestinorū corrosionibus communes sunt, si depascantur vlcera, neque eorum depastionem compescere valemus, præterquàm quòd tormina dolorésque sub vmbilico inferius, vbi vlcera sunt, percipiuntur. Formæ autem excrementorum tales sunt, quales supra posuimus. Verùm si inter initia parua vlcera sint, in longūque tempus depastio producat, alia aliis vlcera superueniunt, aliquibus mitescentibus, aliquibus in summum excrescentibus. quales enim sunt in mari fluctus,



DE DIVTIVR. LIB. II. 187

talis est in vlceribus tépeſtas. Cæterùm ſi quando natura reſiſtere potens fuerit, ſimúlque & medicus ſubuenierit, depaſcentia compeſcitur, mortísque timor remouetur: inteſtina tamé dura, tumida, cicatricofaque remanent, & non niſi longo poſt tempore ſaneſcunt. Verum enim verò cùm ab inteſtinis cruor erúpit, ſi ex magna vena, aut arteria exeat, matura mors aduenit. neque enim aut manum intromittere, dolorémque attingere, aut medicamétum ipſi vlceri adhibere poſſumus. Quinetiã ſi medicamento ſanguinis profluuium coercetur, nõ propterea tuta eſt, ac vera mortis euafio: quãdoquidem nonnullis magna cruſta, (eſcharam Græci vocant,) decidens, venæ oſtiolum patentius efficit. Vbi verò & grúmi intus concreſcunt, intúſque remanét, ineuitabilis morbus eſt. Incipientibus igitur ſanguinis eruptionibus ſuccurrere oportet. plerúque autem cùm futuræ ſunt, licet nõ admodum clariſ ſignis, tamen ſeſe indicant. anxietas enim adeſt, & animi ambiguitas: grauitas ea in parte eſt, quæ rúpitur:



& facies rubet, si nondum ruptura facta est. Sin autem vena proximè rescissa est, plurimum venter mollitur omnino: si satis temporis præterit, difficilius atque tardius soluitur. Huiusce qualitatis sunt intestinorum vlcera. Præcipuè nascuntur æstatis tempore, secundò autumni, minus vere, minimè hyeme. Pueris quidem, & adulescentibus ventris profluvia contingunt: difficultas autem intestinorum viris & iuuenibus. Senectæ verò agrè medicabilis est, & ad ducendam cicatricem longum tempus requirit. At vlcera exedentia senibus inusitata, sanguinis verò profusio senectæ est conueniens.

DE LAEVITATE INTE-  
stinorum, cap. X.

SI à torminibus, & ab latis, valdeque profundis superiorū intestinorū vlceribus cicatrices crebre, crassæ, solidæque contrahantur, stercora ex his deorsum liquida, ab alibili indiscreta prolabuntur. Intestinorū enim raritas, per quam



furfum verſus alimonia diſcurrit, à cica-  
trice intercluſa eſt. Homo igitur nutri-  
tionis inopia laborat, & pallor adeſt,  
& infirmitas. Affectus iſte qui ab cicatri-  
ce fit, lienteria cognomen accepit, ab  
intestiſ ſcilicet, quæ Græci enteria vo-  
cāt: & nūc quidē à cicatricibus morbus  
exoritur. Aliàs verò inteſtina cicatricis  
expertia ſunt, ſed conſuetudo & exerci-  
tatio inteſtina profluuium pati edocēt.  
In iſtis enim calidum quandoque refri-  
geratū eſt: vt neque concoctionē, neque  
digestionē moliatur: ſed præ imbecil-  
litate retinere non poteſt, omnēmq; elab-  
orationē alimentū ſubterfugit. Quòd  
ſi ex tēpore, & nō ſtabilis, ſed levis mo-  
uētī purgatio fiat, ſimplex à cibis vomī-  
tus morbū ſoluit. Sin autē aliquo tēpore  
prorogetur, & in ſede firma iſtorū cauſa  
permaneāt, nihil opis vomitus affert.  
Morbus quoque longus, & malus habi-  
tus qui decumbere nō cogit, lienteriam  
peperit. Aqua intercuſ nonnunquam in  
hanc ægitudine feliciter commutata  
eſt, in malū ſcilicet ex malo: ſed melior  
eſt ſucceſſio.



**M**Vlieribus vterus ad purgationē & partum bonus est, sed morborū infinitorum, malorūque aceruum congerit. neque enim vlceribus tantum, & inflammationi, & fluori obnoxius est, verū etiā si totus repentē sursum versus moueatur, celerem interitum affert. Alibi quidem scriptū est, qui nam ipsius morbi perniciosi acuti sint. Diuturni vero hi: fluor duplex, duritia, vlcera aliqua innoxia, aliqua maligna, exitus totius aut partis. Fluor sanē ruber, aut albus est, forma declarat. Ruber quidē si sanguis flavus emanet, & huius species: vel liuidus, vel niger & tenuis, vel crassus & concretus, vt grummi. Albus, vt aqua, aut flavus cum pallido mixtus, vt bilis: crassus verò aut subtenuis, aut tenuis liquor, quem Græci ichora vocāt, & male olens. albus item, vt pus: sed exquisitē albus, vt album serum. quin etiam gutta cruenta nonnunquam cum pure simul effluit: mille aliæ sunt secundum ratio-



DE DIVTVR. LIB. II. 191

nem maioris & minoris istorū species. Circuitus verò modo est mēstrua purgatio, sed non ad pristinum præsriptū diem reuertitur. non multus quidē sanguis, sed per multos dies effluit. paucorum autem dierum fit interpositio, sed omnino pura. Alter est circuitus modus, sed ad certum diem: neque plurimi sanguinis est plerunque prima purgatio. bis autem ac ter purgantur per totum mensem. Tertia est quoque floris species, in desinens quidem effluuium est, & singulis diebus modicum: sed in totū mensem summa fit non admodum modica. neque enim vterus ostium claudit, sed hiat, ad effluxum humiditatis relaxationem patiens. Verum si neque intermittatur, neq; parum effluat, ob sanguinis effusionem moriuntur. Signa utique hæc sunt, præter humiditatis effluentis colores, ipsius hominis color: peruigilāt, cibos oderunt, anxietate vexantur, dissoluuntur in rubro profluuiio magis, & dolore torquentur, & in ambobus quod effluit, mali odoris est: sed modo magis, modo minus. Album enim pro-



fluuium peius olet, siquādo maior adest  
putredo. aliās autem rubrū, cū m lauius  
debaçchatur erosio. Breuibz sanè dictū  
esto, ater fluor omniū pessimus est, de-  
inde liuidus. Pallidus, albus & purulen-  
tus, diuturniores quidem sunt, sed mi-  
nus periculosi. Ex his ipsis pallidus dete-  
rior quidem est, sed longe melior est il-  
le qui cū vsitato colore mixtus est: vsi-  
tatus autem est ruber, eiusque species.  
Quin etiam & ipsis minus noxiij sunt  
vsitati: sed re vera senioribus infestiores  
sunt rubri fluxus, minimè autem puel-  
lis, quibus magis albi nocent. Item alte-  
ra est albi floris species, menstrua pur-  
gatio, exalbida, acris, & pruriginem cū  
voluptate afferens. In istis verò humor  
alb<sup>o</sup>, crassus, genituræ similis prouoca-  
tur: hanc speciem gonorrhœam, id est,  
fluxum seminarium muliebrem appel-  
lauimus. Est autem vuluæ refrigeratio:  
quam ob rem humorum tenax esse nō  
potest: quin etiam sanguinem in albi-  
dum colorē transmutat: vim enim ignis  
rubrificam non habet. Id genus vitij &  
stomachus patitur, ideo & pituitā euo-  
mit.



DE DIUTVR. LIB. II. 193

mit. Simili affectu & intestina laborāt,  
cū profluuiō Græce diarrhœa vocato,  
ægotant. In vtero præterea vlcerā  
suboriuntur, aliqua lata, pruriginosa,  
tāquam sale inspersa: hæc sunt quædam  
superficieī excoriatio. pus habent cras-  
sum, inodorum, paucum. vlcerā huius-  
modi mitia sunt. His cauiora sunt vlce-  
ra & deteriora, quib⁹ dolores parui ac-  
cidunt, pus paulo plus, grauius olent: ni-  
hilominus tamen hæc quoque placida  
sunt. Quod si altius penetrent, & labia  
dura aspera q; fuerint, & sanies quædam  
olida exeat, & quā in superioribus do-  
lor sit maior, exedit vuluam vlcus, &  
nonnunquam caruncula quædam sepa-  
rata egreditur. neq; ad cicatricem vlcus  
id ducitur, sed longissimo tempore ho-  
minem tollit: nam maxime diuturnū  
est. huiusmodi Græco vocabulo phage-  
dæna nuncupatur. Nempè mortifera vl-  
cera sunt, si præter ipsa dolor exacer-  
bat, & mulier valde contristatur: & res  
putrida ab vlcere neque ipsis ægotis to-  
lerabilis emanat, efferaturq; manuum  
attrectatione & medicamentis, & quo-

N



libet genere medellæ exasperatur: venæ autem in vtero turgent, & proximæ simul partes distenduntur. id verò perspicacibus medicis tactu deprehenditur. neque enim aliter liquet. ceterum ignis & anxietas totius, & duritia simul, ut in feris ulceribus insunt, quæ & ipsa mortifera sunt, necnon & canceri appellationem obtinent. At cancer neutiquam vlcus est, sed tumor durus & indomitus, qui unâ totum vterum distendit: dolores quoque, & reliqua omnia quæ in ulcere insunt, cancerum comitantur. Hæc eadem verò cancerosa utraque sunt, & diuturna, & perniciofa. Vlcera<sup>2</sup> autem cancer non ulcerato longè improbiore est, & odore, & doloribus, & vita, & morte. Nonnunquam integra vulua de fede sua egreditur, & mulieris foeminibus infidet. incredibilis calamitas: sed neque inaspectabilis est vterus, neque ingenerabilis causa. relaxantur enim membranae ilibus appensæ: quæ vteri sunt ligamenta nervosa: quæ in fundo sunt iuxta lumbos gracilia, quæ in ceruice hinc atque inde iuxta ilia, maxime nervosa,



DE DIVTVR. LIB. II. 195

lataque sunt : qualia nauigiorum vela  
cernuntur. Omnes igitur hæ membra-  
næ remittuntur, cùm vulua foras proci-  
dit. plerunque sanè huius exitus morté  
affert . Accidit enim ex abortu, & ma-  
gnis concussionibus, & violento partu.  
At si non interficit, diu hæ vitam produ-  
cunt, non visibilia videntes, extra alen-  
tes vterû, atque fouentes . Videtur auté  
nonnunquã duplicitatis vteri interius  
succingens tunica, quando à contiguo  
diuellitur. Geminae nanque membranæ  
tantum sunt differentes à tunica . hæc  
verò abscedit & fluxione, & abortu &  
violèto partu, quando ipsa secundis in-  
hærescit. Nam cùm ipsæ vi extrahūtur,  
simul & vteri tunica extrahitur: verum  
nisi pereat mulier, reuertens eadem tu-  
nica vtero adamsim connectitur, aut  
paulum extra prominet : contegit au-  
tem foeminibus mulier. Nonnunquam  
vteri osculum solum ad ceruicem vsque  
procidit, sed rursus intrò se recipit, si  
vterus suffimenta mali odoris olfaciat.  
ipsum quoque mulier attrahit, si grata  
odoramenta naribus subiiciat. *Quin-*

N 2



etiam obstetricis manib<sup>9</sup> paulatim intrò recurrit, si placidè & sensim prematur: & prius remedia mitigatoria, quæ Græci hysterica vocant, id est vterina, ei adhibita fuerint.

### DE ARTHRITIDE ET ischiaide, id est articulorum & coxendicis dolore, cap. XII.

Communis omnium articulorum dolor est arthritis: sed pedum dolorem podagram vocamus, coxèdicum ischiaida, manuum verò chiragram. Nempè aut ex tempore dolor est, si ex aliqua parum durante causa consurgat: aut latèter meditationibus longo tēpore contractus est morbus, cū ab exigua occasione dolor & morbus accenduntur. Est autem omnium simul neruorum affectus, si auctum malū omnibus ingruat. Initio verò nerui articulorum vincula, & quæcunq̃ ex ossibus exorta sunt, & in ossa inferuntur, dolere incipiunt. At istorum magnum est miraculum: non dolent quidem vel minimum, etiam si



DE DIVTVR. LIB. II. 197

quis secet, aut collidat: at si quis ab ipsis  
doleat, nihil aliud est eis ad dolorem  
citandum potentius, non ferramenta  
adstringentia, non vincula, non vulne-  
rans gladius, non exurens ignis. nam &  
hæc assumuntur tanquam maiorum do-  
lorum remedia. Quod si quis ipsa do-  
lencia ossa præciderit, sectionis dolor,  
vt exiguus à maiore obscuratur. Sin  
autem iste præualeat, eos voluptas ca-  
pit, priorum malorum obliuionem af-  
ferens. id sanè patiuntur dentes & ossa.  
Causam quidem veram soli Dij nouo-  
runt, probabilem verò & apparentem  
etiam homines. Est autem (vt simplici-  
ter dicam) huiusmodi: Quod præden-  
sum est, contactum vulnerationemque  
non sentit, iccirco & ex tactu vulnera-  
tioneque non dolet. Dolor enim est res  
aspera sensui: densum autem non exa-  
sperabile, ideo quoque est indolens. At  
rarum bono sensu præditum est, & vul-  
nere exasperatur. Cæterùm quoniam  
& densa ingenito calore viuunt, per  
hunc eundem calorem etiam sentire  
possunt. Siquidem efficiens causa sub-

N 3



stantialis sit, vt gladius, aut lapis, substantialis patientis corporis pars nō dolet: natura enim densa est. Sed si caliditatis insitæ intemperatura corripitur, sensus fit permutatio. cumque ipsorum ex se ipsa dolet caliditas, ab interna sensus pulsione excitatur. natura autem in maius excedente, vel ex abundantia dolores proueniunt. At aliàs in alios articulos morbus articularis inuadit, quibusdam in coxendices, (eaque parte perunque claudus remanet) & in alia quedam membra nonnunquam exiguis. quandoque nec in paruas particulas transit, pedes & manus. nam si maiora membra occupauerit morbum ipsum capere valentia, instrumenta illa non supergreditur. Sed si ab exiguo membro initium coeperit, mitis est, & inopinata inuasio. Ischiadis quidem a fœmore posterius, aut poplite, aut tibia initium est. Aliàs verò in coxæ cauo (cotylam Græci vocant, Latini acetabulum) dolor apparet, rursus in clunem, aut lumbos impetum facit, & omnia potius esse videtur, quàm coxendicis morbus. Ve-



rūm etiam articuli ita ferè dolere incipiunt, magnū pedis digitum dolor occupat: rursū calcē in priori parte, qua nitimur, deinde in concavā subit: malleolus autem postremus intumescit. Doloris causam non legitimā afferunt, aliqui novæ crepidæ attritum, aliqui longam obambulationem: alius plagā, aut calcationem, nullus intestinam domesticāque causam explicabit. Quin etiā ægrotis verum audientibus incredibile esse videtur. quam ob rem in insanabile affectum inciderunt. quoniam principis, cū debilissimus morbus est, medicus non resistit: qui ut temporis spatio vires acquisivit, nihil medici diligentia proficitur. Quibusdam in pedum articulis usque ad mortem residet morbus, quibusdam in omnis corporis ambitū vagatur, plerunque à pedibus in manus profilit. neque enim multum interest in pedibus ne, an fiat in manibus: cum utrique eiusdem naturæ sint, graciles, excarnes, externo frigori proximi, à calore interno remotissimi. Itē cubiti flexura, & genu cōveniunt. post hæc coxa-



rū cavitates, quas cotylas Græci vocāt,  
& vocatus peristroph°. Trāfitus quoq; in  
dorsi, thoracisq; musculos fit: incredi-  
bilēque est quā malum ferpat. Verte-  
bræ dorsi, cervicisq; dolent, & in sum-  
mo sacri ossis dolor inhærescit: simulq;  
omnium bos, asinus, & proprius cuiusq;  
dolor. Verū etiam tendones & mus-  
culi cum distentione dolorem patiūtur,  
necnon maxillarum, & temporum mu-  
sculi. Item communicatur renibus & ve-  
sicæ. Orem admirabilem: post omnia  
nares, & aures, & labia afficiuntur. Nam  
quoquo versus nervi & musculi in capi-  
te feruntur, dolent capitis future, & quid  
doleat agrotus ignorans indicat futu-  
rarum species, obliquam, rectam, trans-  
uersam, posterius, ac prius. Tenuem au-  
tem dolorem & in ossibus defixum cō-  
queritur: vniuersam enim ossium com-  
pagem morbus populatur haud secus  
atque pedis, aut manus articulum. In  
articulis quoque tofacea quædam coa-  
lescunt: ab initio quidem veluti absces-  
sus occupāt: postquā verò magis spif-  
santur, etiam cōcreto humore difficiles



DE DIVTVR. LIB. II. 207

sunt inflexiones: demum tofi solidi albi  
consistunt. in toto autem membro tu-  
bercula exigua, quales sunt ionthi à  
Græcis appellati, vari à Latinis, & ma-  
iora exurgunt. humiditas verò crassa,  
albicans, grandinosa est: nam & totius  
morbus frigidus instar grandinis est.  
Videtur autem caloris, aut frigoris dif-  
ferentiam præ se ferre: siquidem modo  
ex calore, modo ex frigore voluptas  
percipitur. At mihi placet vnicam esse  
morbi causam, insitam frigiditatē, vni-  
cūque esse affectum: verū si proti-  
nus increseat, & caliditas apparuerit, re-  
frigeratione opus est, ac talibus dele-  
ctatur: & huiusmodi affectum calidum  
vocāt. Quod si dolor in intimis nervis  
demoretur, & articulus non calens col-  
lapsus sit, neque extumeat, frigidū hunc  
esse dixerim: in quo ad caloris reuoca-  
tionem medicamenta calida requirun-  
tur. multis autē valde acribus opus est.  
Caliditas enim collapsas partes in tu-  
morem excitat, & internum calorem ad  
superficiem euocat. quo tēpore frigida  
medicamina proficient. Huic rei fidē id.



facit, quod iisdem eadem non conducunt. nam quod modo profuit, id aliàs noxium fuit. atque (vt compedio dicā,) calore in principio, frigiditate in fine opus est. Haud facile quidem continua podagra gignitur: sed nonnunquā longo interuallo temporis intermittitur. tenuis enim est. Et in ludis olympicis podagricus morbo sedato cursu victoriam adeptus est. Viri facilius in hunc morbum incidunt, & ex mulieribus agiliores. Mulieres autē, licet rarius quā viri, difficilius tamē hoc vitio laborant. Quod enim neq; visitatum, neq; familiare est, id si aliqua urgente causa potētius euaserit, violentū cū sit, maiore calamitatem infert. Aetas autem huic morbo subiecta est à quinque annis supra triginta. celerius quoq; aut tardius, prout cuiusque natura, aut victus ratio postulat. Atroces sanè dolores sunt, sed dolores comitantia atrociora: defectus animæ, ad manuum cōtactum immobilitas, ciborum auersatio, sitis, vigilia. Si discrimen euaserint, tanquam ab inferis elapsi, laxiorem vitam degunt, inconti-



DE DIVTIVR. LIB. II. 203

nentes, simplices, hilares, auari, & in victu molles ac delicati. Idcirco verò tanquam mortem rursus subituri licentiose præfenti vita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra concessit, quibusdam in depravatam spirationem, asthma Græci vocant, Latini anhelitum. Hæc verò successio immedicabilis, atque inevitabilis est.

DE ELEPHANTIASI,  
cap. XIII.

Elephanti morbo & feræ elephanti cōmunia multa sunt, & specie, & colore, & magnitudine, & victu. Verum neque ulli alij similia sunt, neque affectus affectui, neque animal animali. Nā Elephas fera longè ab aliis differt. primum quidem ingentissima crassissimaque est. magnitudo enim tanta est, ut magnū animal super aliud animal turris instar imponere queas. Crassitudo quoque tanta, quātam plura crassissima animalia inter se coniuncta vix æquare valeant. Cæterum neque specie cuiusquam admodū similē inuenias: siquidē omnes



exquisite nigro colore toto corpore  
obscurantur. Nam equorum alius can-  
didissimus est, quales Rhesi equi Thra-  
cij: alij albis pedibus, qualis Menelai  
Podargus: alij flauī, quales centum &  
quingenta: alij cœrulei, vt illud Ho-  
meri, factus equo similis concubuit  
Cœruleos habens crines. ita boues se  
habent, ita & canes, ita quælibet re-  
ptilia, & animalia quæ super terram de-  
pascuntur. Elephantēs autem soli nigri,  
tenebricoso colore, nocti & morti simi-  
les. Specie verò tali sunt: capita quidem  
& facies fœdas habent, figura non eui-  
denti, super breui ceruice, vt caput in  
humeris consistere videatur: atque ideo  
non euidens est. aures enim grâdes sunt,  
latæ, alarum similes, ad iugula vsque &  
pectoris ossa. Hæ ceruicē armosq; tegūt,  
sicut nauigia velis cōteguntur. Cornua  
verò mirandū in modum candida ni-  
griori colori internitētia possidet ele-  
phas. alij hæc dentes appellant. Hæc so-  
la autem candidissima sunt, quale nihil  
in vllō alio quauis candido animali  
reperitur. & hæc ipsa non super frontē &



DE DIVTVR. LIB. II. 205

tēpora, qualis cornigeris natura est, sed in ore superioriq; maxilla sita sunt, prorsum versus spectantia, recta nō admodū, sed paulum in superiora retorta, quo à recto detorqueri liceret, & in simis detribus pōdus extollere. Grandia utiq; cornua sunt, longitudinē extēti brachij, orgyiam Gręci vocāt, æquant mediocria. alia his multo lōgiora, duplo longiora sunt. prominentiā habet superior maxilla à labro enascentē, longā, exossem, tortuosam, serpētis similē. Duo verò in summa prominētia foramina sunt: & hæc in pulmones vsq; pertinentia natura te-rebrauit, duplicis tibiæ imaginē referētia. Hac sanē fistula tanquā nare ad respirationem, necnon & vice manuum id animal vtitur. poculū etenim, cū velit, hoc processu corripit, cōplectiturque, & valide retinet: neq; ab eo quispiā vi eripere posset, nisi alius sit potētior elephas. herbā etiam ad pabulū hoc quærit: neq; ore minorib;que dentibus carnes edēdo vitam ducit. prælongi enim pedes longe à terra distans animal sustinent. quinetiam breue (vt diximus) collū est.



ore igitur humi pabulari nō potest. Nō-  
nunquam & cornuum ab ore processus  
herbam os tangere prohibet. Itaque hac  
prominentia magnum pondus haurit:  
deinde quotcunque venatur, hac cōple-  
xus ventri futura alimentū in os detru-  
dit. Ritē igitur primi illi proboscida hāc  
vocaucrūt. nā πρὸ, id est ante se animal,  
hac βόσκειται, id est pabulatur. Verūm  
enimverò neque ex palude aut flumine  
ore bibere ei licet. Eadem in causa est,  
quod si sitiat, proboscidis extremā narē  
in aquā demergit: deinde tāquam respi-  
rās, vice aeris, multū aquæ attrahit: vbi  
verò impleuit narē ceu poculū in os flu-  
minis instar effundit: deinde iterū attra-  
hit, iterūmq; effundit, quoad ventrē tan-  
quam onerariā nauem cōpleuerit. Co-  
rium habet asperum, crassissimūmq;  
tumoribus inæquale, fissuras habens, ceu  
semitas prælongas, aliās diuisuras cōca-  
uas trāsuerfas, aliās verò obliquas valde  
profundas. Totū tripodonio perfimile  
est. Pili autem aliis quidem animalibus  
natura, aut setæ sunt, elephāti verò for-  
dida lanugo est. Infinite sunt & aliæ dif-



DE DIVTVR. LIB. II. 207

ferentiæ inter elephātem & cætera animalia. Etenim retro versus quandoque secundum genu flectitur, quemadmodū & homo, & mammas prope axillas habet, vt mulieres. Cæterum non in præsentia mihi opus est de animalis huius natura tractare, nisi quatenus ex eo & morbus elephas vocatus patefiat, quotq; ægrotantis forma huius animalis naturæ similia obtineat, agnoscat. Morbū quoque hunc leonem vocauerūt, ob extremarū frontis rugarum similitudinē: quam partem Græci episceniū nomināt. De ea posterius suo loco dicetur. Satyriasis etiam appellatur ob malarum ruborem, atque inexplēbile impudentēque cocundi libidinem. Necnō & Herculeus dicitur, quoniam eo nullus maior est, neque valentior. Magnus est quidem potētia morbus. ad mortē enim inferendā est omniū longē efficacissimus. est etiā visu fœdus, & in omnibus terribilis, quemadmodum & elephas belua. Inevitabilem quoque affert interitum: quandoquidē à mortis causa ducit originem. Ea ingeni caloris frigiditas est



non exigua, vel potius congelatio, ceu  
quedã sæua hyems: cùm aquã in niuem,  
aut etiã grandinem, aut chrySTALLũ, aut  
glaciẽ cõuertit. hæc est cõmunis mortis  
ac morbi causa. Veruntamen neque vllã  
insignem coniecturam morbi principiũ  
obtinet: neque vlla noua atque inusita-  
ta labes hominem incescit: neq; in cor-  
poris summis partibus repræsentatur, vt  
protinus videre quis possit, & incipienti  
malo resistere. sed in visceribus tanquã  
domo Plutonis delitescens ignis iã suc-  
cenditur, internorumq; victor rursus  
in superficie aliquando exardescit. Ple-  
runque sanè à facie hæc pestis incipiens  
tanquam ignis de specula procul con-  
spicius effulget: nonnullis verò ab ex-  
trema cubiti curuatura, à genu, à ma-  
nuum pedumque articulis. Iccirco au-  
tem huiusmodi hominum salus despe-  
rata est, quoniam medic⁹ ad morbi de-  
bilissima initia artem non adhibet ne-  
gligens, & ægrotantiũ calamitatis igna-  
rus. Tardi enim sunt, vt ab aliquo leui &  
vulgari causa, somniculosi, quieti, sicca  
aluo. Hæc etiam sanis haud valde inu-  
sitata



DE DIVTVR. LIB. II. 209

fitata sunt. In morbi autem clementis  
respiratio graue olet ob interni spiritus  
exhalationē. Huiusce rei aer, aut quip-  
piam aliud extrinsecum causam præbe-  
re videtur. Lotium crassum est, album,  
turbidum, quale iumentum reddit. ve-  
nerem appetunt, crudorum & inconco-  
ctorum distributio fit: neque istorum est  
sensus & meditatio. neque enim conco-  
xerint necne, percipiunt: & cruditas hæc  
concoctioni similis est. nam ipsis haud  
frequens est in optimum aut familiare  
concoctio. Digestio verò facile fit, tan-  
quam in suum ipsius alimentum raptim  
morbo attrahente: propterea valde fic-  
citate inferioris ventris laborant. Tu-  
mores alij iuxta alios exurgunt, nondū  
quidem continui, sed crassi & asperi: &  
interstitium tumorum discissum est, vt  
elephantis corium. Venæ latæ sunt, non  
sanguinis redundantia, sed cutis crassi-  
tudine. Non multo post autem & sedes  
declarat vniuerso corpore in æqualem  
tumorem distēto. Pili in omni corpore  
præmoriuntur, in manibus, fœmoribus,  
tibiis: item in pube, in mento rari sunt:

O



rara quoque in capite cæsaries. quod verò maius est, intempestiui cani, & caluitium affatim subitòque ingruunt. non multo post autem pubes & mentum glabrescunt. Quod si qui pauci pili remaneant, hi magis dedecent, quàm qui defluerūt. Capiti cutis altius rescissa est: rimæ autem frequentes, profundæ, asperæ sunt. Tumores in facie duri, acuti: nonnunquam fastigio albido, basi viridior. pulsus pusilli, graues, tardi tanquàm per cœnum vix se mouentes. venæ temporum distentæ sunt, & sub lingua: ventres biliosi. lingua grādinosis varis exasperatur. Neque inopinabile est & omne corpus talibus scatere tuberculis: quandoquidem & in victimis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autē valde ab intimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit, impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritúsque cū voluptate scalpetur. Ambit verò impetigo & mentum nōnunquam in orbem: rubent malæ cum tumore haud ita magno: oculi caliginosi, ænei



DE DIVTIVR. LIB. II. 211

coloris sunt: supercilia prominētia, crassa, glabra, deorsum versus pondere vergentia: contractis glabellis eminens tumor insurgit: color lividus, aut ater est. episcenium vehementer contrahitur, ut oculos contegat, quemadmodum irascentibus, aut leonibus accidit: unde & leonina hæc ægritudo vocatur. Igitur neque leoni, neque elephāto solum, verum etiā nocti tenebræ æquales sunt. Hypopia, id est sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebræ, extantēque sunt. labiorum prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit, nasus tumet, dētes nō albi sunt, sed nigricare videtur. Aures rubent admixta nigritia, obstructæ, elephāticæ, ut grandiores consueto esse videantur. Ulcera in basi aurium sunt: sanies defluit, pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: necnon & altè descēdunt scissuræ veluti nigri in corio sulci. propterea & elephas huic morbo nomen est. Plantarum & calcaneorum usque ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augeat malum, tumores malarū, mēt-



ti, digitorum, genuumque ulcerosi sunt. ulcera foetida sunt, & insanabilia: alia enim super alia exurgunt, super alia alia mitescunt. siquidem membra hominem diu morte praeueniunt, quoad de corpore excidant nasus, digiti, pedes, genitalia, atque totae manus. Neque enim haec labes prius perimit, à turpi vita, fauisque cruciatibus liberans, quam membratim dilaceratus homo sit. At longæna est, quemadmodum & elephas animal. Si in autem membrorum recens dolor sit, longè acerbius affligit. Aliiter atque aliter paratorum ciborum appetentia est, non obtusa, sed gustatus qualitatibus expers est: nullaque edendi ac potandi delectatio. omnia verò ob doloris cruciatum oderunt: alimento priuatur corpus: rabiosa inest cupiditas: spontinae sunt lassitudines, singulorum membrorum species hominem grauitate inusitata premit, quantumlibet exigua membra sint. quinetiam corpus omnia grauatim fert: non balneis delectatur, non illuue, non cibo, non ieiunio, non motu, non quiete: ab omnibus enim morbus alie-



DE DIVTVR. LIB. II. 213

nus est. somnus tenuis, vigilia peior mala sua cogitans: spirandi vehemens difficultas: suffocationes fiunt, ac si laqueo strangulétur. Hoc igitur pacto nonnulli vitam perdiderunt, inexcitabilem somnum in mortem dormientes. Itaque tales cum sint, quis non aufugiat? aut quis non auerfetur, licet filius, aut pater, aut etiam germanus frater sit, cum metus est, ne morbus communicetur? Propterea multi in solitudines & montes, sibi charissimos abduxerunt: aliqui eorum egestati, quoad viuerent, subuenientes, aliqui verò minime, cum eos vita defungi mallent. Fama est eorum quendam qui in solitudinem expositi erant, ex terree latebris reptantem viperam intuitum, aut fame coactum, aut morbi taedio inductum, ut malo malum commutaret, viuentem viperam edisse, neque prius à vita migrasse, quam omnia ipsius membra computruerint atque exciderint. Alterum praeterea ferunt, viperam in musti doliū irrepsisse conspicatū, cum mustum ad satietatem ingurgitasset vomuisse, multumque veneni simul cum musto reiecisse, quoniam in musto fera



extincta fuerat: iterumque hominē multum largissimè epotum, vitæ pariter ac morbi finem quærentem. vt verò satiatum iuxta inebriatusque fuit, primū quidem humi prostratus instar morientis iacebat. posteaquā deinde graui sopore experrectus est, ebrietatēque discussit, in primis comæ defluerunt, præterea digiti & ungues, deinceps omnia in ambitu corporis membra contabuerunt. quoniam verò adhuc in semine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem natura veluti ex cera creauit. alios enim crines enutriuit, ungues novos, & nitidam carnē instaurauit, ac vetus corium ceu serpentis senectam exuit, & tanquam alter homo ad vitæ munia reuocatus est. Ita habet fabula nō admodum quidem vera, neque valde fidē excedens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam verò ex residua vitæ scintilla hominem redintegrasse, haud ita à ratione abhorret, vt monstrum simile esse videatur.



# ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM ACV-  
torum curatione,  
Liber I,

IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

Curatio phreniticorum, cap. I.

Curatio lethargicorum, seu veteru-  
rum, cap. II.

Curatio tabis, cap. III.

Curatio apoplexiæ, cap. IIII.

Curatio accessionis morbi comitialis,  
cap. V.

Curatio tetani, seu rigoris, cap. VI.

Curatio anginae, cap. VII.

Curatio vitiorum columellæ, cap. VIII.

Curatio pestilētium in faucibus vitio-  
rum, cap. IX.

Curatio pleuritidis, id est morbi costa-  
lis, seu lateralis, cap. X.





Cutarum ægritudi-  
nū medicamina spe-  
ciebus signorū con-  
tigua sunt, quę supe-  
rioribus libris à me  
comprehensa fuere.

Quæcunque sanè in  
februm curatione fiunt secūdum ipso-  
rum differentiam, & secundum morbo-  
rum speciem, & in ipsis diuersitatē eorū  
plura in tractatione de Febrib⁹ explica-  
buntur. Quotquot autem cum febris  
acuti morbi fiūt, qualis phrenitis est, aut  
sine febris, qualis apoplexia: eorum  
duntaxat medicamina commemorabo:  
vt ne aberrem, neque verbosior sim alia  
in aliis describens locis. Idem verò prin-  
cipium quod & de morbis feci, eundem  
etiam finem faciam.

C V R A T I O P H R E N I -  
ticorum, cap. I.

A Egrotum cubare cōuenit in concla-  
ui mediocris amplitudinis, aeris tē-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 217

perati, hyeme tepidi, æstate frigidioris.  
 vere autem & autumnno secundum tem-  
 porum naturas coniectura vti decet.  
 Deinde quiescere iubendum est & ægro-  
 tos ipsos, & omnes domesticos. Acute  
 nanque audiūt, phrenitici, & strepitibus  
 irritantur, necnon & ab his in furorem  
 aguntur. Parietes læues sint, æquales,  
 neque supereminentes, neque festucas,  
 aut aliquid exertum habentes, neque pi-  
 cturis exornentur: pictura enim parietū  
 mentem turbat. nam præ oculis falsa  
 quædā simulachra obuersantur, & que-  
 dam non eminentia tanquam eminen-  
 tia manibus contractant, omnisque oc-  
 casio citra causam manuū agitationem  
 prouocat. Cubilis longitudo & latitudo  
 moderata sit: quò neque in ampliori vo-  
 lutari iactariq; possit, neq; à nimis an-  
 gusto delabi. Stragule vestes glabrę sint,  
 vt ne floccos colligēdi in mentē veniat.  
 In molli lecto decubant: nā durum stra-  
 tum neruis ingratum est. Non minime  
 autē inter ceteros ægotantes phreniti-  
 ci neruis laborant: facile enim conuel-  
 luntur. Amicissimi eos inuisant: fabulæ



& sermones animum ne vellicent: cū delectabilia omnia esse oporteat, illis præcipue, quorum iracunda insania est. Vtrū in tenebris an in luce habēdi sint, ex morbi natura coniicere debemus: nā si ad lumen efferantur & quæ non sunt cernunt, & quæ nō adsunt cogitant, aut pro aliis alia cognoscunt, aut quasdam novas & vanas imagines accipiunt, atque in summa lucē, aut quæ in luce sunt, extimescunt, obscuro loco eos continere præstat: sin secus se habeāt, lucido. bonum est autem ad lucem resipiscere, placarique insaniam. Ne diu à cibis abstineant: cibi verò humidiores sunt, paucioresque, & cōtinui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in vtriusque remissionibus, febris videlicet, atque delirij. Quòd si ab inedia furant, & non desinat febris, cibos dare non valde febrim lædētes utile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quò exhibendi cibi opportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis



CVRAT. AC VT. LIB. I. 27,

nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio vnà cum febre à principio inuaserit: vena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum fecanda est. Quòd si non nisi tertio, aut quarto die, delirium accedat, vsque ad primum decretoriorum dierum circuitum venę sectio differēda est. At si vltra cōueniens tēpus, vt puta sexto aut septimo die superueniat, venę sectio dimittēda est. multo enim ante iudicationes in acutis morbis euacuandum est, aut purgandū, aut aliis irritationibus vtendum. Venę quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio fecet. phrenitis nanque malum est in syn- copam facile mutabile. Sin autē ægrotus valde repletus sit, & iuuenis plurimo cibo, & largissimo vini potu saginatus, hæad phrenitidem rationes non pertinent: verū istis & citra delirium multum sanguinis hauriendū est: longè autem minus auferendum, si iidem phrenitici sint. Verū tamen audacius vena soluēda est, si à præcordiis, non à capite morbus oriatur: ibi enim vitæ principiū



est: caput verò sensus neruorumq; originis locus est, sanguinémque potius à corde trahit, quàm aliis distribuat. Igitur si membrum hoc affectum sit, venam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis vitiis inanire vasa oportet, à quib<sup>9</sup> nō modica noxa prouenit. Quòd si vires patiantur, vt quantum sanguinis satis est, euacuetur, semel auferendum est: ne dum repetendo tempus coneritur, exhibēdi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuæ febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latētes subleuationes. Cæterum si ante mediocritatem defecerit æger, ad secundam remissionem differendum est, nisi longo tempore post vettura sit. Quòd si non sit, vires instaurando odoramentis, faciei tractatione, & pedum cōpressione protinus sanguis detrahendus est: quantum verò mittendū sit, facultas ostēdet. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maxime: aridiores enim sunt, quàm si sola adesset febris. neque mulsa danda, nisi biliosi sint: nam faci-



le à biliosis naturis concoquitur. Far lo-  
tum cum aqua, aut mulla conuenit.  
Bonum quoque est ex his sorbitiones  
simplices præbere, quales satureia, aut  
apio, aut anetho incoctis fieri solent. hæ-  
nanque bonam spirationem conciliant,  
& vrinam cient: conducit autem phre-  
niticis lotij excretio. Omnia olera pro-  
funt: sed maluæ potissimum lentor bo-  
nus est, & ad linguę arterięque leuorem,  
& ad stercoreum descensum. optima est  
beta, blitum, coronopus, cucurbita, &  
quicquid suis temporibus optimū fue-  
rit. Ordei verò mundati cremor li-  
quidissimus quidem in primis nutribi-  
lior est: sed tanto etiam spissior cras-  
siorque sit, quanto plus temporis mor-  
bus progressus fuerit. Verum in iudica-  
tionibus & paulo ante iudicationes ci-  
bus subtrahendus est. Si morbus lon-  
giori tēpore producat: cibos ne sub-  
trahito, sed triticea exhibeto, quò suffi-  
ciat ægrotus: quādo extremorum & vo-  
latilium carnibus in cremore liquefa-  
ctis plerūque opus est. oportet enim hæc  
in elixando valde dissolui. Ex piscibus



saxatiles aliis præstantiores sunt: atque omnino regionis illius optimos deligito. quippe aliam regionē alias piscium species procreare creditum est. Vinosæ naturæ fructus subtrahito: quoniam caput & mentē percutiunt. Verūm si necessitas urgeat, viribus aut ore ventriculi labantibus, mala in mulsæ elixa, aut in adipe tosta exhibeto, aliorum singula calida aqua dissoluito, si roborandi dūtaxat oris ventriculi causa exhibeas: si autem vires quoq; instaurare opus sit, non vsque adeo vinosa facultas dissoluenda est. Cibi quidem (vt semel dicā) huiusmodi sunt. Irrigandum verò caput est refrigerandi causa, oliuæ acerbæ contritæ vinguine: nam caput in phreniticis calefieri non amat. Quod si vigilie & cogitationes ægrotum agitent, rosacei parem modum in principio misceto: adhuc verò plus rosacei addēdum, quod magis extra intrāq; caput roboretur ac refrigeretur. At si mens labefactetur, & locutio euariet: serpylli comā oleis incoquito: aut hederę succum, aut sanguinalis affundito. Si mentis verò aliena-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 123

tio vehementius hominem turbet: peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & aceti parū instillato: hæc enim halitus & caliditate diffiant, crassasque humiditates, quæ & ipse deliramēti causæ sunt, discutiunt. Cauere autem conuenit, ne in ceruicem ac tendones madefactio descendat. tēdonibus enim atque neruis inimica est. Nempe irrigandi semper occasio est, præterquam exacerbationis initio: rarius quidem in incremento, omnium verò frequētissime vigēte morbo, cū maxime insaniunt, tum maxime irrigandū est humore frigido: atque æstiuo tempore multo magis refrigerato, hyeme verò tepido. Ut mitescat autem delirium, posca, aut conyzæ decocto cū spongia facies fouenda est. Deinde cœnanthino, aut crocino vngvine linēda: quinetiam nares, & aures iisdem imbuendæ. Hæc enim somnū alliciunt. Si quando isti pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi atque instar cornu rigentes, iactantur autem, & è lecto proiliunt, his somnus & quies conciliandi



sunt: primum quidē caput rosaceo me-  
ro irrigando, aut amaracino cum succo  
hederæ, aut serpylli, aut etiam fertulæ  
decocto. Magis autem soporiferum est  
papauer in oleo elixum, capitis sincipiti  
superdatum, aut in aqua faciei per spon-  
giam impositum. ipsæ quoque integræ  
herbæ (si proximè lectæ fuerint) virides  
cervicalibus subiiciendæ sunt. crassant  
enim, madefaciuntq; spiritum aridum  
tenuemque: & caliginem quandam sen-  
sibus obducunt: graue autem & torpens  
est caligo: id verò est somni principiū.  
At si valentiorib<sup>9</sup> auxiliis egebūt: & ip-  
sa papaueris lachryma ex aqua frōs in-  
ungenda. quinetiam nares ea linendæ,  
& in aures infundenda est. Contrectatio  
pedum suavis ex oleo: capitisque att-  
actus efficax est, sed potissimū si tempo-  
ra aurēsque scalpantur. nam & ferarum  
iram furorēque aurium & temporum  
mollis attrectatio coercet. Cuique ve-  
rò vſitata somnum accersunt: nautis  
in cymba decubitus, & maritima na-  
uigatio, & littorum sonus, & vndarum  
murmur, ventorūque bombus, & ma-



ris nauisq̃ue redolētia: musico tibiārum  
exercitatio quietem affert, aut lyræ can-  
tus, aut citharæ, aut meditatio puerorū  
canentium: ludi autem magistro pueri-  
lium fabellarum enarratio. Atque ita  
aliis alia animū demulcentia somnum  
insinuant. Cæterū præcordiis ac ven-  
tri madefactiones & cataplasmata adhi-  
beto, si phlegmone sublit, atq; durities,  
flatūsque distendat: oleum quoque ex  
oliua bene matura nequaquam acerba  
iniicito: id enim crassum est, & viscidū,  
& calefaciens. Hæc vtique in inflamma-  
tione facienda sunt. Iniiciatur verò in  
ipsa anethum, aut conyza: bonum quoq;  
est si simul omnia. Quod si adsit etiam  
inflatio, cumini & apij semina adiicito,  
& quæcunque lotium flatūsque prole-  
ctant: necnon & nitrum cribratum in-  
spergito. Verum si in iecore vitium do-  
lorque fuerit: lanas ab oue sordidas ac-  
cipito, oleum verò acerbū, aut rosaceū,  
& sapam Græcā, aut Creticā admisce-  
to: fertulāmq̃ue incoquito, atque omni-  
bus in vnum succū permixtis iecur irri-  
gato. Ad lienē verò oleum cū aceto be-



ne facit: aut si magis quàm prius turbet: posca, & pro lanis spongia mollis adhibeatur. nam mirum in modum his gaudet mitescitque lienis. Porro si præcordia interius sint, sursumque trahantur, & circumtenta cutis sit, optimum hoc remedium erit loco vnguinis, aut vnà cum ipso crasso tantūdem opportunum est. cunila verò & ros marinus incoquantur: anethū quoque nō iniucundū erit. Quòd si cataplasmatibus tempus erit idoneum, oleis quidē iisdem, in iisdem affectibus vtendum est. Materia sit autem lini semen, fœnum Græcum, ordeī tenuis farina. Bonum est autem & faba, & eruum, si venter intumescat: pariter & milium torrefactum in sacculo positum leue mollēque fomentum est: pin situm verò & aqua inter cutem laborantibus: cum melle & oleo & lini semine cataplasma bonum est. Flores autem & herbæ & semina quæcunque à me in irrigationibus posita sunt, & in cataplasmatibus eadem sunt. Mel verò & cum ipsis bonum est, vt arida cogantur, misceanturque squalentia, atque vt calor



diutius permaneat: ipsum quoq; solum bonū est pro cataplasmate semicoctum, & ad irrigandum, si cum aliquo humore liquetur: mollit enim, calefacit, flatus lotiūque euocat, & ardores obtundit. Nam hæc quoque mulsa epota præstat: hisque plura & meliora, si interius arteriam, pulmones, pectus, & ventrem subeat. Absidue verò aluus irritanda est, glandulis, aut illitionibus (sæpius enim siccescit) vt à capite materiæ detrahantur, & à pectore halitus disflentur, & alui purgamenta excernantur. Quod si multis diebus venter suppressus fuit: ipsum mulsa, oleo & nitro subluere opus *aut sole.* est. Verū si non satis phlegmones exhalationes desierunt, cucurbitulam affigens incidito, qua parte phlegmone extumuit, & maior apparet: vnam autem, aut duas affigito, prout phlegmone significauerit, & vires præceperint: & sanguinis detrahendi copiā ab his coniectare oportet. Excessus enim syncope autor est. Primo quidem, aut altero die madefactio eadem esto, tertio verò ceratum cum aliquo ex oleis ad irri-



gādum aptis imposito. Deinde epithemata in inflammatione si facultas sit, ex hyssopo, scæno Græco ex mulsâ decocto, terebinthi arboris resina, & cera: olea verò in iisdē eadem. Quòd si nihil istis delirium remittat, tōdere caput necesse est: si longissimi crines sint, primum dimidij: si breuiiores, ad cutim. Postea prius resectis viribus cucurbitula vertici capitis affigenda est, sanguisque hauriendus: verum prius inanis cucurbitula inter scapulo adhibeatur. Cæterum quoniam thoracem in omnibus acutis morbis medicari oportet (nam prorsus ipse cum corde & pulmone laborat) primum quidem ob spiritus modo calidi, modo frigidi necessitatem, præterea ab ardenti febre, & tussi, & humorum prauitate, & neruorum cōmunionē, & oris ventriculi noxa, necnon succingentis membranæ, & septi transuersi vitio (cor enim si maiori aliquo malo oppressum fit, nunquam sanescit:) in phreniticis utique & hæc in primis mitiganda sunt. si quidem nonnullis mentis alienatio ab aliquo eorum quæ in pectore sunt, vi-



tio exoritur. ea verò sunt, spiritus calidus & siccus, fitis acris, ignis intolerabilis, qui vndique in thoracem confluit, & prauitas quidem à domestico calore cōmutato & maior & molestior prouenit. Ab aliis etiam membris in thoracem contributio fit: extrema nanque frigida sunt, caput, pedes, ac manus: super hæc autem thorax est. igitur humectandi refrigerandique auxilio eget. Humectatio quidem fit ex oleo, in quo chamæmalum, aut nardus incocta fit. Aestate verò & sapa Græca benè faciet. At si epithematibus vti deceat, palmulæ vino austero maceratæ, deinde contusæ in placentam cum nardo, polenta, atque cœnanthe suaue pectori cataplasma fuerint. Refrigerant quoque mala pinsita cum mastiche & fertula: quæ omnia cera & nardo excipiantur. Sin autem & os ventriculi torpeat, & à cibis abhorreat, succum absinthij, aut comam vnà cum his terito, ipso etiã in oleo incocto præcordia irrigato: & aquã, in qua maduit, aut ipsius succũ ante cibum propinato, duos scilicet aquæ illius cyathos, aut suc-



ci ad amaræ fabæ magnitudinem ex aquæ cyathis duobus. At si os ventriculi ardor malè habet, non ratione morbi, sed ipsum duntaxat ab acribus falsisque humiditatibus, siue à bile mordetur, atque siti perarefcit: lac aquæ admixtum in cibis exhibendum hemina videlicet dimidium vno aquæ cyatho temperatum: atque ita huiusce lactis plurimum. sorbeat: nonnihil etiam cum pane assumat. Verùm tamen si ardor hominem torqueat, & sitis, & anxietas, & furens insaniam, & frigida cupiditas: propinanda quidè frigida est, sed nō tanta quāta in ardore morbo absque phrenitide propinatur. In istis enim timendū nervis est: itaque danda est, vt ori ventriculi subueniatur. pauca verò satis est. parum enim potant phrenitici. Cæterum si in syncopam prolabantur (nam & hoc incidere solet, viribus euanescentibus, in sudorem liquefcente homine, omnibus humoribus extrorsum impetum facientibus, tenore ac spiritu fatifcentibus) tunc cura delirij posthabetur. sed cū metus sit, ne in vaporem, humiditatem



que homo dissoluatur, vnicum subsidium vinum est. celeriter enim substantiam alendo instaurat: & quoquo versus ad extremitates vsque permeat: tenori tenorem apponit: & spiritum torpentem experget facit: frigiditatem calore temperat: laxantē madorem astringit: extrorsum erumpentia atque diffuentia coercet: olfactu suaue delectat: vires demum fulcire ad vitam prorogandam potest: atque in insania ad animum demulcendum optimum est. Hæc omnia epotum vinum simul præstat. iracundia nanque mollescente animo conquiescit: atque ipsimet ad recreandas vires cibos accipiunt: quinetiam se ipsos ad voluptatem replent. Nempe si iam plus temporis morbus extrahitur, & febris ignaua est, & deliriū in fatuitatem vertitur, & præcordia non vsque adeo læsa sunt, aut tumore, aut inflatione, aut durtia, sed in capite potissima morbi causa est: audacter lauare oportet, atq; sæpius caput perfundere: habit⁹ nāque sanabitur, & caput difflabitur, & omne corpus exhalabit. Atq; ita siccitas



obtunditur : & sensus caligo discutitur :  
& mēs stabilis atque inconcussa firma-  
tur . Hæc utique sunt tollendi morbi  
præcepta.

CVRATIO VETERNO-  
sorum, cap. II.

**V**Eternosi in luce & ad solis radios  
collocentur : morbus enim nihil a-  
liud est quàm tenebræ . & magis in loco  
calido habeantur : ipsius enim causa est  
infitia frigiditas . cubile agitabile sit . stra-  
gulæ vestes , parietum picturæ , omnia  
sint varia , quæcunque visum proritare  
queunt . multus habeatur sermo : pedes  
premendo tractentur : vellantur pili : mē-  
bra scalpantur . Si altus sopor obtineat ,  
vociferandum est . iracundè increpādus  
est æger : his quæ timere confucuit , de-  
terrendus : quæcunque prius optabat ex-  
pectabátque , annuncianda sunt : omnia  
ad soporem discutiendum contrà atque  
in phreniticis , molienda . Quòd ad ve-  
ternosorum euacuationem attinet , hæc  
nouisse oportet , si alteri morbo , utpotè



CVRAT. AC VT. LIB. I. 233

phrenitidi succedat veternus, venam ne  
soluito: neque alicunde multū sangui-  
nem educito: sed ventrem subluo, non  
solū stercoris educendi causa, sed etiam  
vt aliquid à superioribus partibus reuel-  
latur, & à capite deriuetur. igitur multū  
insit salis, & nitri. Optimum verò sit, si  
sublutioni castorium inspergas. inum  
enim intestinum veternos frigidū est,  
& ad excretionē emortuum. Si non per  
successionem, sed suo pte ingenio veter-  
nus incipiat, & ager plenus esse videat-  
ur: si sanguinis, vena in cubiti curua-  
tura secanda est: si pituitæ aquosæ, aut  
aliorum succorum, purgare opus est, eni  
ce ex ordeï cremore, aut nigro veratro  
ex mulsâ inter initia, si mediocriter pur-  
gare velis. Sin autem copiosius, medica-  
menti, quod hieram id est sacrâ vocant,  
pondo drachmas duas ieiuno dato cum  
mulsæ cyathis tribus: atque tâtisper ex-  
pectans, quoad purgatio cōfecta sit: tunc  
cibos, si opportunū sit, exhibeto: sin mi-  
nus, in posterū diem alimentum differ-  
to. Nonnunquam sanè & vesperi hieræ  
drachma cum aquæ, aut mulsæ cyathis

*thympsea vicia, no  
critica.*



duobus dissoluta in tēpore datur. Nempe inedia malum est, malum est & cibi multitudo. Igitur exiguo cibo uti singulis diebus oportet: neque subito ac penitus ieiunandum est. os enim vētriculi per totum diem refectione calorēque indiget. Quinetiam cibus esto attenuans, & aluum leniens in iusculis magis quā leguminibus, gallina, cēchride. herba verò mercuriali assiduē utitor: acetūque affundito, & succis ini-cito, si forte succo pōt sanā utendum sit. Bonum autem spiritum reddit, vrināque citat fœniculum, apium, olera, aut horum semina. Item porrum acrimonia sua proficit, & brassica cum oleo & garo. optimē facit & cuminum dulce cum brassica ad flatūs digerendos & lotium euocandum. Vesica enim atque venter in quolibet morbo irritant atque infestāt. Irrigationes capitis tales fiant, quales & in phreniticis. Vtrisque enim sensus pleni halituum sunt: quos refrigerādo, adstringendōque rosæ atque hederæ succo propulsare necesse est: aut digerere per transpirationem extenuan-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 235

tibus, exempli causa serpyllo, aut aceto cum rosaceo. Si nerui doleant & totum corpus, sed multo magis extrema frigescant, caput ceruicemq; castorio cum anethino oleo inungito, atque irrigato. quinetiam spinā eodem Sicyonio, aut gleucino, aut veteri oleo admixto perfundito: necnon & manus ad humeros usque, & pedes usque ad inguina perungendi sunt. Nonnullis quoque vesica est humectanda: quæ tanquam neruus patitur, & tanquam urinæ iter laborat: insuper humorum acredine vexatur: biliosum enim lotium est. Sin autem maior tremor adfit, & conuulsionem minetur, necessariò & Sicyoniū oleum capiti superfundendum: sed brevis eius usus esto. Quòd si præcordia inflammata sint, cutis verò tumida, inflata, distentaque, aut introrsum vergentibus præcordiis concava efficiatur: madefactiones & cataplasmata eiusmodi sint. cuiusmodi in capite de phreniticis comprehendimus. Cucurbitula minimè utilis, si à phrenitide in hanc labē incidit: audacius verò cucurbitula uti poteris, si



ab initio morbus iste inuaserit. Si nau-  
tem atra lingua sit, & tumor in præcor-  
diis appareat, cucurbitulâ affigere ne-  
cesse est. postquam verò interuallo tem-  
poris sensus purgati fuerint, & alia faci-  
lius feret, capitis vertici applicare. quã-  
doquidem ea parte euacuare sine vlla  
virium molestia possumus: et flatus su-  
pra infrâq; eliciendi sunt. Veternus enim  
flatus colligit: & in ventriculis, & in to-  
to corpore ignauia, marcor animæque  
defectus conspicitur. Motus autē ac vi-  
gilia discutiendi facultatem habēt. Ru-  
tam igitur viridem cum melle & nitro  
contritam illinito: sic enim magis fla-  
tus digerit: cum his verò & terebinthi-  
næ resinæ pars vna misceatur. Fot<sup>o</sup> quo-  
que flatus prouocat aut cum sordidis ca-  
lentibusque lanis, aut cum asperis pan-  
niculis veteribus atque attritis: aut cum  
spongia ex aqua, vbi hyssopum aut ori-  
ganum, aut pulegium, aut rye incocta  
sit. Euocant autem flatus & quæcunque  
ante cibos propinantur: quæ vtique pi-  
tuitam bilémq; ab intestinis & stoma-  
cho educūt. Hyssopū in mulsa elixum,



dictamum Creticū, origanū, acria quidem sunt, sed eductoria. Adiantum, gramēque flatus & lotia erūpere faciunt. Si manus & caput cōtremiscant, castoreum dimidiæ drachmæ pōdere ex mulsa cyathis tribus ad plures dies bibendum est: si bibi verò nō possit, ad demolendam calamitatem cum olei cyathis tribus, in quo ruta incocta sit, duplum in minimum intestinum infundatur. idque per plures dies faciendum. Ultra verò utilitatem, quæ ex hoc prouenit (nam supra & infraque flatus expellit, & nonnullis in vrinam, stercusque detrudit) si fortè in omne corpus dilabens penetrat, si mihi patque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidū sicūmque permutat: morborūque constitutiones conuertit. Optime etiam proficit si in nares inspiratur: nam & ea ex parte spiritus sternutamentis educit. Et quemadmodum per vesicam vrinam expellit, ita & per nares mucus. Hos autem effectus hoc loco suauī caliditate præstat, & melius quàm alia sternutatoria, scilicet quàm piper, veratrum, radicula, euphorbium,



Nam hæc ad primum atque vltimum  
attactū immitia sunt, & caput sensum-  
que perturbant. Castoreum verò pau-  
latim adhibitum calefacit, cum & alio-  
qui capiti conducatur: quandoquidem ner-  
ui vndique ex capite oriantur: morbis  
autem neruorum castoreum medetur.  
Ceterum ipsum cum aliquo aut aliqui-  
bus ex supra comprehensis admiscere  
non ingratum fuerit. nam si admixtum  
sit, non protinus quidem caput medio-  
criter conturbauerit, diutius verò cali-  
ditatem accenderit. Nares pruritatio-  
ne humidæ reddantur, odoramenta ap-  
plicentur, acria quidem ad sensum, sed  
facultate calida: quale ipsum castoreū  
est, aut thymbra, aut pulegium, aut thy-  
mum, viridia aut arida aceto perfusa.  
Acribus pharmacis pedes genuaque il-  
linantur. Materia esto calefaciens, & ex-  
adiectione mordens. nam utroque ve-  
ternosis opus est ad calorem excitan-  
dum atque vigiliam. Primum igitur vr-  
tica crura verberato. tenuissimæ nan-  
que vrticæ partes adherentes non diu  
perseuerant: sed pruritus & dolorem



CVRAT. ACVT. LIB. I. 239

non grauem inferunt: mediocriter vero stimulat & tumefaciunt, & calorem excitant. Quod si hæc vehementiora fieri volueris, lemnestidis atq; euphorbiæ pares portiones cum vngue gleucino illinito. Optimum quoque est scillæ crudæ laminis perfricare: sed à membris omne oleosum detergere oportet: quodlibet enim acre minimè mordax est admixtum cum vngue, nisi id medicamentosum sit, quale est cyprinum, aut gleucinū, aut Sicyonium. Si præter hæc altus adhuc sopor occupet, proderit syluaticum cucumerē ex aceto tritum, & æque sinapis portioni admixtum imponere. acre verò est id cataplasma, celeritèrque ruborem concitat: celeritèr quoque calefacere potest. verum ne pustulas vulneraque efficiendo periculum inferat, frequenter detrahendum est cataplasma, atque nunquid horum acciderit, inspiciendum. Hæc utique ad ipsius torporem, ac veluti demortui languorem discutiendum quolibet morbi tempore præter exacerbationum inuersiones molienda sunt. Quod si iam



sensum recuperet, pondus tamen ali-  
quod in capite insit, & sonus aut bōbus  
obstrepit: etiam per os pituita elicienda  
est. Mastichen in primis mādendam ex-  
hibe, vt continenter expuat: postea rur-  
sum vuam taminiam, granū gnidium:  
sed omnium maxime sinapi, & quoniam  
vſitatum est, & quoniam inter alia ma-  
gis pituitam educit: ac si quis sponte  
ipsum deuorauerit, quæ in ventriculo  
sunt, disſicere potest: potest etiā aluum  
madefacere, & flatus excernere. Etenim  
aliquando casu hæc mihi euenerunt:  
cū homo quidā me cōsentiente ipsum  
deuorasset. Bonus autem magister est  
experientia, opus est verò & ipsum pe-  
riculum facere. imperitia nāque timo-  
ris & cautionis causa est. Caput quoque  
postquam ad cutim detonsum fuit, nisi  
magnopere proficiat: vt transpiret ra-  
dendum est: quinetiam ad vſum acrium  
medicaminum, vt eius qui ex limne-  
stide constat, aut hydar, aut thapsia, aut  
sinapi, humidum ex aqua cum dupla pa-  
nis portione in linteolo veteri illitum  
capiti superdandum est: cūque horæ  
spatio



CVRAT. ACVT. LIB. I. 241

spatio ibi permissum fuerit, spongiis calidis fouere opportunum fuerit. Item ex usu erit & lauatio omnibus iam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente, vbi & gestatio proderit, & frictio, & quælibet lenis corporis agitatio.

DE CVRATIONE TABIS,  
cap. III.

[S]tos sanè si & tabes male habet, ocys succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medela est, & nutritio, & ventris calefactio, & vesicæ lenitio. Quin etiam eadē huic vitio, quæ & catochos, expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum utique illis opportunius est atq; lenius & potui datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autem qualia his similia ab utero vitia oriantur, in libro de Muliebribus morbis à nobis disputabitur.

2



DE CVRATIONE APOPLE-  
xia, cap. IIII.

**A**poplexia validus planè morbus est. nā in omnibus exanimes sunt, quorum & corpus & mens stupet. Si agrotus senex sit (quibus familiare id vitium est) non liberatur, & morbi magnitudine & ætatis miseria oppressus. Quibus autem notis morbi magnitudo coniectanda sit, antea à nobis positum est. Si iuuenis æger sit, debilis est apoplexia, non tamen facile remouetur. tentanda igitur curatio est. A Equale sanè adiutoriū vt pote magno affectui magnum remedium missio sanguinis est: nisi quis plusquàm conueniat, mittendo delinquat. modum autem coniectare difficile est: nam si paulò plus detraxeris, hominem planè strangulasti. ad vitā enim tuendam his vel paucus sanguis efficacissimus est: cum sit vitæ corporisq; alimentum fomes. si minus detraxeris quàm causa postulat, nihil magni per magnū auxilium contuleris: adhuc enim causa permanet. Sed præstat minus detrahen-



do delinquere : nam si minus detractum esse visum sit, aliqui verò optimi successus apparuerint, iterum venam rescindere congruens fuerit : scindenda est autem vena in concauo cubiti. hæc enim in sinistro fluida est. Simul quoque in pusilla apoplexia, & resolutæ partes considerandæ sunt, in sinistro ne, an in dextro latere resolutio sit : à salubribus enim partibus (ut dicere mos est) sanguinem haurire oportet. hæc enim sanguis facilè delabitur : hæc etiam à læsis partibus materia deriuatur. Igitur si absque euidenti causa attoniti reddantur, sic de secanda vena ratiocinandum est. At si ab ictu, aut delapsu, aut compressione in hanc labem inciderint, in aliud tempus res differenda est : nonnullis verò ad medelam atque vitam id solum satis fuit. Cæterum si frigiditate multa, & torpore, & sensuum abolitione hominem occupante vena minime scindenda videatur, subluenda alius est, quò multitudo ab intestinis extrahatur : plerumque enim ex voracitate & crapula in

Q.



morbum talem prolabuntur: utque humores caput occupantes reuellantur. Sublutio planè acris esto, pituitam, bilémque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere, (qui eluendæ aluo modus vſitatus eſt) & cucurbitę agreſtis interanea, aut centaurij comæ decoctū ex oleo, aut aqua. Optima quoque ſublutio fuerit, mellis cōſuetæ portioni ruta adiuncta, & cum vngvine elixa, & terebinthi arboris reſina, & ſal pro nitro, & hyſſopi decoctum. Quod ſi per hæc ſubſidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut ſenſum ab illo marcore ſuſcipiens, aut arteriæ bono pulſu reſtituto, aut facie vtcunque meliora ſignificante, ſpes ſalutis concipienda eſt, audaciūſque ſubueniendum. Interim igitur roboratis viribus, purgatorij medicaminis, quod ſacrum vocant, ieiuno maxime quidem integra potio danda eſt: ſi vires prohibeant, dimidium cum mulſa. & æger in lectica ſupinus collocatus agitandus eſt, ſenſim eum qui ferunt geſtantibus, frequenter verò, quò



CVRAT. ACVT. LIB. I. 248

lafsitudo arceatur, interquiescat, ac si  
alius liquida fit, libens admittito: si ve-  
cus, aqua, aut mulse cyathos duos posui-  
dato. Sin autem & dum purgatur, nau-  
seabundus fit, id ne prohibeto. nam & il-  
la distentio ad expergefaciendum vigo-  
rem quendam præstat, & pituitæ vom-  
itus morbi causam euellit: sensum verò,  
& caput, & nervos repurgat sacrum quod  
vocatur medicamen. De qualibet itaq;  
ab initio administranda purgatione sa-  
tis differuimus. Totum verò hominem  
lanis inuolutum oleo Sicyonio perfun-  
dere oportet, aut gleucino veteri, aut sin-  
gulis seorsum, aut simul mixtis. Sed o-  
ptimum fuerit ad cõspissanda olea ce-  
ræ parum colliquare: atque ista nitri ac  
piperis mixtione valétior reddenda est:  
sint verò tenuiter contrita & cribrata.  
At miram habet vim ad resolutos ca-  
storeum, & illitum cum aliquo ex ante-  
dictis oleis: sed longe potentius est, si cū  
mulla potui detur: portio verò tanta fit,  
quantam in veteriosis nouimus. Conie-  
ctare autem oportet & ætatem ægrotan-  
tis, & mentem, an pluribus diebus bibe-



re sit paratus. Nempe inunctiones irrigationibus præstant, facilius feruntur, & magis proficiunt: neque enim dilabentes lectum & stragula inquinant, ægrotis verò id inutile est: illæ autem inhaerentes corpori in colliquatas partes à calore sorbentur. quinetiam & ipsarum perpetuitas conducibilis est. nam irrigatio diffluit. Inunctionum autem materia est, quæcunque à me supra dicta sunt: cum ipsis verò castoreum. Accipitur itaque resina terebinthi arboris, euphorbium, limnestis (hoc est adarce) pyrethrum æquis portionibus: piperis, galbani dimidium, nitri Aegyptij triplum, ceræ quantum ad liquida conspissanda satis sit. Cæterùm medicamina multo magis quàm hæc, varia, & multo plura seorsum loco suo tradita sunt. epiplasmata quoque duris distentisque partibus superdanda. Horum sylua est, lini semen, scœnum Græcum, farina ordeï, mel: oleum, ubi ruta, aut anethum incocta sint: althææ radix pinsecta, & in mulsâ usque ad ceræ molli tudinem decocta. Sunt verò & tractabilia,



& temperatura suauius. Siquidem adhuc febre vacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facienda sunt. At si febres acutæ sunt, & reliquus morbus his leuior esse videtur, febres verò in discrimen adducunt, ad has & victus rationem, & reliquam curationem conuertere oportet. Alimentis itaq; summe tenuibus, & facili coctionis vescendum est, atq; oportunitas nunc magis obseruanda. Et per totâ curationem in exacerbationibus subtrahere, atq; penitus in febres animum intendere oportet. Cum morbus autem diu trahitur, & caput in causa est, cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim quàm venę sectio, proficit, & vires nequaquã labefactat. Sed prius inter scapulas inanẽ cucurbitulam admoueat: vt in contrariũ eius quæ in occipitio est, succos reuellat. Nempe interdũ & gula resoluta est, in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis, & medicaminibus transmittendis. neq; enim inedia famisq; tantũmodo periculũ instat, verũ etiã tussis,



difficilis spirationis, atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibū infundat, in arteriam subterlabitur, cum neque tonsillæ ad impulsū ciborum concidant, neque epiglottis in proprium locum subsidat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est mulsam, aut succum longa mystila infundentem, supraque arteriam attolentem in gulā demittere: id quoque enim ad deglutiendum inseruit. Verum enimvero si ægrotus iam morti proximus sit, ipsius adeo ceruix spiritusque congelascunt: ideo ceruicem & mentum calefactoriis illinito & foueto. Frustra verò laborant, atque imperiti illi sunt quicunque sub mento cucurbitulam, ut gula dilatetur, affigunt: quandoquidē non dilatatione ad impositionem ciborum, sed ad deglutiendum compressione opus est, dilatat autem cucurbitula: & cum deuorare velis, prohibet reuellens ac retrahens, cum remittendū potius sit, quò in deuorando constrictio fieri possit. Insuper arteriam repleti, ut strangulatio fiat periculum est, neque etiā si hac,



CVR AT. ACVT. LIB. I. 249

& illa in parte gutturis affixeris, quicquam prodest. musculi nanque & nerui & tendones & venæ ante ipsum positi sunt. Vesica vtiq; & laxum intestinum inter se proxima interdū ad excernendum debilitantur, resoluuntur, recrementorūq; semper plena reperiuntur: vesica verò & in maximam molem extumescit. Interdum autem ita resoluuntur, vt purgamenta cōtinere nequeant: per ipsa enim tanquam inanima superuacua delabuntur. Tunc igitur instrumentum, quod cathetera vocant, in vesicam demittere haud sanè tutum est: ne corrumpatur enim vesica, atque homo conuellatur, discrimen impendet: sed præstiterit cremore haud multo aluum subluere: cumque stercus ab intestino eiectum fuerit, iterum iniiciendum est cum oleo castoreum. Spes autem vnica omnium pariter resolutorum, separatimque singularum partiū eo vitio laborantiū in oleum inessio fuerit. quomodo verò ipsa administretur, in sermone de Diuturnis morbis exponetur.



## DE COMITIALIS AC-

cessionis curatione,

cap. V.

**C**omitialis morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit, nonnunquam enim & vno die hominem perdit. Periculosæ etiā sunt per circuitus exacerbationes: vnde factum est, vt in acutorum numerū comitialis morbus poneretur. Quòd si malo assuescat homo, & morbus tenaciter adhaerens occupet, non solū diuturnus, verū etiā nonnullis perpetuus efficitur. nā si ætatis florem vigoremque excedit, conuenescit cum ægro, commoriturq; . Quotquot igitur medicamina vt diuturno morbo cōueniunt, in sermone de Diuturnis comprehenduntur: quotquot autem ad mortis celeritatem euitandam facienda sunt, horum plura in sermone de Attonitis tradidimus, venę sectiones, alui sublutiones, inunctiones, cucurbitulas. hæc enim vt homo expurgiscatur, valentissimè efficiūt. Quotquot autem prolapsu peculiaria adiutoria inueniū-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 252

tur, ea in præsentia docebimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex vehementi refrigeratione inusitata hæc labes incessit, vomitus aut cibi, aut pituitæ, aut aliorum quorundam succorum prodesse consuevit. pennæ autem irino vnguento delibutæ nauseam excitant: veruntamen & irino non vsque ad conuulsiones tonsillæ sunt illinendæ. Comprimere quoque leniter ilia opus est, puerum in ventrem suspensum conuertendo. hæc enim figura ad vomitum habilissima est. At si vellatur, aut distorqueatur inferior maxilla, aut manus & crura iactentur, aut vna cum toto corpore oculi distendantur, manibus perunctis tractando demulcere conuenit: obtorti oculi dirigendi sunt: rectæ partes ne torqueantur, suauiter continendæ: frigida membra lanis antiquis fordidis, attritisque panniculis fouenda, sed et præterea melle cum rutaceo oleo inungito, aut cum nitro, aut resina liquida cum his mixta: hæc quoque leniter intra anum intruditro. flatus enim proliciunt. flatuum autem excretio



huiusce morbi in pueris medela est. Porro si deglutire valeant, pharmacum istud exhibendum est, cardamomi pars, æris cōbusti ℥. hæc ex mulsa propinato. aut enim euomunt vnà cum humoribus vētriculum infestantibus, aut alius subducitur. Optimum quoque est huiusmodi linctuarium, cardamomi, sinapis, hyssopi comæ par modus, iridis radicis pars cum nitri duplo, piperis tertia pars: omnia cum melle permisceto, & maxillā diducēs in os infundito: interius etiam, quàm vbi sunt tonsillæ, quò deglutire valeant, iniicito. Hæc adeo pueris expedit. Iuuenib<sup>9</sup> autē & hæc quidem profunt, verùm etiam potentiora his medicamina ad vomitum deligenda sunt, vt narcissi bulbi, sinapis, & hyssopi pares partes, æris & piperis dimidio minus quàm priora, cum melle miscens exhibe. Hæc profecto ad leuandam exacerbationem abundè fuerint: quæ verò ad propulsandum morbum facient, in sermone de Diuturnis morbis persequemur.



CVRAT. ACVT. LIB. I. 253  
DE CVRATIONE RIGO-  
ris, quem tetanum vocant,  
cap. VI.

**I**N præsentia lectum mollem, tractabi-  
lem, lauem, suauem, calidumque esse  
necesse est. neruos enim inflexiles, du-  
ros, rigētesque morbus efficit: quin etiā  
cutis tota squalens asperaque corpori  
obtentata est: palpebræ natura versatiles  
vix oculos conuiuendo protegunt: ocu-  
li intenti sunt, in profundo conuoluti:  
nec non & artus sunt deligati, ob disten-  
tionem immobiles. A Egroti domiciliū  
calidum esto, si æstas sit, citra sudorem,  
aut resolutionem: ad syncopam enim  
morbus inclinatur. Neque verò ad alia  
magna remedia cunctanter accedendū:  
haud enim differendi datur occasio.

Quapropter siue ob refrigerationem  
absque manifesta causa rigor inuasit,  
siue ex vulnere, siue ex abortu mulieri  
incesserit, venam in cubito rescindito:  
curans in deligando brachio laxiorem  
compressionem fieri, sectionemque le-  
niter & facilè expediri: siquidē ista ner-



uorum conuulsiones cient. Semel etiam  
cruor citra defectum animæ frigusque  
extremorum mediocriter effundatur.  
Neque inedia æger maceretur: res enim  
frigida siccaque fames est. Propinetur  
itaque mulla spissa, meracior, & ptisanæ  
cremor cum melle. Ista nanque & ton-  
sillis comprimendo minimum dolorem  
inferunt, & gulę deglutiendo lenia sunt  
& facilia, & ad molliendam aluum mol-  
lissima, & ad vires instaurandas valen-  
tissima. Omne corpus lanis inuoluito  
oleo gleucino, aut crocino madetibus,  
in quibus aut rosmarinus, aut conyza,  
aut artemisia incocta sit: atq; omnia &  
facultate & ad tactum calida sunt.  
Oblinere autem corpus vngvine con-  
uenit, quod ex limnestide, (quam adar-  
cem esse putamus,) quod in stagnis na-  
scitur, & euphorbio, & nitro, & pyre-  
thro conflatum est: his verò & multum  
castorei adiiciatur. Bene quoque fuerit  
tendones lanis contegere, & secundum  
aurem & mentum loca perungere, nam  
partes hæ maximè patiuntur ac disten-  
duntur. Præterea leuibus calefactoriis



fouenti sunt tendones & vesica per sacculos milium torrefactum includentes, aut bubulas vesicas olei calidi semiplenas: quò locis quæ fouentur, secundum latitudinem applicari valeant. Interdum coegit necessitas, vt capiti fomenta adhiberentur: quod neque sensibus vsque adeo tutum est, neque nervis salutare. sensibus enim quandam caliginem effundit multis halitibus ipsos petentibus: nervos autem replet. Quo circa modo fouendi quam tutissimo vtendū est, atque materia haud ita multum foedè olens deligenda. vtique materia esto oleum in vesicis in duplici vase citra nidorem feruefactum: aut sales tenues in sacculo. milium enim ac lini sementa ctu quidem lenia sunt, sed halitiosa & graueolentia. Ratio vero fouendi huiusmodi esto: tendonibus resupinato ægro fomenta vsque ad verticem subiicienda sunt: vltius vero ad synciput ne procedito. Iste namque locus omnibus sensibus communis est: ab ipsoque, tanquam ex fonte omnia adiumenta, omnes noxæ scaturiunt.



Quòd si epiplasmata tēdonibus super-  
danda sunt, erectum occipitium esto: nā  
si magis sursum versus imposueris, ca-  
put exhalationibus complebis. Materia  
fit autem epiplasmatū lini & fœnigræci  
semina. Post epiplasmata verò utilis fue-  
rit cucurbitula occipitio ab utroque  
spinæ latere adhibita. Sed parce admo-  
dum flamma accendatur: nam quæ ab  
labris cucurbitulæ fit circumpressio, do-  
loris conuulsionisque autor esse solet.  
Igitur diutius trahere præstat, ac mol-  
liter magis, quàm plurimum breui tem-  
pore. sic enim tibi in conuexum locus  
sine dolore attolletur, qui concidendus  
est. Scop⁹ autem modi sanguinis extra-  
hendi tibi vires ægrotantis proponan-  
tur. Hæc utique rigoribus, qui sine vlce-  
ribus fiunt, remedia conueniunt. At si ex  
vulnere conuulsio facta sit, perniciosum  
profectò id est, ægreque de salute spera-  
ri potest: nihilominus tamen opem fer-  
re decet: quādoquidem nonnulli & ad-  
hibitis remediis mortem euitarunt. O-  
portet sanè ultra cæteram medelam &  
ulceribus consulere cum calefacienti-  
bus,



CVRAT. ACVT. LIB. I. 257

bus, quæcunque à me iam dicta sunt, irrigando, & fotibus, & cataplasmatibus, & medicamentis, quæcunque & facile calorem excitent, & humectando pus abundè moueant. Vlcera enim in rigore sicca & squallida sunt. Accipito ergo thuris mannam, polij comam, terebinthi pinique arborum refinam, althææ radicem, & rutam conyzamque herbam: hæc in cataplasmatibus commiscere opus est, alia liquando, alia quæ puluerea sunt, inspergendo, alia in oleo prius macerando. althæam verò in mulsâ ante contusam decoquito. Inspergendum est etiam vlceri castoreum: neque exiguus inde in totum corpus calor emanabit. Horrores enim ab vlceribus prodeuntes malefici sunt. Perungendæ quoque sunt nares castoreo cū crocino vnguento permixto: quin etiam castoreum trium obolorum pondere assiduè bibere expediet. verùm si ab hac potione gula laboret, interiicienda est laserpitij radicis exhibitio ponderis tanti, quanti & castoreum dandum esse diximus: aut myrrhæ dimidio minus quàm laserpitium.

R



fed omnia cum mulla potanda præ-  
beatur. Quod si Cyrenaici laserpitij la-  
chrymæ copia tibi fiat, hanc opus est  
melle cocto inuolutam ad erui magni-  
tudinem deuorandam dare. ita enim  
optimum factu est, quod palatum præ-  
teriens agrotum lateat. acris est enim,  
ructumq; insuauis ac foedè olēs excitat.  
si neque hac ratione deuorari possit, in  
mulla eliquata propinetur. Omnibus e-  
nim potionibus, quæcunq; calefacere,  
humectare, distentionem laxare, & ner-  
uos remollire aptæ sunt, hæc haud du-  
biè valétior est. Cæterum si nihil egro-  
ti deglutiant, in anū castoreū cum oleo  
dandum est: hoc etiā anus cum vngvine  
aut melle illinendus: hoc item vesica ir-  
riganda, & cum cera, vt crassius red-  
datur, perungenda. Sin autem flatum ster-  
cusq; educēdi tempus adsit, purgatorij,  
quod hierā, id est sacram, vocāt, drach-  
mas duas cum mulla, & oleo in fedē in-  
iicito. Nam præterquam quod illa euo-  
cat, intestinum etiam & inferiorem vē-  
trem calefacit ac fouet. varium nanq;  
& calidum medicamentum hiera est.



**D**Væ anginæ species reperiuntur, al-  
tera cum caliditate, & magna ton-  
sillarum inflatione, & extrorsum ver-  
sus tumefactione: quin etiam lingua,  
gurgulio, & omnes adiacentes particu-  
læ in tumorem efferuntur: altera istis  
locis collapsis & submissis efficitur: sed  
interius compressio maiore strangu-  
latu discruciat: vt interna inflamma-  
tio ad cor vsque pertinere videatur.  
Huic quàm celerrime occurrendum  
est. nam & hac celerrime ægroti ra-  
piuntur. Igitur si crapula, & ebrietas  
in causa sunt, eodem die inferius hu-  
morem iniicito: isq; duorum generum  
fit, alter vſitatus, quò stercora educan-  
tur: alter eiusmodi, vt aliquas à tonsil-  
lis pectoreq; humiditates euellere pos-  
sit. neq; tamen in cæteris efficacior me-  
raciorque esto: sed centaurij & hyssopi  
decocta infundenda sunt. hæc enim &  
pituitam educere solent. Si tenuis au-  
tem victus præcesserit, scindere cubiti

R 2



venam expediet: & latior sectio, quò maiore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Huiusmodi namque profusio minime quidem ad caliditatem mitigandam satis est: sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminueri valet. Haud ignobile quoque ad iumentum præstat, si ad animæ usque defectum ægrum perduxeris, usque eò tamen, dum ne anima deficiat. quandoquidem nonnulli secta vena ab animi deliquio vita excessere. Item vinculis supratelos & genua constringentes opitularimur. Optima quoque sunt vincula supra brachialia versus cubitos, & supra cubitos versus humeros. At si deglutienti via expeditissima sit, elaterium & cum mulsa, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeatur. aliis enim purgatoriis elaterium in his ægrotis præstantius est. Conferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: siquidem hæc ambo ventrem repurgant. In quibus verò inflationes deuoracionem impediunt, linguam ad palatum reflectens, ipsius venas rescindito. quòd si



promptè multusq; sanguis defluat, inter alia remedia hoc magis proderit. Irrigationes vtique locis inflammatis primum quidem adstringentes, quò retrorsum materiæ labantur, conueniunt. quã ob rem lanæ sordidæ cum œsypo vino madentes, aut oleo ex immaturis oliuis expresso accipiantur. Quin etiam cataplasmata irrigationibus similia sunt, exempli causa palmulæ vino madefactæ tunfæque cum rosarum foliis. quò sit autẽ viscidum & molle cataplasma, etiam ordeï farina admisceatur: aut lini semen, & mel, & oleum: vt omnium mixtura fiat. Quòd si ad suppurationem veniat, calida admouenda sunt: quibus & in altera anginae specie vtendũ est. adesto igitur fœnigræci farina, & manna, & resina, quæ liquari possunt: & polij coma inspergatur. necnon & fomentum calidum adhibeatur, spongiis in decocto lauri baccarũ hyssopi que madentibus. Ad mouendum pus autem efficacissimũ est columbinus finus tenuiter per criseram, id est lineum sacculum, instar pulueris transmissus, ac superinspersus.

R 3



idem & caninus eodem modo præstat.  
Ex mulsa verò cum lentis, aut hyssopi,  
aut rosarum, aut palmularum, aut simul  
omnium decocto collutiones fiant. Illi-  
nendum præterea totum os est usque ad  
intimas fauces, simplicibus quidem, ut  
mororum, aut malorum punicearum aqua  
maceratorum succo, aut palmularum  
decocto: compositis verò medicamen-  
tis, ut diamoro, quod vocant, aut eo  
quod ex besasa, id est ruta sylvestri, &  
succo rhoi componitur: aut diacheli-  
donio, id est ex hirundinibus confecto  
medicamento. Sin ulcera crustosa sint,  
collutiones & gargarismi fiant ex hyssopi  
in mulsa, aut pinguium ficorum in  
aqua decocto: præter hæc amyllum per-  
colatum in mulsa, aut in ptisanæ tragi-  
ve cremore. Si angina cum conciden-  
tia, quæ erat altera species, occupet, ab  
interioribus extrorsum omnia euocan-  
da sunt & humores, & caliditas, & om-  
nis caro, ut totum foras extumeat. Pro-  
inde calidæ irrigationes sunt cum ru-  
ta, & anetho, nitro insperso: & cum his  
superius memorata cataplasmata. Pro-



ficit etiam ceratum ex nitro & fina-  
pi ad calorem excitandum superdare:  
calor autem exterior huiusmodi vi-  
tium tollit, sed in collo tumor extube-  
rat. Tumor autem foràs in sublime ela-  
tus à pulmonis inflammatione libe-  
rat, intus verò abditus anginam patien-  
tibus perniciosum malum est. At qui-  
cunque strangulationem ab angina ve-  
rentes, quò laxius spiritus duceretur, ar-  
teriam secuerunt, non sanè experimen-  
to rem comprobasse videntur. Quip-  
pe caliditas inflammationis maior ex  
vulnere efficitur, strangulatum adau-  
get, tussimq; commouet. Quin etiam,  
si alioqui periculum id euaserint, vulne-  
ris oræ in vnum coalescere nequeunt:  
ambæ enim cartilagineæ, atque inter se  
inglutinabiles sunt.

DE CVRATIONE COLV-  
mellæ. cap. VIII.

Vltiorum, quotquot columellam infe-  
stant, aliqua per succisionem curare  
necesse est: sed de eorum chirurgia dis-  
putare ad præsentem locum nō attinet.



aliqua, vtpote acuta, medicamentis sananda sunt. nam facile strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est utique, quāvuam, & quā columnam dicimus: vtraque enim cum inflammatione, crassitie, longitudinéque suboritur, ita vt in arteriam pendulae fiant. AEquabili sane crassitudine à basi ad summum vsq; palatum columna, inæquali verò vua constat. huius enim ad palatum basis gracilis est, in extremo teres & crassa, rubens aut liuida. iccirco & vuæ appellationem id vitium sortitum est. Quapropter his maturè opem ferre decet: celerrima namque à strangulatu perniciēs impendet. Proinde si ægroti iuuenes sunt, à vena cubiti sanguis detrahendus est: utque largius euacuetur, maiore plaga vena aperiatur. siquid enim huiusmodi sanguinis detractio à strangulatu, tanquam à laqueo ægrotantem liberat. Subluenda quoque alius est mitiori lotionē primū: deinde aliās, atque aliās acriore, vsque eò dum aliquid à superioribus partibus deriuetur. Circudentur & vincula ad-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 265

stringentia extremis crurib<sup>9</sup> supra mal-  
leolos & genua: necnon & humeris su-  
pra brachialia atque cubitos. Quod si  
strangulatio inualescat, cucurbitula oc-  
cipitio atq; pectori adglutinetur, & ista-  
rum aliqua incidatur: omniaque admi-  
nistrentur, quæcunque à me in capite de  
angina præcepta sunt, cùm eadē in vtro-  
que vitio sit mortis ratio. Iisdem præte-  
rea intra os medicamentis & adstrin-  
gentibus & mollientibus, & exteriori  
fotu, & cataplasmatibus, & oris inunctio-  
nibus vtendum est. Circum columnam  
verò, aut circum vnam adstrictorium  
rhoi succum, acaciā melle aut aqua dis-  
solutam, hypocystida, terram Samiam,  
Lemniāue, aut Sinopicam rubricā, at-  
que omphacium ponito. Si vlcerosa sit  
vua, gummi & amyli rosarum aut pal-  
mularum decocto liquefacta: item pti-  
sanæ aut tragi cremor adhibeantur. At  
in columnæ curatione aliquanto plus  
valentiorum medicaminum adiicito,  
quæ ex myrrha, costo, atque cypero cõ-  
ponantur. Nam id genus acria columna  
tolerat. Verùm si nonnullis locus iste



purulentus effectus est, atque palati of-  
 fa computruerunt, hi longo temporis  
 interuallo vitam finiunt. Sed horum au-  
 xilia nobis alio loco præcipientur.

DE CVRATIONE PÉ-  
 stilentium in faucibus mor-  
 borum, cap. IX.

**H**Orum vitiorum curatio cum aliis  
 tonsillarum affectibus quâ commu-  
 nis est, quâ propria. In inflammatione &  
 strangulatu purgatio per clysteres, ve-  
 næ sectio, irrigationes, cataplasmata, fo-  
 tus, deligationes, cucurbitulæ, omnia  
 demum eadem, atq; in his, conueniunt.  
 Illitiones autem acriorum medicamen-  
 torum faciendæ sunt: neque enim vlce-  
 ra quiescunt, neque crustæ in superficie  
 fiunt. Verum si ab his sanies ad interio-  
 ra destillet: celeriter partes, etiam si in-  
 tegræ erant, vlcerantur: celerrimèque  
 vlcera interius depascendo serpunt, at-  
 que hominem perimunt. Porrò igne vi-  
 tium adurere, cum in superiori parte  
 sit, imprudentis esse propter Isthmum



iudico . Sed medicamentis igni simili-  
bus, quo & depastio coerceatur, & cru-  
stæ decidant, vtendum præcipio, Ea ve-  
rò sunt, alumen cum melle, galla, balau-  
stium, arida cum mulla. Hac eadem ca-  
lamo, aut penna, aut crasso & oblongo  
caule, quò medicamina ad vlcera per-  
ueniant, inspiranda sunt. Optima fanè  
est & chalcitis vsta cum trita cadmia  
ex aceto. esto autè cadmia portione du-  
pla : & rhei radix cum aliquo humore.  
Præterea ne vlcera compressio fiat,  
cauendū est: ab ea nanq; & humescunt,  
& magis exedunt. Hac de causa opus est  
pinna medicamenta arida inspergere:  
liquida verò liquentissima reddentē in-  
gurgulionē infundere. At si crustæ iam  
resoluuntur, & vlcera rubida fiunt, tunc  
consulsionis maximè periculum sub-  
est. resiccantur enim plerunque vlcera,  
& cum his nerui distenduntur . Itaque  
lacte cum amylo, & succo ptisanæ, aut  
tragi, aut lini seminis, aut fœnigræ-  
ci remollire madefacereque conuenit.  
Quibusdam & columella vsque ad pa-  
lati os exesa est: quin etiam tonsillæ ad



basim vsque & epiglottida. ac propter cicatricem deuorare neque solidū quicquam, neque liquidum poterant. Sed & ipsum quod bibebat, interdum reperfusum hominem fame necauit.

DE CVRATIONE PLEVRITIDIS, seu morbi lateralis,  
cap. X.

**N**ulla moræ atque dilationis in pleuriticis, quin protinus valēti remedio succurramus, datur occasio. Febris enim peracuta ad perniciem properat: dolor quoque succingentis membranæ in pectus vrget, necnon & tussis pectus caputq; concutiens vires proterit. Quocirca eodem potissimum die vena cædenda est. Sin autem ex ingurgitatione ciborum potusq; ægritudo prouenerit, inedia diem vnum ægroto imperāda. post, sanguinem à vena mittito, quæ in cauo cubiti est, non eius qui secundum rectū incessum inflammatis costis opponitur: præstat enim maximè procul abducere. Sanguinem verò ne vsq; ad animæ de-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 269

liquium fundito. nam si refrigeratū cor-  
pus animo destituitur, pulmoniam inua-  
dere periculum est. Humores enim ex-  
teriori caliditate attractioneq; priua-  
ti, in penitiores partes relabuntur. Item  
pulmo rarus, calidus, ad trahendumque  
valentissimus est: costis etiam proxim<sup>9</sup>,  
earumque doloris est particeps. Verū  
morbi pulmonis pleuritidi succedentes  
non vsquequaque salubres sunt: pleuri-  
tis verò à pulmonis vomica exoriens be-  
nignior est. Quapropter cū medio-  
criter sanguis effluerit, interiecto ad  
recreandum hominem temporis spatio,  
iterum detrahare opus est: si bene qui-  
dem habeat, eodem die, cū longa re-  
missio fit: sin minus, postridie. Quòd si  
neque febris remittat (sæpe enim diem  
vnum febris occupat, & augetur) tertio  
die in secunda remissione, in qua & cibi  
dandi sunt, sanguinem mitte: totum ho-  
minem vberius perungens, costisq; oleū  
molle infundens cum calido vngvine  
ex rutæ anethive decocto. Ipsum verò  
latus admodum leniter irrigandum est.  
sed nonnullis & dolor & inflammatio



erupit, vt eorum locorum affectus esse videretur: cū tamen id interiorum vitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia, quemadmodum & de vniuersa curatione, quò nihil in ea delinquatur, sermonem habeamus. in alimentis enim medicamenta ponentur: quin imò in alimentis medicamenta sunt. Itaque genere calidus humidusque cibusesto, lenis, æquabilis, migmatodes, id est bene permixtus, dissolutorius: pituitam soluendi, extenuandi que potestatem habēs. Proinde cibariis omnibus ptisana anteponatur, initio quidem, quò ipsius crassamentum solidumque reiiciatur, in cremorem percoletur, soloque cum melle condiatur. ab ipsa verò vlitata ad voluptatem varietatemque parandam medicamina remoueantur. in hac enim egritudine solus cremor satis est. Quippe humectare, calefacere, pituitam soluere & detergere, per superiora sine molestia, quacunque euocanda sunt, euocare, facile quoque ventrē ducere sola ptisana potest. Ipsius verò lenitas blāda est & ad deuo-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 271

randum habilis. ipsius etiam lentor caliditates mitigat, membranas mundat, tusses concoquit, omnia emollit: tales ordei virtutes sunt. Halica verò secundum gradum occupat: quæ cum pauca quædā cum ptisana cōmunia possideat: ob ea probatur, optimaq; censetur. Lentor enim, lenitas, suauitasq; in deuorando vtriq; cōmunia sunt: in ceteris omnibus halicam ptisana antecellit: sed ea quoque simplex cum melle solo conficiatur. Tragi præterea boni sunt. Deterior ipsis oryza est: quoniam siccat & exasperat: potiùsq; costarum purgationem supprimit, quàm facilem reddit. Optimus quoque est panis aridus, contusus, per subcerniculum transmissus, bene temperatus, concoctu facilis: cum mulsa, quantum satis est, alimenti præbet. Nempè si iandiu morbus produciatur, cum dictisq; cibariis homo labare cœpit, ptisana ex ordeo præbeatur bene trita, bene cocta: cōdiatur verò anetho, sale, & oleo tenui, puro, nō viscido, non exasperante. At non multum olei cum ptisana coquere præstat. nā & sorbitio-



nem pinguem reddit, & prauitatē oleū deponit: longa enim decoctione in cremorem ordeī absorptum amplius non apparet. Item porrum cum sua coma, & amygdala amara cum cremore incoquantur. Ita nanque ferculum ad spirationem expediendam commodum medicamentosumque ab his efficitur. Porri autem cum cremore comesti vtilitatem iuxta delectationemque summam afferunt. Iam verò & ouorum bonum succum creantium opportunitas adest. ac si humida copiosaque per os materia feratur, sulfur ignem non expertum, nitrumque in oua inspergito. Sed mirifice profunt oua nuper à gallina edita ex igne igne carentia: quippe à matre caliditas inest igne quidē humidior, sed ægrotanti familiarior, vtpote animali ab animali. Sin autem pituita glutinosa ac tenax sit, in oua oleum infundito, ac resinā siccā pineā, quò sulfur melius reddatur, inspergito: necnon & terebinthi resinā eliquato. Piper præterea in ouis, in ptisana, in omnibus epulis, & quęcūq; piperi similia sunt, benè proficiunt. Inter  
carnes



carnes extremi pedes in cremoribus eliquati, colúbe, gallinæ elixæ, porcorū cerebra cū omēto quidē tosta, sine illo verò nidore vacantia. Si inter spirandum æger strepitum non reddit, dandi sunt etiam marini pisces aut saxatiles, quicquid optimum regio ferat. Verū vt neq; cupiditate delinquat, neque victus tenuitate contabescat, ex fructibus malū cōcedito in aqua, aut mulsa elixum, aut cum adipe assatum: sed corium & interiora aspera cum seminibus abiiciātur. Tempore quoque illo, quod horā Græci nominant, fici, & alij id genus fructus concedantur: quatenus scilicet innoxij sunt, quin potius adiumentum præstant. Hæc sanè de alimentis abundè sint. Lateri autem lanæ superduntur sulfure fumigatæ, vngvine imbutæ, in quo anethum rutæue incocta sit. Igitur his latus madefaciendum, cataplasmatisque ante cibi assumptionem tegendum est. præter vñtata cataplasmata fertulam in mulsa elixam accipito, cui papaueris carnem incoctam cōmisceto, mannæ quoque puluisculum inspergito. At si humi



dius spūm copiosumque reicitur: loliij farina, aut irionis cōmiscenda est, & nitrum inspergendum. Cæterum si morbus productior sit, dolor est pertinax, & humida sit expurgatio: tunc purulētum hominem fore speratur. itaque sinapi & cachrys cataplasmatibus admiscēda sunt. Sed si penitiores locos ægroti frigidos esse persentiunt, acetum affundito. illud autē efficere operę precium est, ut cataplasmatū calor diu efficax permaneat. melior est enim id genus caliditas, quā cataplasmatum innouatio. Proinde calefactiones in sacculis ex huiusmodi, utpote ex milio fiant, aut ex calenti oleo in vesica incluso. Omnis verò fatus machinatio, ne pondera dolori dolorem adiciant, levis esto. his enim leuibus & assumpto cibo, cum dolor infestat, uti nihil prohibet. Iam verò post hæc etiam ad mouendæ cucurbitulę occasio adest: sed hoc post septimū diem facere optimum fuerit: ante ne festines. haud enim placidi morbi sunt, quicūque ante septimum cucurbitam requirunt. esto autem magna, omni ex parte lata, dolentem



CVRAT. ACVT. LIB. I. 275

locum ambire valens. quippe cū haud  
interius descendat dolor, sed in latitu-  
dinem diffusus sit. At flamma sub cu-  
curbita multa esto: quò non solum at-  
trahat, verum etiam ante ignis extin-  
ctionem calefaciat. Extincto igne scari-  
ficandū est, tantūque sanguinis, quan-  
tum vires permittunt, detrahendū. mul-  
to verò plus esto, quā si alia de causa  
de præcordiis sanguinem haurires. nam  
maximè perspicuum est, quod in lateris  
morbo vexatis à cucurbita percipitur  
adiumentum. Sal quidem, aut nitrum  
in scarificationibus mordacia sunt ac  
dolorifica, sed salutaria. Quapropter  
consideranda sunt hominis vires & in-  
genium: nam si forti animo ac tolerans  
sit, sal inspergendus est, non ipsis vulne-  
ribus ita, vt ipsa contingat: sed super lin-  
teolum oleo madidum inspergatur. id  
verò super locum scarificatum exten-  
dito: humiditates enim ex salis colli-  
quatione manantes minus quā sal,  
mordaces sunt. Sed multo oleo perfun-  
dendum linteolum est, quò huius leni-  
tate morsionis dolor retūdatur. Secun-

S 2



do die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: vt ex vulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. id verò priore cucurbita multo est efficacius, multoq; magis vires conseruat. neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atque id quidem facito, cum prius vires exquisitè perpenderis. Die tertio ceratū cū cyprino oleo & rutaceo imposito. Quod si vltèrius purgatione sputa indigeat, in ceratis resinā eliquato, aut sulfur ignem nō expertū admisceto, atque iterum fotum loco adhibeto. Porro modus cucurbitæ talis esto. fictile vas habendum est, leue, lateri congruens, latū: aut æneum. Id pronum in labra dolentibus locis circumponito: flammam verò multam cum oleo subiicito, quò viuens flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad difflationem transitus aliquis esto, quò minus suffocata flamma extinguatur. diutius verò illam accendere expedit: nam intra vas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris prouocatio. Neque verò



medelā inferioribus partibus adhibendam negligere oportet: viris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in vterum infundendum est. Perpetuò sanè quæ bibuntur, ac deuorantur sunt, mulla cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit: vt in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbendi tempus adsit, aliquod compositum, quod picerium Græci dicunt, accipiat ex variis constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem fabæ magnitudinē æquant, turbinatosque dare oportet sub lingua continēdos, huc atque illuc iactandos: vt nō deuorabile, sed eliquabile sit. Suaue quoque est id quod ex papauere cum melle ac fertula campana medicamen conficitur lene, atque somniferum. Hæc vtique & ante cibi assumptionem, & assumpto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt: sed ieiuno medicamentosa exhibeantur: quale est, quod hæc accipit, vrticæ, lini seminis, amyli, nucis pineæ, cuiusque contriti cyathū, amygdala amara numero vigintiquinque, to



tidem & piperis grana. oportet autem  
hæc torrere, ac trita cū melle ad ecleg-  
matis temperaturā permiscere. horum  
detur mystillā vna. si liquida crudāque  
excreat, myrrhæ pondo drachmas duas,  
croci pondo drachmam vnam, piperis  
grana quindecim, cum mellis pondo li-  
bra subigito. id sanè medicamentum &  
ante cibi acceptionem mystillæ dimi-  
diatæ mensura dari debet. bene facit in  
longo lateris morbo, quando & oxy-  
mel dare cōuenit, si spirandi vrgeat dif-  
ficultas. Frigidam verò aquam quicun-  
que medici pleuriticis concesserunt: ne-  
que qua ratione id fecerint, assequi va-  
leo, neque experimento cōfirmare. quip-  
pe si qui à frigida periculum euitarunt:  
hi profectò mihi non laborare pleuri-  
tide visi sunt. Verùm apud vetustiores  
etiam medicos species quedam concur-  
sus pleuritis, seu lateralis morbus voca-  
batur: cū bilis esset excretio, cum do-  
lore lateris, & exigua febre, vel etiam  
sine febre. Huiusmodi sanè affectus no-  
men quidem pleuritidis, rem verò non  
obtinet. Quinetiam spiritus nonnun-



CVRAT. ACVT. LIB. I. 279

quam in latere conclusus sitim, dolo-  
rem prauum, mollémque caliditatem  
excitat: id quoque vitium ignari homi-  
nes pleuritici nuncuparunt. His nempe  
frigida aqua remedio esse poterit, cum  
prospera vtentis fortuna extincta sitis  
erit, bilis ac spiritus per inferiora sub-  
ducetur, & dolor & caliditas exhala-  
bunt. Verum in lateris inflammatione  
& succingentis membranae tumore non  
solum frigida aqua, sed etiam frigida  
respiratio noxia est. Itaque si ex prius  
tradita medendi ratione incolumes red-  
duntur pleuritici, paulum tamen adhuc  
tusiunt, & caliditas subinde repetit, at-  
que infestat: ad hæc penitus discutien-  
da maturandum est. aut enim quæ re-  
linquuntur, recidivas faciunt, aut ad sup-  
purationem conuertuntur.



# ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM ACV-  
torum curatione,  
Liber II,

IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

Curatio pulmonariæ,	cap. I.
Curatio reiectionis sanguinis,	cap. II.
Curatio cardiaci affectus,	cap. III.
Curatio cholerae,	cap. IIII.
Curatio voluuli,	cap. V.
Curatio acutorum iecoris affectuum,	cap. VI.
Curatio acuti morbi venæ & arteriæ dorsi,	cap. VII.
Curatio acuti renum morbi,	cap. VIII.
Curatio acutorum vesicæ vitiorum,	cap. IX.
Curatio vuluæ strangulatus,	cap. X.
Curatio satyriasis,	cap. XI.



CVRAT. ACVT. LIB. II. 281  
CVRATIO PVLMONARIAE,  
cap. I.



Eracutū letalēq; ma-  
lū est inflamātio re-  
pletiōq; pulmonis:  
quas strāgulatus bre-  
uis cōsequitur. Igi-  
tur æquis resistētia  
viribus, maturēq; fe-  
renda subsidia sunt. protinus in cubito  
venę aperiātur, siue vtraq; in dextra vi-  
delicet, ac leua manu, idque potius: siue  
vna tātum, & ea maior: quò ab vtraque  
pulmonis regione humiditatum reuul-  
sio, nō tamen vsque ad animi deliquium  
fiat: strangulatū enim animi deliquium  
auget. Cæterū si vel paulum respira-  
uerit: tunc suppressendus sanguis est, ac  
denuò postea mittendus. nam si à san-  
guine morbi causę prouenerint, eas ve-  
nę sectio tollit. Atqui seu pituita, seu spu-  
ma, seu quæuis alia humiditas tumefa-  
ciat, venarum inanitiones ampliorem  
pulmonis locū ad respirationis transi-  
tum efficiunt. opus est autem humores



& flatus post venæ sectionem deorsum  
versus trahere, nitro, melle, ruta, resina  
terebinthi liquida sedem oblinēdo. sed  
missionis sanguinis loco, si quod maius  
impedimentum sit, acrem succū per cly-  
sterem in sedem immittito: vt puta sa-  
lem cum nitro, aut terebinthi resinam  
cū melle. Ruta quoque in oleo, & hy-  
sopum in aqua decocta, item cucurbitæ  
syluaticæ carnes interiores in aqua ex-  
coctæ conueniunt. Præterea inanes cu-  
curbitulæ egregiè faciunt, si tergo, dor-  
so præcordiisque vbique adhibeantur.  
quod sicubi pectus carnulentum sit, quod  
minus circum ossa cutim cucurbitula  
incumbēs affligat, ibi eam affigito. nam  
si ad quancunque partē corporis humo-  
res distrahantur, & spiritus ad extrema  
euocetur, quib⁹ pulmo opprimitur, ali-  
quod mali solamē inuenias. omni enim  
ex parte pulmonaria obsidenda. impu-  
gnandaque est. Verū neque vllum ex  
his medicamentis, quæ ore sumpta con-  
ducunt, despiciendum est. quippe ea est  
natura pulmonis, vt siue recte valeat, si-  
ue agrotet, ad se humores alliciat. Quo



circa eiusmodi medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpirandum attenuent, lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant. Propinetur quidē celeriter iuuandi causa nitrum cum hyssopi decocto, aut muria cum aceto & melle, aut sinapi humidum cum mulsa. singulis autem iridis radicem & piper inspergere auso bene cedit. itē hæc arida cribrato, & cum melle exhibeto.

Quod si interdum insomnes sint, & noctem quoque totam peruigilent, ne hominē furor corripiat, metus est: variisq; somnificis medicamentis, nisi ægritudo remittat, vti decet: quod medicamēta in tempore data morbi acerbitatē leniant & obtundant. multa verò soporifera sunt. At si in strangulationis impetu, iamque aduentante interitu medicamē præbeas: apud tuos contribules mortis eius auctor appellaberis. Alimēta pariter eiusmodi esse debent, acria, videlicet, tenuia, crassitudinem dissipantia, extergendique facultatem habētia: inter olera porrū, aut cornicis pes, aut vrtica, aut brassica in aceto incocta. Inter



frumentacea verò ptisanæ cremor parum origani aut hyssopi, necnon piperis, sed plus nitri loco salis accipiens. Alica præterea mulsæ incocta prodest. Omniâque per elixationem flatum abiciant: flatus enim vomica pulmonis laborantibus infesti sunt. Vinum, si febre vacant, quod haud ita multum adstringat, potui detur: quippe densat corpora adstrictio: istis verò membra potius laxanda sunt, sputiq; educationi studendum. Sed in totum potus modicus esto, cum pulmoni madefactio inimica sit: quoniam à gula atque ventriculo trahit. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale cõtegatur. Optima inunctio est ea quæ ex adarce fit. Sinapi etiam aridum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa, & humores, & calor, & spiritus foras educendi sunt. huic rei opitulantur acrium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio hæc facienti nisi morbus cedat, de hominis valetudine actum est.



## DE SANGVINIS

reiectionis curatione,

cap. II.

**O**Mnes sanguinis effusiones, haud  
mite vitium sunt, non modi solum  
ratione, vt si per fracturā aut erosionē,  
verum etiam si per rarefactionem effun-  
ditur. neque si ex pectore aut pulmoni-  
bus, aut stomacho, aut iecore fertur, pe-  
riculosum est: è capite verò si defluit, mi-  
norem noxā affert: sanguinis enim exi-  
tus est: sanguis autem omnium est ali-  
mētum, omnium calor, omnium color.  
terrorēque incutit, sanguinem ab ore  
vtcunque manantem intueri. malūq;  
est, si à primario viscere: peius verò si ob  
fracturam, aut erosionem profunditur.  
Huius itaque vitij medicus ad opem fe-  
rendam maturet necesse est. In primis  
quidem aerem frigidiorē ad respira-  
tionem deligito, cōclaue non titubans,  
cubile firmū, quo nullam in partē qua-  
tiatur, inhabitet: concussiones enim ma-  
lum exasperant, stratum solidum, haud  
multum cedens, neque profundū, neque



calidum esto. positus figurave corporis erecta sit, ne sermocinetur, neve sermones audiant. animi absit perturbatio, sed contra oblectamenti leniatur: siquidē id genus agrotos magna animi cōsternatio corripit. quis enim vomēs sanguinem mortē instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine referti sunt, & venas prominentes habent, in qualibet sanguinis profusione venam pertūdito. nam siue ex fractura, siue ex erosione profluit, sectio venæ conducit. Sin rarefactio in causa est, ne multitudo venam effringat, metuendum. cædenda est autem caua in cubito vena. Etenim ex hac facile sanguis effluit, & ipsa sectio- ni exposita est: utque per plures dies sanguis innoxie decurrat, cōmodē aperta seruetur. in omnibus autē omnium (ut ita dicam) præcipuorum viscerum hæc est sanguinis via. vena utique hac superior, nec non & hæc vnus in brachio venæ ambæ propagines sunt. quare nihilo plus superior quàm media emolumentū affert. nā propaginū ignari sunt, quotquot stomacho & iecori superiorem ve-



nam copularunt. Sin à liene sanguis fertur, sinistrae manus venâ illam quæ inter minimum anularémque digitum sita est, rescindito: quandoquidem medicorum nonnulli eam ad lienem vsque pertinere arbitrantur. verum & hæc ipsa inter cubiti venas inferioris propago est. cur itaque potius eam quis propè digitos, quàm in cubiti curuatura profcindat, cùm hoc in loco amplior sit, & ad effluxum habilior? Prorsus quidem ante animæ defectum sanguis cohibendus est, atque haud ita multus auferendus: nã & ipsa cruoris per os effusio satis hominē labefactare potest. assiduè verò post paucum detractū sanguinem iterū detrahito & eodē die, & postridie, nec non & perendie. At si ægrotus tenuis, & inops sanguinis sit, venam ne scindito. hæc de sanguinis missione abundè sint. Succurrendum est etiam extremorum deligaturis, pedum quidem supra malleolos & genua, manuum verò supra brachiale & cubitum. fascia ipsa lata sit, quò sit validior, neque dolorem moueat cōstrictio. Nempè locis, vnde san-



guis erumpit, lanas ouium succidas im-  
ponito, & humore perfundito, vt pote  
austero vino, & roseo aut myrtino oleo.  
Si cruoris effluuium vrget, lanarum vi-  
ce spongiæ admouendæ sunt, & pro vi-  
no acetū infundito, locūque myrtino  
subungito. in omnibus autem spongiis  
acaciæ, aut hypocystidis, aut etiā aloes  
succī aridi sint. optimè facit & ompha-  
ciū aceto liquatū. Quòd si irrigatio sor-  
dida fit, agrēque feratur, emplastris vti  
conueniet: cutim enim circūtendunt, ac  
veluti manu corripunt, quinetiam ip-  
sorū facultates refrigerare, exiccarēque  
magnopere valent. Infinitæ verò alię a-  
liis experimento cognitæ vires insunt:  
sed optima emplastra ac tutiora sunt,  
quæcunque acetum habent, & salicis fo-  
liorum succū, necnon & bitumen, & æru-  
ginē, & alumen, & thus, & myrram, & æs  
vstum, & æris squammā: atque in sum-  
ma quæcūq; huiusmodi emplastra sunt:  
emplastris sordidæ lanæ, aut spōgiæ pau-  
co aceto perfusæ superdētur. sin empla-  
strorum distentionem ferre nequeunt,  
id genus epithema, facito, palmulæ pin-  
gues



CVRAT. ACVT. LIB. II. 289

gues nigro vino austero maceratae ad  
maze, id est placetae crassitudinem conte-  
runtur: postea acacia trita, & mali coria  
inperguntur, haec omnia panniculo trito  
ac veteri illita pectori inducuntur. Item  
polëtam vino aut aceto perfusam, nec-  
non lëtis farinam tenuem per incerni-  
culum transmissam cerato ex vnguen-  
to roseo facto excipiens imposito: cum  
quo & symphyti radicem tusam & cri-  
bratam admisceto. Aliud epithema haec  
recipit, prunorum damascenorum quae  
brabila Graeci vocant, agrestium radi-  
ces in aceto incoquito, ad speciem pla-  
centae contundito, ac rhoi, commis, myr-  
ti paulum misceto. ex his utique alia aliis,  
prout medicaminum efficacia, lenitate,  
odore opus est, miscenda sunt: siquidem  
& agrotantibus gratificari decet. Haec  
nimirum exterius applicanda remedia  
sunt. At his praesentior medela in po-  
tionibus deuorandisq; consistit, ut pro-  
xima vulneratis partibus medicamina  
sint. Porro triplex istorum forma est, ut  
vel fluxionis ductus liget, cogendo va-  
scula & comprimendo: vel defluentem hu-

T



morem crassum compactumque efficiant, quò licet transitus pateant, ne destillet: vel exiccent incurtus in sede antiqua sanguinem retinentes, vt ne effluuio loci exhausti ita permaneant, exudatioque ibi sit, quò facta est effusio. In venarum quidem rarefactione adstrictio satis est: ipsæ nanque ceu situla noua imbecilla in rarefactionib<sup>9</sup> perfluunt. Diuisionibus verò, vt labia committantur, adstrictio quoque medetur: sed maioribus valentioribusque medicamentis vtendum. Verùm enim verò si sit erosionis modus, neque per adstringentia vlcera oræ cogantur, sed vulnus dehiscat, neque ex compressione in vnum redire valeat, sanguinem atque calorem congelare necesse est. nam istorum immobilitate concretioneque profluuium coercetur. Posca igitur rarefactis adstringendū satis est: neque enim sanguis effluens pur<sup>9</sup> est, sed ipsius sanies per ostiola parua dilabitur. atq; huiusmodi posca neq; adeo multa neq; frequenter egemus. nonnullis & exterius admota remedia abundè fuerunt. Quinetiā palmula-



rum, aut filiquarum esculentarum decoctum potui datum solū quosdam liberavit. esto autem acetum ex vini adstringentis genere, quod si non medicatione, tempore saltem acre adstringensque euaserit. Verum in vulnerum dilatationibus præter poscam medicamenta primum simplicia adhibeantur, ut plantaginis, aut sanguinalis herbæ, aut seridis succus, singulorum portio æqua cū posca: quod si adhuc plus effluat, hypocystidis, aut acaciæ fliccorum, cuiusque pondo drachmam in tres poscæ cyathos inspergito. optimè verò facit & vuae acerbæ succus. At si calamitas hæc semper in peius irritetur, gallam tritā, & rubi radicem arefactā, & lapidem ex mari, corallium quod vocant, aridum tufumque cōspergito. verūm rhei radix ad refrigerandū, siccandū, adstringendū, omniaque faciēda his efficacior est. sed hæc quoque cum posca sola præbetur. Sin auxilia maiora requiruntur, radices huius pondo tres obolos seridis atque plantaginis succis, qui triū aut quatuor cyathorum mensuram com-

T 2



pleant, iniicito. In erosionibus autem prorsus adstringentia adhibere tenta: quò dilabentem sanguinem cōcretum, compactumque reddas, & suscipientia membra constringas: vt procul à vulnere venæ concidant, & occludantur. quinetiam quæ bibuntur, tenacia sunt, concretionem efficere valétia. Succum igitur coriandri ex aceto propinato, item & leporis, aut inuli, aut hœdi coagulum. Sed multum ne concedito: nam istorum aliquod nonnunquam plus quàm conuenit datum, hominem iugulauit. coriandri quidem succi ne minus semicyatho cum tribus poscæ cyathis præbeatur: coaguli verò tres oboli, summum quatuor. Ad hæc huiusmodi fluoris sanguineis speciebus & terra Samia efficaciter subuenit, & erethrias, & aster quæ vocatur, valde candida, & rubrica Sinopica, & sigillum Lemnium. Istorum pondus minimum drachma, maximum drachmæ tres cum decocto aliquo præbeatur, vt palmularum, aut filiquarum edulium, aut rubi radicum. Sin arteria exasperatur, propterea quæ tussiunt: in



Cretica sapa id genus terræ inspergan-  
 tur. egregiè ad arteriam leniendam &  
 anylum facit: nam cum læuore & glu-  
 tinandi potestaté habet. Si profusio san-  
 guinis vrget, semel in die ante cibi as-  
 sumptionem dandum est: sin minus, &  
 secundo & tertio sub vesperam. Ex me-  
 dicamentis quoque siccis catapotia fie-  
 ri possunt ex melle ad consistētiam de-  
 cocto, qualis est galla trita. optimus est  
 etiam rhous, quo in obsonijs vtimur, vi-  
 nacea, acuti rumicis semen, per se singu-  
 la & simul omnia. Hæc vtique & sub lin-  
 gua ad perpetuam eliquationē haben-  
 da sunt. Gummi etiam cum planta por-  
 ri & spinæ lachrima profunt. Variorum  
 sanè medicamentorū infinita est expe-  
 rientia, varij etiam vsus: vt pastilli ex  
 AEgyptia spina, & pastilli ex electro, &  
 eius qui croceus appellatur, quorum ap-  
 paratus proprio loco expositus est. Por-  
 rò cū febris abest, omnia in medica-  
 mentis audēda sunt, & multa & multo-  
 ties exhibēdo. Si febre vexātur (plerūq;  
 autem corporum inflammationibus fe-  
 bres superueniūt) neque affatim eruptio



supprimēda est, neque in accessionibus  
medicamenta potui danda : quoniam  
multi celerius febre, quàm sanguinis  
effusione consumuntur. Alimenta varia  
sunt, speciēque medicamentis similia,  
quinetiam in cibis medicamenta repe-  
riuntur. neque enim in vno duntaxat  
cibo omnia alimenti bona inuenire fa-  
cile est. Atqui si non vnus cibus ad me-  
dicationem sufficit, non vno propterea  
vti ob satietatem facile est: sed per varia  
eundum: iam enim diuturna valetudo  
facta est. Itaque adstringentia sint ali-  
menta, & facultate refrigerantia, & ad  
tactum quoque frigida esse debēt. calor  
enim sanguinem prolicit. Alica lota,  
oryza in posca: sin acetum tussim ex-  
asperat, palmularum decoctum: panis  
assus, præaridus, contusus, atque in fari-  
næ speciem reductus & cribratus: atque  
ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat.  
item thymbra sale condita, & rhous ci-  
bis aspergatur. Quod si aliqua in re æ-  
grotanti morem gerere placeat, coriā-  
drum, si gratum sit, delectationis causa  
concedito: aut aliquod ex seminibus vri



nam mouentibus, facilémque spirationem reddentibus. lens vtique, si profluuium sanguinis vrgeat, cum plantaginis succo præbeatur: si non vrgeat, à succo abstineto: quippe qui nec concoctu facilis, neque gustatui iucundus est. istis verò minimè omnium egrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusionē mortem instare verearis, tunc iniucūda cōcoctu difficilia, quin etiam immania sint licet ea quæ salutē afferunt: propterea galla arida trita lēti sicce & frigida adspargatur: oua coquendo crassiora effecta cum mali punici corio, aut galla exhibeto. tale vtique necessariò in medicamine alimentum est. Potus omnino parcissimus esto: nā sicco victui humor inutilis est. Hęc nimirū adhibenda sunt, si adstringere ac refrigerare statueris: si verò sanguinem ac spiritum crassiorem efficere, lac, amyliū & alica profunt: modo cū amylo, modo cū alicalac misceto. horū téperatura, vt ne sit liquida sorbitio, ad concretionē perueniat. Cæterum si adhuc magis crassare adstringeréque cupias, alicam cum palmulis decoquito,



ad spissandum autem amyllum lácque optima fuerint, & far Tyrrhenũ cum lacte: crassum cùm sit, viscidum & glutinosum. Hædi verò coagulum in decocta liquida, causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, vt ad recentis cafei temperaturam deueniat: his crassius est milium, vt far, in lacte decoctũ. inspergatur autem galla & mali corium. Verum exiccantium, aut crassantiũ mediocritates coniectura assequi oportet: id genus nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellẽtia nonnullis & venas lacerauit. Si bene cedit curatio, sanguisque compescitur, in contraria paulatim adiiciendo fiat mutatio: atque (vt dici solet) ne quid nimis. huiusmodi enim vitia facilẽ reuerti solent, ac maligno ingenio prædita sunt. Iam verò hominem instaurare, carnẽque replere, & nouas cicatrices solidare necesse est gestationib<sup>9</sup>, mollibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis variis atque vsitatis. Hæc vtique facienda sunt, si à sanguinis exitu vulnus coaluit, & congruenter locus sana-



tus est: sin vlcus relinquitur, purulentumq; fit, altera deliberatione opus est: siquidem & iterum profusio sanguinis redit. verum de hoc affectu in sermone de Diuturnis morbis disputabimus.

DE CVRATIONE CARDIACORUM, aut syncopæ,  
cap. III.

**I**N syncopa medicum prouidentia sedulo nauare operam necesse est: futuram enim si prospexeris, & presentia tibi festinanter opem ferent, & ipsam ante quam inuadat, propulsabis: presentem verò non facile euadunt ægrotantes. Solutionem nanque naturæ syncopam esse diximus: instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur maxime quidem futuram arcere: sin minus, saltem nuper incipienti resistere debemus. præscienda verò ea sunt, quæ de acutis morbis differuimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens initium est: febrem ardentem signa pes-



fima consequuntur, ariditas, vigilia, caliditas viscerum, qualis ab igne provenit. extimæ partes frigent: manus pedesque extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo longa est. siquidem frigidi aeris, quoniam ignem expirant, auidi sunt. arteriæ motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaque sumpta coniectura, & ab aliis quotquot à me inter signa comprehensa sunt, ipsi ab initio syncopæ occurrendum est. Quapropter nisi hæc omnia impediant, habitus, ætas, annitempus, hominis timiditas, vena cædenda est. Quod si multa prohibeant, quæ numerum insignem, & magni faciendum constituent, utpote lingua aspera & sicca & nigra, (omnia enim interiora signa noscuntur) in omnibus facultas perpendenda est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem non defectu tantum, verum etiam strangulatu prosterinitur. At ubi præ multitudine syncopa fiat, & inflammatio aliqua insignis in præcordiis, aut iecinore appareat, nequaquam procrastinare expedit. Secunda



est igitur vena caua in cubito: per minutas sectiones, id est scarificationem, etiam sanguis detrahendus est, quò facultas haud ita insignem iacturam faciat. copiosum enim ac subitum naturam vitiat. quin etiam multo minus sanguinis, quàm in aliis occasionibus, hauriendum est: nam in syncopa si vel minimum erroris committitur, ad interitum ducit. Protinus igitur ad vires instaurandas alimentum dare conuenit. Natura enim priorum repulsa, & nouorum adiectione lætatur. Vtique si missionem sanguinis facultas non sustinet, inflammationesque infestant, cucurbitula tunc multo ante morbi iudicationem ei admouenda est. in iudicatoriis enim diebus syncopa incidere solet: in iisdem verò circuitibus & naturæ iudicant, & morbi interimunt. Si vini potandi necessitas homini incidit, diligenti consideratione opus est. neque enim vsque adeò tuta est in inflammationibus vini potio. siquidem vini potio inflammatione laborantibus dolores auget: inflammatione vacantibus,



naturæ incrementum affert, sed ant  
quàm semel, aut iterum cucurbitulan  
affixisti, & ad membra relaxanda, & a  
sanguinis facilem exitum utilis est: nō  
nullis & post cucurbitulæ secundam af  
fixionem benefecit. Hoc verò in casu &  
parsimonia vtendum est. nam & in cu  
cubitulæ usu nimix sanguinis effusio  
nis idem periculum adimus: euacua  
tionibus autem per clysterem duntaxat  
ad inueterata stercora eiicienda opus  
est: sed facultatis rationem habeto. Ca  
pitis irrigationes frigida, quotquot mi  
hi in sermone de Phrenitide relate sunt,  
paulum mediocritatem excedentes ad  
hibeantur. Aer mundus, ad inspiran  
dumque frigidior deligendus: vitus plā  
tarum, picturæ, aquarumque aspectu  
oblectandus: & hæc omnia iucunde sua  
uitérque intuenta. amicorum præsen  
tium locutiones sint ioculares atque ri  
diculæ. Summa sit in ægrotantis cor  
pore quies, in animo hilaritas. odora  
menta suauia, quæ capitis sensum non  
grauent, adhibenda. quinetiam grati o  
doris alimenta naribus offerantur, qua-



CVRAT. ACVT. LIB. II. 30<sup>r</sup>

is polenta est aqua aut aceto respersa,  
aut panis calidus recentissimè coctus.  
Nèpè vino haud copiosè os colluatur,  
neque prorsus denegetur. Potum fre-  
quentiorem, quàm aliis, & magis assid-  
uè his concedito. Esca per totum diem  
sit levis, concoctilis, plerunque triticea,  
necnon ægrotanti iucunda, licet paulo  
deterior: istis enim magis q̃ aliis grati-  
ficandum est: quandoquidem haud mi-  
nimè ad stomachi resolutionem id mor-  
bi genus aptum est. Inedia verò aut fa-  
mes nequaquã prodest. sati enim mor-  
bus ipse omnia consumere & exhaurire  
potest. Porro cùm iam circuitus ad iu-  
dicationē peruenit, humiditas verò iu-  
gulum frontēque irrorat, extrema al-  
gent, arteriarum pulsatus minimus est,  
frequentissimus veluti repens, ac tenore  
debilis, tum paulum quid alimenti tri-  
ticei sumendum, vinūque euidenter  
degustādū est. Sed caput irrigationibus  
præmunire oportet pariter & vesicam.  
Hęc verò auxilia in tractatu de Phreni-  
tide à nobis memorata sunt. Vinum uti-  
que non pleno ore, neque ad saturita-



tem vsque ingurgitandum est. Aliqui  
sanè importunè repleti, postea inappe-  
tentia, atque cibi potúsque accipiendi  
impotentia vita excessere: multis autem  
fatis largè vescantibus, natura iam re-  
soluta ad mortem euitandam alimen-  
torum copia nihil profuit: in ventriculū  
quidem cibis delabentibus, sed ad re-  
creandas vires à ventre non ascendēti-  
bus. Alii mēta sanè varia sint oportet, ple-  
runq; triticea, quò forberi potius, quàm  
mādi apta sint: si solida sunt, lubrica sal-  
tē efficiantur. Oua neque valde cōcreta,  
neque torrefacta sint, sed omnino soli-  
ditatis expertia. Panis buccellę vino ma-  
dentes & calefactæ duæ trēsue initio  
præbeantur. Post autem omnia frigida  
ministrentur, nisi forsan interius phleg-  
monæ delitescant. Vinum odoratum,  
haud ita multum adstringēs, quàm mi-  
nime crassum deligatur, ex Gręcis Chiū  
aut Lesbium, & quotquot alia insulana  
tenuis sunt téperaturæ: ex Italicis autē  
Surrentinum, aut Fúdanum, aut Faler-  
num, aut Signinum, nisi vehemēter ad-  
stringat. atque ex his omnibus illud vi-



tandum est, quod peruetustum, aut valde nouum sit. Nempè detur primo calidum non minus cyathis quatuor ante iudicationem, neque plus cotyla, siue hemina, quanuis bibax homo sit. deinceps cibo exhibito, si inflammatio permiserit, iterum frigidum vinum, quod siti medeatur, propinandum. At si necessitas vrgeat, vino non solo, sed cum cibo vtendum est. verum ne mētem vinum lædat, cibus ante sumendus est, & post hæc abstinendum. Si post aliquod temporis interuallum dormire velit, quies concedenda est. Verūm si multus sudor emanet, arteriæ iam micare desinant, vox acutior reddatur, & pectus calore destituatur, vini quantum potare possit, concedendum. in solo enim vino refrigeratis spes vitæ posita est. Vinum itaque sit vsitatum, & modò id ægrotus tantum bibat, modò cibum cum vino assumat: id autem per interualla fiat ad tollendam lassitudinem, quæ tum ex morbo, tum ex cibo prouenit. nam qui exiguas vires habent, & post assumptum cibum valde laborant. Igitur &



ipsum decet forti esse bonoque animo,  
& medicum suavi oratione eum ad bonam spem cohortari, varioque alimento & vino opitulari: necnon & alia efficaci medela vti opus est, & ad sudores coercendos, & ad vires instaurandas, ut penè extinctæ reuiuiscant. Quapropter pectoris sinistrae māmæ palmulæ in vino maceratae cum aloe & mastiche superduntur: ceratum verò cum nardo factū ista excipiat. quòd si istud durū siccūmq; fiat, aliud epithema imponendū: mala cotonea extracto s. mine, & quicquid durum est, contusa polentę odoratae admisceto: postmodum absinthij & myrti comam, acaciam quoque & mannam cribratas permisceto: simulque omnia subacta cēnāthino cerato excipito. Si per hæc sudor non supprimatur, vuæ acerbæ succus miscellæ addēdus est. succus igitur iste quē Græci omphacion vocāt, cum maximè acerbus est, & acacia, & gummi, & rhous esculētus, & alumē, & palmulæ, & rosarum succus benè olens, simul omnia cū nardo & labruscæ pinguiori parte pectori superponantur.

huiusmodi



huiusmodi nanque epithema iuxta re-  
 frigerat & adstringit. Decumbat verò  
 æger in aere frigido, aut & ad vrsam, do-  
 mus vergat. at si & frigida boreæ aura  
 afflabit, malè spirantem animum exci-  
 tabit. Moretur autem & prope virentia  
 prata, fontèsque, & obstrepentes riuos:  
 nam & ab his emanans bonus halitus, &  
 mentis delectatio, animam fouet, & na-  
 turam suscitatur, vitæque restituit: quin  
 etiam cibi potionisque desiderium la-  
 cessit. Cæterum si quis ob inopiam hæc  
 assequi nequeat, imitari oportet & au-  
 ram frigidam ramorum benè olentium  
 voluptariis flabellis, & tempus vernum  
 foliis ac floribus præsentibus humū ster-  
 nentes. Operimentum quoque leue sit &  
 obsoletum, vt aerem quidem accipiat.  
 calorem autem pectoris exhalare per-  
 mittat. optimum verò est vetus linteū.  
 Ceruices quidem & iugula & pectus po-  
 lenta conspergito, vt odoris suauitate  
 nutriat, siccitate coerceat. item & polli-  
 ne quidem corporis raras partes conte-  
 gito: necnō & faciem terra Samia lineo  
 sacculo cribrata, & raro linteolo inclu-



sa respergito, vt minutissimus puluis in frontem & malas excutiat. calx præterea extincta, & gypsum exustum per lineum paruum sacculum, quem Græci criseram vocant, transmissa sudore mudentibus iniiciantur. Compressit sudores nonnunquam & spongia ex frigida faciei admota: dilabentes enim humores coguntur, & cutis raritas conspissatur. Prodest etiam sedem inungere, vt frigidus flatus, & ab alimento exortus effundatur. Item reuocandus excitandusq; est extremorum calor illitu gleucini olei, aut Sicyonij, quod ex agresti cucumere efficitur, cum pipere, castorio, nitro, & cachry: modicum ceræ in eis eliquando, vt inunctio membrum inharescat. Illitio quoque ex adarce (limnestida vocant) euphorbio, & lauri bacca calorem exuscitat: pariter, & bulbi crudi, illi inquā qui exigui & rubri sunt, cū pipere & aceti facie læuigata valētissimum pedib<sup>9</sup> cataplasma imponitur: sed intrahoræ spatium illud frequentissimè auferendum est. instat enim periculum vlcis & vesicarū. Porro ab his spes af-



fulget ita ægrotantem perniciem euasurum. Quod si omnia secundum rationem medicus præstet, recteq; omnia cedant, cum syncopa si inflammationes quoque adsint, discutiuntur: sudor nusquam effluit: calor in quamlibet corporis partem ad extremos usque pedes, & summas nares diffusus reuiuiscit: facies vegeto colore decoratur: pulsatio in magnitudinem efferuntur, nihil tremuli, sed vehementes: vox autem consueta reuertitur, & canora est: ipseque prorsus viuus efficitur. lassitudinem quidem haud exigua percipit, verum dormire etiam conspicitur. atqui si ipsum somnus occupauerit, cibaria planè cōcoctauerūt, sensus mali oblitterabitur, naturæque vis egerminabit, & reuiescet: cumque à somno expergiscitur, bene spirat, levis est, expeditus & robustus: reuocat autem in memoriam morbum ceu quoddam somnium. At nonnulli sunt quibus febres obscuræ, tanquā morbi reliquæ, remanent: nonnunquam & inflammationes modicæ, & lingua arida, & sudoris priuatio: præterea rigent, torpent,



dissoluuntur . hi sanè in tabè prolabuntur . Tunc verò tempus terendum nō est quiete & victu tenui , sed ad motiones æger traducendus per gestationes , frictions , & lauacra , quò vitæ residuum à morte vindicetur , augeatur , ac recreetur . Propinandum verò est etiam lac , maximè mulieris quæ proximè peperit , puerumque nutrit . hi nanque alimento vt nuper in lucem editi pueri , egēt . si lactis humani copia non datur , alinæ quæ non pridem peperit , lac accipito : tenue est enim ac fluxile huiusmodi lac . Post hæc ad resumptionem & ad consueta æger ducendus est .

CVRATIO CHOLERAE,  
cap. I I I I .

**I**N cholera eorum quæ eiciuntur , suppressio mala est : cruda enim sunt quare nos oportet ea facilè spontèque exeuntia libenter permittere : si non exeant , incitare aquam tepidam sorbitioni dantes , assiduè quidem , sed paucam , ne tentiones inanes in stomacho fiant conuul-



fioni fimiles : ſi torquentur inteſtina , & pedes frigefcunt , irriganda eſt aluus calido vngvine , in quo ruta , cuminumque incocta ſint : vt flatus digerentur diſſipenturque . lana quoque imponenda eſt , & pedes inungendo molliter fricare oportet , contrectando magis quam premendo . ſed genibus tenus hæc fiant : vt caliditas quæ abierat , reuocetur . Hæc verò tantisper facienda ſunt , donec ſtercora per inferiora deiiciantur , & ſuperius bilioſa efferantur . Sin autem omnia antiqua ſtercora deiecta fuerint , & bilioſi humores tranſierint , bilioſuſque vomitus & diſtentione adſit , ſaſtidium , anxietas , viriū labefactatio , tunc frigida aquæ cyathi duo , aut tres propinandi ſunt ad ventris adſtrictionem : vt retrogradus humorum curſus cohibeatur : vtque ſtomachus ardens refrigeretur : aſſiduè verò bid , cum potam aquam vomuerit , facito . facile quidem frigida in ventre incaleſcit : verum eam ſtomachus euomit , à calida pariter ac frigida dolore affectus , ſemper autem frigidum potum expetit . Porro ſi arteriarum motus ad paruita-



tem lapsi fuerint, necnon assidue & frequenter micent arteriæ, sudor circa frons & iugula, & qualibet corporis parte stillatim effluat, alui profluvium non sistatur, & ventriculus adhuc euomat cum distentione & animi deliquio, parum vini odorati & adstringentis aquæ frigida infundendum est: ut præ odore sensus excitetur: ob eiusque potentiam roboretur, & corpus ob nutritionem recreetur. vinum enim celeriter sursum petit, ut retrogradum humorum fluxum coerceat. tenue verò est, ut facile diffusum naturæ ad sanitatem recuperandam opem ferat: validum quoque, ut vires dilabentes fulciat, atque sustineat. Inspargenda est etiam nonnunquam recens & bene olens polëta. Verum enim uerò si omnia urgeant, sudor & tentio non stomachi modo, sed etiam nervorum, singultus inanis, & pedes contendantur, & alius multa excernat, & homo caliget, & pulsatus arteriarum ad immobilitatem vergant, tunc huiusmodi ægroti statum prævertere opus est. Quod si iam adsit, frigida ac vini multum præ-



bendum est, & nequaquam meracius, ne fiat ebrius, ac ne lædantur nerui, sed cū cibo, & panis buccellis madefactis. Præbere quoque aliam escam conuenit, qualis à me in capite de Syncopa tradita est, item fructus mollioris corticis, oporam Græci vocant, adstringentes, forba, mespila, mala cydonia, vuam. Cæterum si omnia euomit, & stomachus nihil retinet, ad calidas potiones & cibaria recurrendum: nonnullis enim hæc mutatio vomitionem compescit: calida verò calidissima sunt. Sin horum auxiliorū nullum proficit, cucurbitula in interscapulo affigenda est, atque infra umbilicum. verū assiduè cucurbitulæ mutandæ sunt: nam si diutius permaneant, dolorem ciunt, periculumque est, ne vesiculas excitent. Profuit interdum & auræ motus suauis, vt & spiritus reuiuifcat, & cibus in vetriculo remoretur: vtque melius ægrotus spiret, meliusque arteriæ micent. At si hæc in peius labantur, vetriculi pectoriq; talia imponenda sunt, qualia & ad syncopā supra memorauimus: palmulæ vino madefactæ, acacia, hypocystis,



hæc roseo cerato excepta, linteoloque  
illita ventri imposito: pectori autē ma-  
stichen, aloem, absinthij comam tritam  
cū cerato nardino superdato: aut cēnā-  
them toti pectori inspergito. Pedes ve-  
rò & musculos, si cōuellātur, Sicyonio,  
gleucino, aut veteri oleo cum exigua  
cera perungito, castoreo quique re-  
spergito. Porro si frigidi etiā pedes sint,  
vnguine ex adarce & euphorbio inun-  
gito, & lanis obuoluito, & manuum pal-  
patione foueto. quin etiam dorsi spinā,  
tendones, & musculos, necnon & maxil-  
las iisdem inungere expedit. Quod si  
post hæc sudor & venter suppressi fue-  
rint, & stomachus cibos admittat, neque  
euomat, pulsus magni & validi sint, & cō-  
uulsio desinat, sed calor ubiq; increseat  
& extrema infestet, somnus verò omnia  
concoquat, secundo die aut tertio soluē-  
dus est æger, & ad consueta mittendus.  
At contra si omnia vomitu reiiciat, su-  
dor perennis effluat, frigeat laborās, & li-  
uidus fiat, pulsus etiā propè extincti sint,  
& vires cadāt, cū ita inquā se habuerint,  
inde honestā fugā capescere bonum est.



CVRATIO VOLVULI,  
cap. V.

**I**N voluulo dolor est perimens ob intestinorum phlegmonem, distentio adest, & inflatio, celerrima ac fidissima perniciēs impendet. nonnulli enim desperata salute ægrotantes mortem evidentem tantummodo formidant: aliqui verò in voluulo ob cruciatus acerbitatem mortem expetunt. quocirca neque remedium vllum morbo inferius, neque debilius medico adhiberi opus est. Verum si morbi causam inflammationem esse inuenerit, venam in cubito magna sectione aperiat, quò multus subito sanguis inflammationis alimentum, vel usque ad animæ deliquium effundatur. Etenim hoc vel sedandi doloris, vel stuporis ac sensus priuationis initium est. In voluulo autem recreatio est ac respiratio, vel ad breue tēpus (licet præ ignorantia) tormēti dilatio. quandoquidem hominibus ita viuentibus mori beatum est: medico autem cuiquam mortem inferre nefas ducitur. Sed fas est interdum,



cùm præsentia mala euadi nō posse manifestè prouideat, grauitate capitis torpida ægrotum sopire. Sin absque inflammatione ob corruptionem, aut ingens frigus voluulus prouenerit, venæ sectio dimittenda est: reliqua autem omnia facienda. Consulendum est igitur, vt à potu aquæ tepidæ frequenter euomat, oleū bibat, deinde rursum euomat, flatus inferius irritamentis educendi. irritatoria quidem sunt cyclamini succus, & nitrū, aut sal: flatus autem euocant cuminum, & ruta. igitur his omnibus cum resina terebinthi sedem oblinere oportet, & spongiis fouere: aut hæc per clysteres infundere cum oleo, melle, & hyssopo, & cucurbitulæ syluestris carnis decoctio. Quodd si sterqus excretum sit, iterū oleum calidum cum ruta iniiciendum: id enim si intus moretur, fomentum intestinis propitium est. præterea dolentes locos oleo, in quo ruta & anethum abundè incocta sint, perfundere conducit. Adhibeantur & fots ex lentibus figulorum aut fabrorum ferrariorum, aut ex milio & sale vstulatis. Cataplas-



mata verò præter vulgata funto, lolij farina & cuminum, & hyssopi aut origani coma. Cucurbitulæ quoque leues quidem, sed frequentes, alia iuxta alias abdomini & ilibus ad inguina vsque admoveantur: quin & à tergo coxendicibus ad renes vsque & dorsum: vbique enim quisque omnia dolorem leuantia faciens iuuat. Præbibat autem cumini, aut rutæ decoctum, & Sinonis, aut vnâ cum his aliquod ex anodynis appellatis medicamentis: infinita autem alia ab aliis probata experimento inuēta sunt. Bonum verò est & ex viperis medicamentum plus consueta portione potui datum. Cæterum si neque dolor remittitur, neque flatus, neque sterc<sup>o</sup> deiecitur, purgatorium pharmacum, quod hieram vocant, necessario dandum est: aut enim simul cum pituita & bile pharmacum vomitu expellitur: aut descēdit, flatum, dura stercora, pituitam, bilem ipsius malifomenta secum educens. Alimenta exhibeantur aluum ducendi vim habentia, iuscula gallinarum, ostreorum insigni pulchritudine præditorum,



ordei cremor cum multo oleo decoct<sup>9</sup>,  
 quod à principio ante decoctionem in-  
 fusum sit: habeat verò cuminum, nitrū,  
 porrum cum coma. Aut medela adhi-  
 beatur cum aliquo iure ventrem subdu-  
 cente, cochleæ valde elixæ, & ipsarū suc-  
 cus. Itellinæ aqua potui detur, si febrici-  
 tet, cū assaro, aut nardo, aut cachry ex-  
 cocta: nam hæc flatus eliciunt, vrinam  
 cient, & spirandi potestatem facilem red-  
 dunt. At si dolor absit, & vinum bene fa-  
 cit, vt intestina calefiant, vtq; vires labā-  
 tes confirmentur. prodest etiam fœnicu-  
 li radice decoctum, si bibatur, & adian-  
 tum, & cinamomum. sin ad abscessum  
 inflammatio conuertatur, huic opē fer-  
 re satius fuerit medicamentis abscessui  
 conuenientibus vtentem: ea verò in li-  
 bris de Lōgis morbis descripta sunt, vbi  
 colici affectus sanatio traditur.

### CVRATIO ACVTORVM

iecoris vitiorum, cap. VI.

**I**N iecore sanguinis creatio est, & in to-  
 tum sanguinis à iecore emanatio: ac



omnino iecur est veluti sanguis gelat<sup>o</sup>.  
ideo phlegmonæ hoc loco acutissimæ  
sunt. hac enim in parte alimentum resi-  
det. Sin vsquam alibi phlegmone consti-  
terit, non vsque adeo acuta est: aduen-  
t est enim sanguinis accursus. in iecur au-  
tem non opus est aliunde effluere. nam  
si obstructio aliqua exitus occludat, ie-  
cur effusione priuat<sup>u</sup> repletur abun-  
datq; sanguine: alimenti verò ad iecur  
transitus adhuc patet. aliud est enim iter  
alimenti à ventriculo & intestinis in o-  
mne corpus. Quocircà euacuare facile  
oportet venam cubiti secando, multum  
quidem sanguinis, sed non semel totum  
detrahendo. Inedia primum iube<sup>da</sup> est,  
postea cibi paucitas, vt & medicamentis  
ingredientibus iecur inane pateat. Insa-  
per medicamētis exterius appositis, quæ  
in iecore aceruata sunt, discutere opor-  
tet. igitur illinatur aloë, aut nitro, lanæ  
cæsypos sordentes admoueantur. Refri-  
geratione quoque opus est. iecur enim  
sanguine accenditur: nam sanguis cali-  
dus est. Huiusmodi ergo cataplasmata  
sunto, accipiatur farina loliacea, aut



irionis, aut ordeï, & feminis lini: ex humoribus autem vinum acidum, cydoniorum succus, capreolorum vitis, labruscæ maturæ, aut oleum cum ea. Item cum spongiis fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentisçi, pulegij, iridis: per ista mitigato morbo cucurbitula maior applicetur, vt ex omni parte hypochondrio circundetur: atque altius concidenda cutis, vt multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirundines quàm scarificationes magis placet. nam eius bestiolæ morsus altius penetrat: verùm erosiones quoque maiores facit: vnde & sanguinis effluuium ægrè supprimitur: cūq; sanguinis potu saturata hirudo ceciderit, cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quod si satis euacuatū sit, vulnera medicamentis sanguinē coercentibus morfuq; carentibus obtegēda sunt, vt araneorum telis, manna aloëque inspergēda: panis cum ruta aut fertula aut althææ radicibus elixus superdandus. tertio verò die ceratum cum myrobalano aut absinthij coma & iride conue-



nit. Quin etiam & malagmata vocata  
medicamenta talia esse debent, vt ex-  
tenuare, aut rarefacere, aut vrinam cie-  
re valeant. optimum sanè est medica-  
mentum ex feminibus cōstans: quorum  
omnibus medicis experientia perspecta  
est. bonum est & illud in quo aut sam-  
pucus, aut fertula ponitur. Cibi tenues  
sunto, labiles, lotium mouentes, pene-  
trabiles: alica cum mulsā, & forbitio  
ex ea cum sale & anetho. Ordei verò  
cremor & detergēdi facultatem habet:  
at si & dauci feminum nomihil adda-  
tur, ad vrinam lacellendam præstan-  
tior est: subducit enim per alueolos, qui  
à iecore in renes pertinent. opportunus  
verò est à iecore effluentibus illuc tran-  
situs & vasorum laxitate, & itineris re-  
ctitudine. Iccirco & cucurbitulis ea nos  
trahere oportet eo loco, vbi renes sunt,  
secundum os coxendicis applicantes.  
Cæterum & hi vngvine cum ruta, aut  
odorato iunco, aut calamo aromati-  
co irrigandi sunt. per hæc vtique  
ægotum posse mortem effugere spe-  
randum est. Sin ad suppurationem,



conuertatur, pus mouentibus medicamentis vtitor, quotquot à me in fermone de Colicis, literis prodetur. Cum pus autem iam genitum fuerit, quo modo incidendum, quo modoque medendum sit, alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt, si quando & inflammationis acutæ calamitas eum inuaserit.

CVRATIO ACVTI MOR-  
bi dorsalis venæ & arteriæ,  
cap. VII.

**V**ENÆ concavæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem maiores nostri appellauerunt. nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur, ignis acutus & acer, fastidium, fitis, anxietas, pulsus palpitans in præcordiis, & in auersa parte quam Græci metaphrenon vocant, & quotcunque à me in volumine de Signis relata sunt. Nempe & in syncopam tendit ignis, quemadmodum & in ardoribus: siquidem venæ radicatio



CVRA T. ACVT. LIB. II. 321

dicatio( vt ita dicam) iecur est: arteriæ  
verò principium cor. haud ab re igitur  
existimes eorum viscerū supremas par-  
tes maximè ad vitam facientes ægrotare.  
Etenim cor arteriæ calorem imper-  
tit, venæ autem sanguinem iecur infun-  
dit. Amborum verò magnorum visce-  
rum magna sunt germina, ipse videlicet  
phlegmonæ. Venas itaq; in cubito pro-  
tinus cædito, multumque sanguinis, sed  
non semel totum mittito. imò & bis, &  
ter, & alio die, quò interim vires instau-  
rentur, repetito. Deinceps cataplasma-  
tis vtitor, & cucurbitulam præcordiis,  
vbi est arteriæ transitio, necnon & inter  
scapulas (nā ibi quoq; pulsationes sunt)  
affigito, liberiusque scarificato, & mul-  
tum sanguinis detrahito: haud enim ita  
facilè ex horum vasorum inanitione in  
animæ defectum homines cadunt. Ve-  
rùm & alius præter consuetudinem val-  
de suppressa ad lubricitatem per clyste-  
rum molliores infusiones est reuocan-  
da, acribus autem minimè vtitor: nam  
hi facilè in febrim incidunt à muria &  
nitri liquatione. ideo lini seminis & fœ-

X



ni Græci succus esto, & radicū maluæ decoctum ad prouocandum, & ad moriendum satis est. Extremas partes, pedes videlicet & manus gleucino oleo, aut Sicyonio, aut ex adarce vnguine excalfacito. nam partes istæ in ipsis valde frigescent. Præterea ante cibos potui dato quæ lotium euocant, meon, asfarum, absinthium. nitrum quoque inspergito. sed omnium valentissima est cucurbita, & cinnamomum, si quis eius copiam habeat. Lac istis & alimenti, & medicinæ vim præbet: etenim refrigeratione indigent, cum in eorum visceribus veluti quidam ignis exæstuet, & dulci alimento, necnon & multo in parua mole: has nimirum virtutes alimenti lac obtinet: esto autē mulieris quæ proximè peperit, & duobus lactis cyathis vnus aquæ admisceatur. lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur. Cibaria concoctu facilia præbeantur, plerique succi, fœniculi radix, & apij semē indatur & mel: aqua verò quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam sudores elicere, & vbiq; distillationes hu-



CVRAT. ACVT. LIB. II. 323

midas & fluxas facere. Caput sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori & sinistrae mammae, quale in syn-  
copa, superdetur. Cubile rectus decubi-  
tus: vt omnia his similia sint, quae in ar-  
dentibus febribus fiunt. Exercitatio mo-  
dica ad sudores euocandos, necnon &  
balneum, si iste interius exardescit. neq;  
enim iudicationibus huiusmodi vitia  
soluuntur, etsi ardoris species sunt.

CVRATIO ACVTI MOR-  
bi in renibus, cap. VIII.

**P**eracuta sanè in renibus inflammatio  
exoritur. simul enim inflammantur à  
iecore in renes discurrentes venae: cum  
illis autè & iecur: cū haud ita praelongae  
sint, sed valde late adeo, vt renes proximi  
iecori suspensi esse videantur. Verum &  
vrinae retentio inflamationi superuenit,  
vehementiā inflamationis adaugens: nā  
renum caua lotij nō exeuntis alluione  
replentur. Porro idem & in calculis eue-  
nit, si in renibus calculus vrinae cana-  
lium laxitate maior oriatur, qui non

X 2



egrediens inhærescit, atque sic & ipse  
vrinam intercludit. Ceterum de calculorum  
creatione in libro de Lōgis mor-  
bis sermonem habebimus: quomodo aut  
ne coalescant, aut iam concreti exteran-  
tur comminuanturque. De calore au-  
tem atque obstructione, quacunque ce-  
lenter enecāt, in præsentia differemus.  
Si calculi iam conflati sunt, adestque in-  
flammatiō, venam cubiti, nisi ætas præ-  
pediat, secato: benè fluidus autem mul-  
tusque sanguis exeat: neque enim phleg-  
monæ tantum euacuatione mitigantur,  
sed etiam calculorum intrusiones vaso-  
rum inanitione laxantur: quin etiam  
per mictum calculi elabuntur. Postmo-  
dum irrigationibus gleucini aut cypri-  
ni olei, & fomentis & cataplasmatibus par-  
ticulæ remittuntur. Artemisia verò her-  
ba, & iuncus, & odoratus calamus in ca-  
taplasmatibus esto. Deinde cucurbitulam  
renibus in regione coxendicis adhibe-  
to: maxime nanque ab ea parte euacua-  
tio profuit. Alius præterea ducatur per  
clysteres cum lubricis, & viscidis potius,  
quàm acris, ex maluæ, aut fœnigræci



cremoribus. nonnunquam verò medica-  
 menta ante cibos vrinam citantia den-  
 tur, qualia in vitiis iecoris narrata sunt:  
 pariter & cibaria similia, concoctu faci-  
 lia. cruditas enim istis noxam affert.  
 Optimum sanè lac est, maximè quidem  
 asinæ, secundo equinum: ouillum autem  
 & caprinum confert, quatenus lac est. Si  
 pauperes ægroti sint, eos lauare satius  
 est: sin minus, in decocto herbarum desi-  
 dant vmbilico tenus folio repleto. Ve-  
 rùm si ad pus vergat, quibus cataplasma-  
 tis ac medicamentis vtendū sit, multis  
 in locis superius traditum est. At si cal-  
 culus institerit, fomentis vtique, & cata-  
 plasmatis iisdem vti oportet. calculi ve-  
 rò medicamentis potabilibus conteren-  
 di sunt, simplicibus quidem sio, & prio-  
 nite (asplenum puto) herbis cum oleo  
 aut aceto esculēto decoctis: earum quo-  
 que succo potui dato: compositis autem  
 ea antidoto, quæ Bistimus appellatur, &  
 ea quæ ex viperis constat, & bestia, quæ  
 coscinos, id est cribrum, dicitur, & quot-  
 cunque experientia optima esse com-  
 probauit. Gestationes istis, & corporis



concussiones ad monendum propellen-  
dumque calculum bene faciunt : nam  
calculorum in vesicam transitus ingen-  
tes dolores concitat. quòd si inde exci-  
derint, dolor tollitur, vt neque per som-  
nium dolorẽ sentire sibi videri soleant.  
quin etiam tanquam ex ineuitabilibus  
malis animus perterritus soluitur.

### CVRATIO ACVTORVM

vesicæ affectuum, cap. IX.

**E**T vesicæ acuta vitia renalibus simi-  
lia proueniunt, phlegmone, & vlcera,  
& lapides, & grumorum obstructio-  
nes, à quibus vrinæ suppressio, & stillici-  
dium exoritur. sed in hoc membro acu-  
tior dolor est, interitusq; celerrimus: ve-  
fica enim neruus latus est. At renes velu-  
ti concrementum sanguinis iecoris spe-  
ciem habent: in quibus & grauissimi, &  
maxime miserabiles morbi incidūt: vn-  
de mars cum maximis cruciatibus mi-  
seris mortalibus ingruit. Protinus igitur  
ventris ea pars laxa, quam ceneona  
Græci vocant, secanda est, multoq; oleo



CVRAT. ACVT. LIB. II. 327

cum ruta & anetho vesica est irriganda.  
 Si concretus sanguis doloris, impeditur  
 q; vrine auctor sit, oxymel bibere debet,  
 aut calcis parū cū mulsa, quod grummi  
 dissoluantur: deinde quæ vrinā mouēt,  
 & herbæ, & semina exhibēda. Sin ex san-  
 guinis effusione periculū instet, absque  
 vlla cunctatione ei magis quàm cæteris  
 subueniendum: neq; enim id leue discri-  
 men est. Nempè medicamina sanguinē  
 coercentia opem ferunt: opem fert au-  
 tem vesicæ refrigeratio, ex rosaceo & vi-  
 no irrigatio, & cum lanis succidis obuo-  
 lutio. Epithema bonum est, palmulæ ex  
 vino cum malo punico, aut succo rhois,  
 Verū si auersatur epithemata grauiā,  
 & vehementes refrigerationes, (cauēdū  
 est enim vesica natura frigida tenuisq;  
 ne ita multum refrigeretur) eam gleu-  
 cino illinito, aut acacia, aut hypocysti-  
 de ex vino. A spongiis verò, nisi valde  
 vrgeat sanguinis eruptio, abstineto. E-  
 scæ triticeæ, coctū faciles, bonum suc-  
 cum gignentēs, lotiūque educentes  
 præbeantur, quales à me in capite de  
 Renibus comprehensæ sunt. Lac, vinum



dulce, Theræū, aut Scybellite. Medicamenta potabilia sunt, vrinaria, bene olentia, fluxilia, & id genus alia. Vtilissimum utique vesicæ remedium cicadæ sunt tempore suo tostæ pro cibo exhibitæ. extra tempus autem aridæ tritæ cum aqua: sed radicis nardi parum cum cicadis elixetur. in iisdem quoque loco balnei ad vesicæ laxamentum æger desidet. Quod si lapillorum interpositio mictū impediat, oriculario specillo lapis amouendus est, urinæque educenda, nisi adsit phlegmone. in phlegmonis nanque neque meatus instrumentum admittit: præterea oriculario specillo vulnerantur. At si expediri medicatio nequit, homoque doloribus consumitur, locum eū qui sub glande est, cervicemque vesicæ incidito, ut lapis excidat, atque urina effundatur, ac deinde potissimum medendū est ad cicatricem vulnus ducendo: sin minus, puris effluuium, quod rhœas Græce dicitur, factum esse pro futura hominis vita satius est, quàm ut tormentis miserimè cruciatus intereat.



**V**ulua in mulieribus membranis ex-  
tensis hinc atque inde secundum ilia  
continetur, ac perinde atque animal vi-  
tia in olfactu patitur. nam ad benè olé-  
tia delectationis causa se recipit, foedè  
olentia contristantiâque præ molestia  
refugit. Igitur si aliquid superius triste  
offeratur, vulua ad naturalia descendit:  
si extra, ostio naturalium apponatur, re-  
tro sursumque recedit. nonnunquam ve-  
rò in hoc aut illud latus ad lienem, aut  
iecur mouetur. ad recessum eius autem  
contractionemque membranulæ, vt in  
nauibz vela, cedunt atque consentiunt.  
Hæc verò illi & propter inflammationē  
eueniunt. Nam si eius ceruix afficitur,  
atque intumescit, fit prominentior. Si  
in fundo exoritur inflammatio, sursum  
repat. Sin ad pedes foras vergat, turpis &  
immunda res est, dolores afferens & cō-  
tristans, præterea difficulter ambulare  
potest, & in latus & supina decumbere,  
nisi pedes mulieris phlegmone laborēt.



At si ad superiora vulua recurrerit, quā  
 ocysime hominem strangulat, vrget au  
 tem spiritum comprimens: neque enim  
 prius conqueri & clamare, & opem ab  
 adstantibus petere valet, quòd nonnul  
 li, hisque pluribus respiratio, nonnullis  
 autem vox celerius intercipitur. par est  
 itaq; eos qui his miseriis interfunt, prius  
 quàm mulier intereat, medicum accer  
 fere. Verùm si forte aliquando occurre  
 ris, cognita phlegmone venam scindi  
 to, præcipue quidem eam quæ in mal  
 leolo: quæ si non bene fluida sit, eā quæ  
 in cubito est, petito. Sed à vena malleo  
 li sanguinis missionem repetito. Alia  
 verò omnia administrato, quæcunque  
 strangulatui & citra inflammationem  
 subueniunt: qualia sunt manuum ac pe  
 dum vincula ad torporem vsq; adstrin  
 gentia: fœdè olentium olfactus, vt li  
 quide picis, capillorum, lanæ que exusto  
 rum. flammæ in lucerna extinctæ nido  
 ris, castorei, quod præter fœditatem odo  
 ris neruos etiam refrigeratos calefacit.  
 lotium præterea vetus vel demortui fe  
 rè corporis sensum magnoperè suscitât,



CVRAT. ACVT. LIB. II. 331

& vterum ad inferiores partes abigit. Porro medicamenta odorata naturalibus sunt imponenda: vnguentum verò leue fit & minimè tactum vellicans, nardus, aut bacchar Aegyptium, aut vnguentum ex malabathri Indicę arboris folijs compositum, aut cum aliquo odorato vnguine tusum cinnamomum: atq; his muliebres locos oblinito. Quòd si ex his fusile medicamen confletur, illud in vuluam infundito. anum quoque flatuum eductoriis inungito. per clysteres quoque non acres, sed molles, viscidos lubricosque humores indito, vt sterora solum eiiciant, sedesque vtero ampla vacuęque remaneat. id succus althææ, fœnigræcię præstabit: sertulam verò, aut sampfucum cum oleo decoquito. Cæterum si maiore vi, aut depulsiōe vulua egeat, tunc validæ mulieris aut viri benè tenacis manibus hypochondrium comprimatur, aut fasciis adstringentibus succingatur: quò in angustum locus redigatur, neque iterum sursum versus vulua procurrat. Item naribus apprehensis sternutamenta citen-



tur. quibusdam enim sternutamento & contétione vulua in propriam sedé redire potest. in nares autem puluis inspiretur ex radice lanariæ, aut piperis, aut castoris. Item leues cucurbitulæ in fœminibus, ilibus, coxis, inguinibus attrahendæ vuluæ causa defigantur. amplius & dorso inter scapulas strangulatui subueniens admoueto. Sin à phlegmone strangulatus proueniat, vena ad pubem veniens scindenda est, multumque sanguinis fundendum. Item faciei frictiones, capillorum euulsiones, vt mulier ad se redeat, simul benè facient. At si vel parum tolerare poterit, in decocto aromatum desidat, odoratisque suffumigetur. Ante cibos castorei paulum bibat, & hieræ paulum cum castoreo. Quòd si ferre valet, lauetur, & in tempore ad antiquos vsus reuertatur: detq; operam mulier, vt quàm facillimè menses elabantur.

## CVRATIO SATYRIASIS,

cap. XI.

**N**eruorum in virilibus inflammatio penis tentiginem facit cum appetitu



contristationeque in actu venereo. sunt  
autem distentiones neruorum conuul-  
sioni persimiles, nunquam mitigabiles.  
Quin & ipso concubitu sedari non po-  
test ista calamitas. Mentis quoque alie-  
natio sequitur. nam primum quidem im-  
pudentes euadunt, dum c. sum suum li-  
cētiose narrant: audaces enim eos coeū-  
di insatietas efficit. Postea verò cū af-  
fectus iste desierit, tunc ad se redeunt, &  
mente optimē constant. Igitur omnium  
horum causa venam in cubito & in talo  
aperias, & multum cruoris, ac sepe de-  
trahas. neque enim id temporis intem-  
pestium fuerit & ad mentis stupefa-  
ctionem, & ad inflammationis remis-  
sionem, & ad caloris virilium mitiga-  
tionem faciendam, animæ deliquium  
afferre. quippe sanguis multus calorem  
& audaciam valde accendit, inflamma-  
tionem alit, mentis perturbationem cō-  
fusionemque veluti esca ignem pro-  
creat. Omne corpus etiam medicamen-  
to, quod hieram, id est sacram vocant,  
purgato: neque enim purgatione solum  
egent, sed etiam leni medicatione: vtrū-



que autem præstare hiera potest. Infu-  
per genitalia, & lumbos, & locos inter  
fœmina & inguina (plechada Græci vo-  
cant) & locum inter anum & scrotum  
(perinaeos Græce dicitur) & testiculos  
lanis ab oue detonsis adhuc sordentibus  
obuoluito. sed lanas rosaceo ac vino  
perfundito: partesque istas multa irriga-  
tione madefacito, ne ab lanis caliditas  
oriatur: imò natiuus calor à frigida hu-  
morum potestate obtundatur. Eiusmo-  
di quoque cataplasmata superdanda, pa-  
nis cum plantaginis herbæ succo, & so-  
lano, & feride. & papaueris foliis idque  
genus aliis, quæcunque torporem, frigo-  
raque iniiciunt. necnon & similibus vi-  
rilia & locos inter inguina & fœmina,  
& coxas illinito cicuta ex aqua, vel vi-  
no, vel aceto: item mandragora, aut aca-  
cia, & spongiis vice lanarum vtitor. In-  
terea subluenda aliud est maluæ deco-  
cto, & oleo, & melle: omnia verò acria  
vitentur. Defigantur in coxa cucurbitu-  
læ, aut in abdomine. Optimæ sunt autem  
& hirudines ad sanguinem deorsum at-  
trahendū. Et super vulnera cataplasma



CVRAT. ACVT. LIB. II. 335

imponatur micæ panis cum althæa. Postea in aqua defidat, vbi artemisia, salvia, conyzaq; decoctæ sint. At si longiori tempore vitium extrahatur. neque multitudo secundum proportionem minuta fuerit, & neruorum conuulsionis metus adest, (nam facile in his affectibus conuelluntur) curandi rationem mutare opus est. quippe calefacientia admo- uenda sunt, gleucinum scilicet oleum, aut Sicyonium prorosaceo. lanis autem mundis & cataplasmatibus tepescientibus partes illæ contegendæ: quandoquidem neruorum inflationes nonnunquã huiusmodi curatio mitigauit. amplius & castoreum cum mulsâ bibitum. Cibariorum parùm nutrientia frigidaque sunt: pauca triticea: plurima olera, malua, blitum, lactuca, cucurbita elixa, cucumis maturus elixus, pepo suo tempore collectus. A vino, & carnibus, longo temporis interuallo abstineto: siquidem vinum est neruorum calefactio, animæ remollitio, voluptatis renocatio, genituræ creatio, venerisq; excitatio. Hæc à me in acutos morbos remedia scripta sint.



Oportet autem & iuuenem medicum  
ipsum suo Marte aliqua sibi comparare,  
neque omnia ex alienis commentariis  
depromere. Hoc sanè pacto acuta vitia  
fiunt, ut ordine singulis quæ scripta sunt,  
aut omnibus uti valeas.



# ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM DIV-  
turnorum curatione,  
Liber I,

IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

Prooemium,	cap. I.
Curatio cephalææ,	cap. II.
Curatio vertiginosorum,	cap. III.
Curatio morbi comitialis,	cap. IIII.
Curatio melancholicæ,	cap. V.
Curatio furoris,	cap. VI.
Curatio neruorū resolutionis,	cap. VII.
Curatio phtisis seu vlcerum pulmonis,	cap. VIII.
Curatio purulentorum,	cap. IX.
Curatio pulmonis abscessuum,	cap. X.
Curatio asthmatis,	cap. XI.
Curatio pulmonariorum,	cap. XII.
Curatio vlcerū iecoris, & effusionis pu- ris,	cap. XIII.

Y



Curatio lienis, cap. XIII.

Curatio morbi regij, cap. XV.

Curatio cachexias, cap. XVI.

## PROOEMIUM, cap. I.



N longinquis mor-  
bis dilatio medelæ  
mala est: nā ob cun-  
ctationē in vitia in-  
sanabilia prolabun-  
tur. Inflatio sanè ita  
habet, vt non facile  
recedat, si semel inuaserit: at si & diuti⁹  
trahitur, temporis spatium vires acquirit:  
& nonnunquam euenit vt commoria-  
tur. Exiguos quoque morbos maiores  
exciipiunt: cūque priores discrimine  
vacarēt, eorum soboles perniciose exo-  
ritur. Itaque nullo pacto ægrotum file-  
re conuenit, ne morbus deprehēdatur,  
erubescens: neque aufugere vim cu-  
rationis metuentem: neque medicum  
pigrū esse, ignauūque oportet: vtrun-  
que enim ad morbum insanabilem effi-



CVRAT. DIVT. LIB. I. 339

ciendum consentit. Nonnulli autē sunt  
ægroti, qui præsentium, necnon & futu-  
rorum ignoratione ad finē vsque cum  
morbo degunt. Nam plerique neque pe-  
reunt, neque futurā mortem suspiciantur:  
quocirca neque se medici fidei commit-  
tunt. Horum probatio ex cephalæa col-  
ligitur, de qua prius sermonē instituiam.

CVRATIO CEPHALÆAE,  
cap. II.

CAPut quanto ad vitam magis neces-  
sarium est, tanto difficiliōri ægritu-  
dine laborat. Atque morborum capi-  
tis inuasio quidem tolerabilis est (nam  
parū dolēt, aures sonant, grauitas adest)  
at si intendantur, finis est mortiferus.  
Igitur exiguos dolores ne spernito. nā  
& exiguis medicamentis in quibusdam  
discussi sunt. Si plus tēporis extrahūtur,  
maiores cruciatus superueniunt. pro-  
pterea vena cubiti incidenda est: sed  
duobus ante diebus vinū bibat. tantum  
autem sanguinis detrahito, quantum  
eius vires tibi coniectati ostēderint. ve-

Y 2



rūm non semel totum detrahere magnopere expedit. porro quorum vires copiosam sanguinis detractionem patiuntur, his ipsis continuo morbus discutitur: atque id omnibus longis ægritudinibus conuenit. Tribus autem quatuorue diebus interiectis liberalius alendi sunt. Deinceps purgatorium, hieram quod vocant, cum mulsā propinandum: ea enim à capite morbi alimētum maximè abducit. modus verò medicamēti quatuor aut quinque drachmarum pōdo esto. Quòd si bene purgauerit, tunc lauandus est, & vinum exhibendum, & vires augendæ. Postea iterum vena frōtis recta scindenda est: hæc enim est opportunissima sanguinis detractio. modus autem esto hemina, aut paulò plus. neque vltra sanguinem mittito, quoniā vasa inanire non expedit. Deinde capillis nouacula detractis cucurbitulam priorem vertici affigito, alteram inter scapulas citra sanguinis effusionem admovento: & eam quæ in vertice fixa est, liberius scarificato quò sanguinis vberius attrahatur, & partes profundiores



CVRAT. DIVT. LIB. I. 341

incidantur . remedia nanque ad ossa  
vsque penetrantia cephalæam iuuant.  
Quòd si vulnera cicatricem ducant, ar-  
teriæ secentur: duplices autem sunt, ali-  
quæ post aures paulò vltèrius, propriisq;  
motionibus produntur: aliæ verò auriũ  
arteriæ prorsum versus sitæ sunt aurib⁹  
proximæ: nam instrumento, quod anti-  
trochon Græci nominant, adducuntur.  
verũ hæ quoque propriis pulsationi-  
bus innotescũt. nempè maiores ossibus  
vicinæ secentur: hæ nanque vtilitatem  
afferunt. adiacent & aliæ singulis auri-  
bus oppidò tenues, quas incidere pror-  
sus inutile est. modum verò incidendi  
in libris de Manuum operationibus ex-  
posui. Ceterũ post medelam in cepha-  
læa, morbo comitali, & vertigine, vtque  
semel dicam, in omnibus capitis vitiis  
(prius ventre, aut purgatorio, quod de-  
uoretur, aut clysteri, euacuato) pituita  
euocanda est, modo è naribus per ster-  
nutatoria, modo ex ore per ducetia pi-  
tuitam. Species autem sternutamenta  
citantium sunt piper, radix herbæ la-  
nariæ, fibri testiculus. hæc quidem sunt



vulgata & communia, ad læuorem autem terito, & cribrato, & calamo aut crassiore pennæ anserinæ caule inspirato. His efficacius in attrahendo violentiusque euphorbium est cū aliquo ipsorum admixtum. Quinetiam cum oleis miscetur, gleucino scilicet, aut Sicyonio, id est ex cucumere syluatico, aut cū vnguento ex styrace: redditur autē magnopere liquidum, vt fusile sit. infunditur per nasi fistulam: hæ verò geminæ sunt, atque ab vno canali cognatæ & coherentes adeo, vt semel vtrisque infundendum sit. neque enim tolerabilis est alterutrius naris sigillatim dilatatio. nā protinus caput acceditur, & acerbus dolor inuadit. Quæ autem per os pituita eliciunt, hæc sunt. sinapis, granum cni-dium, piper, vua taminia: id præstat vel mixta, vel singula. Cæterum quoniam & ipsa mādere, & expuere assiduum est, iccirco & cū aqua aut mulsa, aut posca permixta danda sunt: atque os eluendum. ad tonsillas enim impulso humore extentoque collo expirationis flatu abluatur. Posteaquam pituitam, quan-



tamlibet, eduxeris, permulta aqua ca-  
 lida lauandum caput, atque perfunden-  
 dū: vt perspirabile atque diffilabile red-  
 datur. ingētes enim obstructions fiunt.  
 Cœna frugalis & simplex esto: in qua &  
 vinum ad stomachi restitutionem su-  
 matur, siquidē & ipse magno dolore ve-  
 xatur. Interea verò vbi vires ægri sta-  
 biliueris, lotionē per clysterem vsitata  
 opus est: in qua nitri multum insperga-  
 tur, aut resinæ à terebintho arbore pon-  
 do drachmæ duæ eliquentur. postridie  
 sanguis è nasi interioribus detrahatur:  
 intro enim prælongum instrumentum  
 immittitur, quod cateiadiō vocant,  
 aut illud cui storine nomen est. aut si  
 quis horum copiam non habuerit, pen-  
 næ anserinæ caulem crassiorē sumere  
 debet, eiusque neruosam partem den-  
 ticulatim instar ferræ incidere, atque  
 sic in nares vsque ad ossa, quæ ob cribri  
 seu colatorij similitudinē ethmoeide  
 vocatur, immittere: deinde vtraque ma-  
 nu agitare, quod locus à dentibus in-  
 sculpatur, ac vulneretur. Facilis est au-  
 tem ac copiosus sanguinis cursus. nam



graciles venæ hîc desinunt, corporaque hac in parte mollia sunt, & sectioni habilia. verum & multos nares vulnerandi modos vulgus nouit, herbas scilicet asperas, & arida lauri folia naribus imponentes, aut digitis eas fortiter agitates. cum verò quantum satis sit, euacuaueris, quod erit hemina dimidiū, coerendus sanguis est spongiis & posca: aut aliquod aridum, quod sistendi sanguinis vim habeat, naribus inspirandū, gal-la, aut scifsile alumen, aut balaustium. Verumenimuerò post hæc remedia siue dolor capitis perseueret, siue desinat, oportet ad finē huius medicationis peruenire: quoniam id malum sæpe reuerti solet, & in suo vigore consistens plerunque delitescit. Itaque nouacula de rasis capillis (quandoquidem & hoc capiti prodest) ferramentis candentibus vrendum est: si in superficie, ad musculos vsq; peruenias: sin ossē tenus penetrare velis, à musculis caueto. nam musculi exusti neruorum distentiones cient. quòd si in summa cute vsseris, vinum odoratum album cum rosaceo infundere satis est:



CVRAT. DIVT. LIB. I. 345

pittarium verò madefactum per triduū  
supra crustas extendito . quòd si crustæ  
altius descendant , porri comam cū sale  
tritam, linteoloque illitam superdato.  
Tertio die crustis summam cutim tan-  
tum occupantibus ceratum ex rosa: pro-  
fundioribus autem lentem ex melle  
imponito. Sed quæ medicamenta cica-  
trici ducendæ sint , alio loco descrip-  
simus. Nonnulli super frontem ea in par-  
te , vbi futura est , quæ corona dicitur,  
cutim ossæ tenus inciderunt : illudque  
aut exerentes , aut excidentes vsque ad  
meditullium (quam Græci diploen no-  
minant) ad carnis repletionem perdu-  
xerunt. alij & ossa ad membranam vsque  
perforarunt . Verum id genus remedia  
temeraria sunt: nihilominus tamen ad-  
hibentur, si omnibus aliis têtatis adhuc  
cephalæa perseverat, & æger est animo-  
sus, vel corporis robur excellit . Nempè  
si paulatim ad sanitatem accessio fiat,  
exercitationes recto corpore pectori hu-  
merisque adhibeantur, manuum fiat ge-  
sticulatio, halteres iaciantur, saltu cor-  
pus moueatur , atque in his peritè cor-



pus torqueatur . primò & postremò  
crura fricentur , medio tempore ca-  
put . picatio assiduè picem inspergen-  
do administretur . item caput rubrifican-  
dum , nonnūquam sinapi cum duplo pa-  
ne affricando , ne intolerabilis ignis ex-  
citetur : nonnunquam medicamenta si-  
mul illinendo , quale est illud quod ex  
adarce , & euphorbio , & pyrethro com-  
ponitur . proficit autem & ad dolorem  
in tempore sedādum , & ad radicem ma-  
li extirpandam thapsiæ succus , & medi-  
camina cum ipsa iungenda , quocūque  
cutim tumefaciunt , & varis similia tu-  
bercula excitant . Viētus ratio in singu-  
lis dolorum generibus tenuis esto : exi-  
guus potus , & aquæ potio ante vllam  
medelam potissimum adhibeatur . ex  
toto verò ab acribus temperet , cepis , al-  
liis , & succo laserpitij . à sinapi autem nō  
penitus : siquidem eius acrimonia , præ-  
terquam quòd stomachi vim roborat ,  
capiti quoque haud ingrata est , pituitā  
fundens ac diffans , aut ad inferiora de-  
turbans . Leguminum pessima faba est ,  
& ei<sup>9</sup> species pisa , & quæ à Græcis ochri ,



CVRAT. DIVT. LIB. I. 347

& dolichi nuncupantur : illi cicerulae folio similes, hi faseoli aut lobi à nonnullis vocitati. secundo loco ponitur lens: quæ nonnullis concoctionis excretionisque virtutibus prædita est: sed caput replet, dolorénique concitat: nihilominus cum pipere elixa sperneda nõ est. Far lotum haud ingratum est cum vino & melle, quantum ad condimentum satis sit: & ex ipso conflata sorbitio, & eius semina in simplici iusculo decocta. vtique bona sunt & in condimento, quod Græci caryceiam vocant, semina cari, coriandri, anesi: apij verò semen iis anteferendum. mentha herba, & pulegium præterquã quòd benè olent, quandam vim habent, & vrinam mouendi, & flatus per inferiora expellendi. Inter carnes vetustæ omnes damnantur: nuper interfecti galli carnes laudantur. Inter aues torquatus palumbus, columbus, & aliæ quæcunque haud ita multum pingues sunt, suum extremitates, lepus assatus. Bubulla ouillaque caro crassum succum creat, & caput replet. Hædus non penitus malus. Lac & caseus ca



put dolore vexant. Ex piscibus saxatiles deligendi, & quotquot in ea regione optimi censentur. Olera elixa quidē ea assumantur, quæ lotium & ventrem ci- tant, malua, blitum, beta, asparagi, acris verò & brassica est. At inter cruda, la- ctuca omnium est optima. Radices autē etiam elixæ prauæ sunt. radiculæ, rapæ, pastinacæ vrinā mouent, sed caput ex- plent. fīsarum flatus edit, & ventriculū tumefacit. Vinum album, tenue, dulce, admittatur, tantum adstrictionis habēs, quod aluum nō remoretur. Omnia bel- laria capiti inimica. quin & palmularū omne genus. ficus autem & vua demul- cent, & quicquid ea parte anni, quam horam Græci vocant, bonitate præstat. sed quibuscunque vel etiam iuuantibus fatiari malum est. peior est cruditas: la- bores minus quàm cruditas nocent: ni- hilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutinæ aluo prius exonerata citra spiritus difficultatem benè feruntur: optimæ sunt etiam & à cœna. gestatio longa per loca non ven- tosa conueniet. atque vbi sol caput non



CVRAT. DIVT. LIB. I. 349

feriat: ei nanque firius officit. Vfus veneris capiti ac nervis labem accersit. Peregrè proficiscatur ægrotus in regiones calidiores ex frigidioribus, & in sicciores ab humidioribus. Confert & nauigatio, & in mari vitæ traductio. & si quis sit maris accola in salsa aqua frigida lauari, in mari natâre, & in arena volutari, victumque ex mari quærere proderit. Doloris verò capitis, quem heterocraniam Græci nominant, eadem medicamina sunt. nam quæ toti capiti remedia conducunt, eadem singulis eius partibus adhibere bonum est. Quibuscunque verò per hæc morbus depulsus non fuerit, iis reliquum est, vt veratro vtantur, vtpote vltimo atq; valentissimo omnium remedio.

CVRATIO VERTIGINOSORUM, cap. III.

ET succedit cephalææ vertigo, & ipsa per se propriis de causis oritur, si proueniat ab hæmorrhoidibus coercetur, si è naribus sanguis nō effluat, qui prius effluere consueuerat, sic corpus non dif-



fletur aut sudore, aut labore antea fati-  
 gatum. Igitur si ab cephalæa ducit ori-  
 ginem, ea medēdi ratione vti debemus,  
 quæ ad cephalæā supra exposita est. qui-  
 bus autem violentius cum vltimis reme-  
 diis occurrendum sit, posterius explica-  
 bo. Sin ab aliqua humorum suppressio-  
 ne morbus inciderit, vsitata excretio  
 mouenda est. naturæ nāque salutare est  
 materiæ recursus. At si ista tardat, malū  
 verò increfcit, in aliis quidem suppres-  
 sionibus aut sanguinis è naribus mana-  
 re assueti, aut sudorum, sanguis mitten-  
 dus est è vena cubiti: sin ab iecore mul-  
 tis humoribus affluente, aut à liene, aut  
 ab aliquo ex visceribus in medio corpo-  
 re positis vertigo prodeat, cucurbitulæ  
 subueniunt. Sed quantum ex vena de-  
 fluit, tantundem per has sanguinis est  
 detrahendum. sanguis enim est causæ  
 alimentum, quemadmodum & ventri-  
 culus. Deinceps capitis remedia subiun-  
 genda, vena cubiti recta, aut nasi arte-  
 riæ vtrunque in angulis secandæ: cucur-  
 bitula vertici affigenda, caput radendū,  
 rubrumque faciendū: pituita è naribus



CVR AT. DIVT. LIB. I. 311

per sternutatoria, aut ex ore, quēadmo-  
dum docui, euacuanda: omnia denique  
modo in cephalæa narrato administrā-  
da: duntaxat adiicitur cyclamini suc-  
cus, aut anagallidis in nares fundēdus.  
Postea quā verò medicaminum capi-  
tis ad finē perueneris, deinde quotquot  
efficaciora ad vertiginosos inueniūtur,  
ea sunt adhibenda. Vomitibus à cœna,  
necnon vomitibus ab esu radicalarum  
vti postea decet: quinetiam ad veratri  
assumptionem hæc præparatio fuerit.  
nam præexercendus est stomachus, cum  
vehementioribus vomitoriis vti volu-  
mus. Pituita quoque in præsentia magis  
attenuatur, & ad veratrum bene fundi-  
tur. Veratri exhibēdi modi plures sunt,  
vt validioribus quidē succurrat, ad ma-  
gnitudinem amæ, id est placentulæ, aut  
paulo crassius est incidendum: & cum  
fareloto, aut lente assumitur pondo-  
drachmæ duæ. imbecillioribus autem  
& gracilioribus decoctum cum melle  
propinatur: duarum aut trium mystil-  
larum modus esto. quis verò sit faciēdi  
mod⁹, alio loco declarabitur. Inter fin-



gula autem remedia æger cibis reficiendus est, quò ea quæ interim incidunt, sustinere valeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est, deligenda sunt crura supra talos & genua, & manus brachialia, brachiaque infra humeros prope cubita. ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. oleo verò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederã, aut id genus alia. fricentur extrema, & facies. olfaciat acetum, pulegium, mentham, aliisque eiusmodi ex aceto. inter dentes aliquid apertionis causa imponatur. nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. in tonsillis fiat titillatio, vomitus citetur. nam interdum reiecta pituita æger à tenebris excitatur. Hactenus ad accessionis leuamen & tenebrarum discussionem dictum sit. At de vniuersa victus ratione tam in curando, quàm post curationem hæc nostra sententia est. Somnus multus æque atque insomnietas inimica sunt: multus enim somnus stuporẽ capitis sensibus iniicit: vaporum exuberantia torpet omnis actio. Hi planè grauitatis, & sonorum in  
auribus,



auribus & splendorū quorundā oculis  
 obuersantiū causæ, morbi verò indicia  
 sunt. vigilia verò cruditatem facit, ali-  
 mentum subtrahit, laborē affert, corpus  
 cōtristat, mentem labefactat: propterea  
 facileque furere, atque atra bile vexari  
 isti consueverunt. Mediocris autem so-  
 mnus ad alimenti distributionem, & ad  
 laborum diurnorum leuationem utilis  
 est. Aluo ad excretionē cōsulendū: nam  
 diffilationis causa potior aluus est. Iterū  
 crurū frictio per aspera linteola vsque  
 ad ruborem, deinde dorsi & laterum, po-  
 stremò capitis adhibenda. ab his ambu-  
 lationes circa initia & finē leniores, me-  
 diæ verò acriores. Quies consistentia  
 spiritus post ambulationes esto. Vocem  
 leniter exercere oportet, grauibus vo-  
 cibus vtentem, sonū edere. acuta nāque  
 voces capitis distentiones, temporū pal-  
 pitationes, cerebri pulsationes, oculorū  
 inflationes, auriumque tinnitus efficiūt:  
 mediocriter acuta vox edita capiti  
 prodest. Postea verò gestationis tempus  
 adest ad distillandam totam capitis gra-  
 uitatem opportunæ. longa sit autē, verū

Z



citra fatigationem, neque in tortuosis  
regionis tramitibus, neque assiduus iti-  
neris flexibus gestatio fiat: quoniam sic  
vertigines oboriuntur. sed rectæ & longæ  
& lenes ac superioribus locis gestationes  
fiant. Siquidem ita assueti sint, optimum  
panem solum assumant, quantus exercita-  
tionibus impedimento ne sit. prius enim  
concoctum esse oportet. caput & manus  
exercendæ, horumque frictiones faciendæ.  
In his verò leniter agendum: ut caliditas  
excitetur, & caro augeatur, & vires re-  
stituantur, postea suum ipsius caput ere-  
ctum fricato diutius hunc laborem susti-  
nēs. Quin & exercitationes ad ceruicis  
usus, & ad manuum agilitatem faciunt, si  
scienter fiant. sursum attollendo caput  
atque oculos exercere oportet. Manuum  
exercitatio fit, aut discorum iactu, aut  
certando cæstibus, aut pugnis. pila verò  
parua & magna detrimento est. nam ca-  
pitis & oculorum circumuolutiones atque  
intentiones vertigines afferunt. optime  
faciunt saltus & cursus. omnia velocia  
exercitia cruribus conveniunt, & omnia  
roborant. Frigida lavatio illuie, illu-



CVRAT. DIVT. LIB. I. 355

uies autem calida lauatione melior. astringere, densare, siccare caput frigida lauatio efficacissime potest: & hic salubris status est. humectare, soluere, tenebras offundere valētissimè calida lauatio potest: & hęc capitis morborum causas sunt, tales sunt & austri auditui graues. exercitat onibus quies succedat, vt perturbationem sedet. Capitis pressiones ad cutim polliendam faciūt. Aquæ, aut aquati vini propinatio est res optima & ad manum. coma olerum assumatur, quę ventrem molliunt, maluæ, betę, bliti. Liquamen bonum stomacho, ori suaue, aluum leniens, neque graue capiti, ex thymo, aut thymbra, aut sinapi cōficitur, Qua hyeme calida, æstate frigida, putamine spoliata, non tosta præbeantur. Oliuæ, palmulæ, falsamentum rectè conditum. Alica elota cum aliquo dulci, quantum condiendi causa assumi debet. Post hęc sal adhibendus. Ociū & quies ab audiendo & loquendo. ambulat: onibus vtatur sub aere perspirabili. delectat autem locus aut arboribus consitus, aut herbidus. Vtique vertigi-

Z 2



nosus cūm ad cœnam accedit, maximè  
iterū in frigida lauetur, parum vngvine  
corpus sublinēs: si nolit, at crura tātum.  
cœna triticea esto, quale est itriō, quod  
est placentæ genus, aut sorbitio ex ali-  
ca, aut ptisana flatu vacans, per elixa-  
tionem concoctu facilis. Medicamenta  
verò suauiore ptisanā reddentia sunt,  
piper, pulegium, mentha, cæpæ aut por-  
ri paulum, neque tantum vt innatet: a-  
cetum verò acre vtiliter assumit. Car-  
nes ex pinguibus animalibus non pin-  
gues, suum pedes & capita. Volatilia om-  
nia, sed multitudinem coniectura meti-  
ri oportet, lepus & venatio. gallina in  
promptu habetur, & iuuat. Omnia bel-  
laria caput dolore infestant præter pal-  
mulas, aut maturas ficus, aut vuas. si fla-  
tibus homo vacet, hæc bene facient. In  
secundis quoque mensis vtiliter ea su-  
muntur, quæ facilè concoquuntur, si ni-  
dore vacant, & leuia sunt. Postea deam-  
bulatio, mentis hilaratio, in quiete ad  
somnum conuersio adhibenda.



CVRATIO MORBI CO-  
mitialis, cap. III.

**I**ngentibus medicamentis atq; valentissimis in morbo comitali opus est. nam quoties eius in mentem venit, non modo laboriosum malū, & periculi plenum, sed etiam generis morbi sceditatem & calamitatis opprobrium exhorremus. atque ita existimo, si se mutuo in accessionibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent, non ultra vitā ducere tolerarent. verū quæ singulis atrocia scēdāque insunt, sensus privatio, intuendique sublata facultas abscondit. Cæterū medendi rationē naturæ facilitatem sequi optimū est, quādo per ætatis mutationes in longe melius hominem permutat. Quoniam si visitatus malo victus, in quo morbus alitur, defierit, non ulterius hominē infestat. simul enim cū priore victus specie morbus recedit. Igitur si caput occupavit, inhabitat. quocirca omnia quæ à nobis in capite de Cephalæa relata sunt, facere necesse est: detrahendo sanguine &



corpore purgando. Venæ autem & quæ in cubito, & frontis recta secandæ sunt: cucurbitula admouenda. non est autem vsque ad animi deliquium sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Arterię omnes, & ante & post aures incidendæ. inter hæc omnia excellēs purgatio facienda purgatorio, quā hieram vocant, atque his quæ è capite pituitam eliciunt: sed multo valentiora sint medicamēta. siquidem istorum habitus est dolorum paties: hilaritas verò & bona spes id genus ægros miseros reddit. Opus est etiam ignē capiti inferre: proficit enim. In primis os perforare vsq; ad secundam laminam oportet: deinde cecratis cataplasmatisque vti tantisper, donec mēbrana ab ossibus recesserit. Terebra nuda ossa circuncidere conuenit: ac si paulum resistant, vsque ad spontinam auulsionem perseuerandum, quousque nigra nonnunquam istorum, & crassa membrana inuenta fuerit. Cumque per putrefactionem vel etiam purgationem audacter curante medico vulnere cicatrix inducta fuerit, ægrotus morbum



euasit. Maximè omnium capitis ad ru-  
borem vsque frictions valent vsitatae  
quidem, quaecunque à me superius tra-  
ditæ sunt: valétior est autem, quæ fit per  
cātharides. sed tribus diebus ante. quàm  
his vtamur, lac, vt vesica muniatur, bi-  
bendum est: cantharides enim magno-  
pere vesicam lædunt. Hæc abundè sint,  
cum caput affectum est. At si mediæ cor-  
poris partes causam præbent, & ab his  
morbus exoritur (rarissimè autem ista  
fiunt: potius enim mediæ partes in con-  
sensu morbi trahuntur à capite, vtpote  
ab ingenti malo, quod ægritudinis ini-  
tium est) vtcunque igitur res habeat, &  
in his vena cubiti soluenda est: à visce-  
ribus enim materiæ cursus est. Quin  
etiam isti magis quàm alij purgandi  
sunt & hiera, & cneoro, quam thyme-  
læam vocant, & coccognidio, quæ cha-  
melæa dicitur: hæc enim pituitam ex-  
trahūt. per opportunū autem ipsis reme-  
dium est cucurbitula, epithematum ve-  
rò & cataplasmatū sylua omnibus per-  
specta est, & ea vbique scribere super-  
uacuum ducimus: nisi quatenus eorum



vim nosse conueniat, quòd scilicet iis  
extenuare, per halitus digerere, fluxa spi-  
rabiliâque corpora reddere oporteat:  
item concoquentibus medicamentis ca-  
lidis, aridisque, & vrinam mouentibus  
in nutritione, & in medicatione vten-  
dum: sed omnibus præstat fibri testicu-  
lus sæpius in mense ex aqua mulsa po-  
tus. præterea quæcunque ex variis com-  
posita medicamenta idem præstant, ad-  
hibenda sunt, ex viperis composita an-  
tidotus, & Mithridatica ex pluribus cõ-  
stans, necnõ & Bystini antidotus biben-  
da est: quandoquidem hæ concoquendi  
facilitatē roborant, vtilis humores cre-  
ant, & vrinæ mouendæ aptæ sunt. nam  
quæcunque simplicia medicamēta scri-  
bere opus esset, hisce continentur anti-  
dotis, cinnamomum, casia, folia mala-  
bathri, piperis, feselisque omnia genera.  
& quod nam ex valentissimis remediis  
in istis compositis nō reperies? Fama est  
& vulturis cerebrū, & crudæ fulicæ cor,  
& domesticos feles comesos, morbum  
discutere. At ego istorum periculū non  
feci. nonnullos autem vidi nuper iugu-



lati hominis vulneri fialam subiiciētes,  
atque inde haustum cruorem bibentes.  
O ingentem necessitatem, quempiam  
sustinere, malum malo piaculo depel-  
lere: atqui ex ea ad sanitatem necne isti  
peruenerint, nemo verè mihi affirmare  
potest. Quin & quendam auctorem le-  
gi, qui humanum iecur epulandum ap-  
poni præcipiebat. sed hæc illis scripta  
sunt, qui ad hunc vsque miserię termi-  
num peruenerunt. Præterea & victu  
opitulandū est, & singulis remediis, quæ  
aut ab aliis, aut ab ipsomet ægro fieri  
possunt. vtique in hoc casu nihil spernē-  
dum est, nihilque temerè faciendū, ma-  
ximè quælibet exigua adhibendo, quæ  
penitus profint, nihil verò lædant. Ete-  
nim spectacula nō spectanda, & sermo-  
nes, & edulia, & suffimēta plurima mor-  
bum patefaciunt. Igitur omnia diligen-  
ter consideranda sunt. Somnus multus  
crassitudo est, ocium nebula sensuum,  
bonum verò mediocritas. Alui excre-  
tio à somno præcipuè flatuum ac pitui-  
tæ res optima. Ambulationes longæ  
commodæ sunt, non flexuosæ bonum



spiritum reddunt, sub arboribus myrto,  
aut lauro, aut inter acres & benè olētes  
herbas calamēthum, pulegiū, thymum,  
mentham, maximè quidem agrestes &  
sponte nascentes: sin harum copiam nō  
habeat, inter humano cultu procreatas.  
Inter has quoque gestationes longæ, &  
ipsæ rectæ fiant. Itinera facere bonum  
est non secundum fluuium, ne de laben-  
tem aquam intueatur: vertiginē enim  
aquæ fluxus affert. neque vllum qui in  
orbem voluatur, neque turbinē qui cir-  
cum agatur, inspiciat. est enim imbecil-  
lior, quàm vt firmum stabiliat spiritum.  
nam simul cum circulo vertitur: circū-  
uolutio autē vertiginem, & comitia-  
lem morbum accerfit. Post gestationem  
lenis deambulatio, postea quies: vt agi-  
ratio in gestatione contracta sedetur.  
Ad hæc exercitationes manuum fiant  
extremis sudario ex crudis linis confe-  
cto inuolutis: inunctio non valde pin-  
guis sit: frictio lentā quidem, sed durior  
densandi causa: tumidi enim & crassi  
sunt plurimi. in medio verò totius fri-  
ctionis caput erectum perfricetur. Exer-



CVRAT. DIVT. LIB. I. 363

citationes ad ceruices & humeros per-  
tinentes, manuum commotio: omnia  
quæcunque à me de vertiginosis dicta  
sunt administrètur. satis verò hic ex co-  
pia ibi descripta positum est: præterquam  
quod velociores horum exercitationes  
esse oportet ad sudorem mouendum, ca-  
loremq; excitandum: hæc enim omnia  
extenuant. Verum & in omni vita opor-  
tet excandescentiam iracundia vacan-  
tem iniicere. Alimenta omnia ex crassis  
leguminibus mala: triticei verò panes  
sicciore præbendi. alica elota, & ex ea  
forbitiones. sed medicamenta volupta-  
tis causa eadem cum supra positis fun-  
to: nunc autem plura ex acrioribus po-  
nito, piper, zingiber, libypticum. Ligua-  
mina verò ex aceto & cumino & suaui-  
a sunt & utilia. A carnibus quidem maxi-  
mè in totum abstineant, sin minus, in cu-  
ratione saltem: in refectione verò car-  
nes deligantur, quæcunque sunt natu-  
ra leues: quales sunt volatilium, præ-  
ter anatem, & concoctu faciles, vt le-  
pores, suum pedes, falsamentum. &  
post hæc sitis utilis est. Vini paulum



bibatur albitenuis odorati, quod lotiū mouet. Elixorum olerum assumantur quæcunque facultate acria, extenuant, & urinā citant: qualis est brassica, asparagus, vrtica: crudorum autem lactuca ea parte æstatis, quam horā Græci medici nominant. Cucumeres autem & pepo viro quidem robusto superuacua, nonnullis verò gustatione tenus præbenda. mala est enim horū multitudo, cum frigida sint, atque humida. Fici viridis & maturæ vix vsus conuenit. Ambulationes, post eas animi oblectatio molestia carens iuuat, iracundia vtique & venus noxiæ sunt. Effectus enim morbi similitudinem adducit. At nonnulli medici de concubitu falluntur. Nam quoniam naturalis in virum transitus aliquantum proficit, puerorū naturam in tempestiuo concubitu violarunt, tanquam citius eos roboraturi. sed isti à natura sponte præfinitum tempus, in quo omnia remedia sūt, ignorāt. Hæc enim singulis ætatibus propria simul opportunis tēporibus creat. in tempore namque concoctiones seminis, barbæ, cano-



CVRAT. DIVT. LIB. I. 369

rum. Quis igitur medicus naturæ com-  
mutationem seminum à principio, tum  
præfinitum singulis tempus variauerit.  
Quin & in morbi naturam impegerūt.  
nondum enim in tempore quidam vene-  
ri dare operam cœperunt, ante immatu-  
ritate rei noxam accipientes. Vitam au-  
tem degere oportet in regionibus cali-  
dis & siccis. siquidem res frigida atque  
humida morbus est.

CVRATIO MELANCHO-  
liæ, cap. V.

**N**VM sanguinem detrahere expediat,  
deliberatione indiget in melancho-  
licis. ex quo humore morb<sup>o</sup> oritur: quin  
etiam ex nō pauca malorum succorum  
(cacochymiam Græci nominant,) mul-  
titudine. Itaque si in iuuenili ætate quis  
morbo corripitur, & veris tempore, ve-  
na in dextro cubito media cædenda est,  
vt à iecore sit opportunum effluuium,  
id enim viscus sanguinis fons est, & bi-  
lis generatio: vtrunque verò melancho-  
liæ alimentum. cædenda est, inquam, li-  
cet sint graciles & sanguinis inopis: sed



paulū sanguinis mittendū, quatenus videlicet venæ sectionē vires sentiant, sed nullam noxam earū tenor accipiat. Nā & si crassus, & biliosus, & cōcretus, & ater, qualis amurca, sanguis est, nihilominus ipse naturæ prædiū est atq; alimentum. Quocirca si plus q̄ decet, sanguinis effuderis, natura cibi penuria de propria sede prolabitur. At si sanguine refertus est æger, plerunq; quidē non vsq; adeo malus sanguis est, vena tamē utiq; secanda est. verū nō eodē die, sed aliis diebus repetendo, quantum satis est, sanguinis, detrahatur: eodem verò die modum sanguinis mittendi vires declarabunt. medio tēpore, quò aliam euacuationem sustinere valeat, liberalius nutriatur. Opus est autē & ventriculo ipsi quoq; ægrotanti & laboranti opitulari, eū verò si atra bilis vrget, per diē vnum prius tenuiter nutrito ægro nigri veratri pondo drachmæ duæ ex aqua malsa præbeantur. id enim bilem atram expurgat: necnon & thymi Attici coma & ipsa bilem atram educit. commodissimum est autem singulorum partem, vt



CVRAT. DIVT. LIB. I. 367

ex utroque duarum drachmarum pondus fiat, exhibere. post purgationem lauetur, viniq[ue] paulum bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. stomacho enim ac viribus laboriosa purgatio est: posthac iterum ad media faciendus transitus. cum prius verò cataplasmate atq[ue] irrigatione laxaveris, cucurbitulam iecori & ventriculo, aut eius ori admoveas. nāque hæc detractio multo quàm sectio venę est opportunior. tergis quoque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimētum vires instauraverit, caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. huius enim morbi inter alios prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atq[ue] initium est. commutatur igitur & ipsi, egritudinemq[ue] participant: utique nonnulli & sensibus delirantibus corruptè sentiūt. At stomacho potissimum succurrendum est: cum & ipse malè habeat, & in ipso bilis atra



resideat. Igitur absinthij succum ab exiguo incipiens ad fabæ usque magnitudinem assiduè deuorato. id enim ne bilis gignatur, impedimento est. Benefacit & aloe. nanque ipsa ad inferius intestinum bilem deducit. Nempè si recens malum sit, neque multum homo à naturali statu discesserit, alia huic medela opus non est: sed reliqua victus ratione vtendum, & ad pristinū habitum recuperandum, & ad exactam mali purgationem faciendam, & ad vim corroborandam: quæ omnia, ne iterum morbi reuertantur, efficiant. Victum autem in refectione conuenientē posteriùs exponam. Si ab his paulū debilitatus morbus denudò inualescere visus fuerit, vehementiora medicamenta requirit: neque in aliud tempus differendum est. Verū si ab coercitis mulierum mensibus, aut in viro ab suppresso hæmorrhoidum profluio morbus creatus est, irritandi sunt loci, & aliquid soliti excrementi profundendū. Si cunctatur, neque descendit in aliā quampiam partem sanguine prolapsa, morbus verò exacerbatur, euacuatio  
facienda



facienda est, & à talis incipiendū. Quòd si non quantum satis est, sanguinis, inde manauerit, cubiti quoque vena secetur. Interiectis autem reficiendi causa tribus, aut quatuor diebus, hieram, id est sacram, quæ purgatorium medicamentum est, potui dato. Ad hæc cucurbitam mediis corporis partibus applicato, iecori videlicet affigens. Sed maturanda negotia sunt, ac celeritas adhibenda. exiguis enim medicamentis morbus non obsequitur: si magnis autem non vincitur, sed resistit, tunc firma sede melancholia nititur. Quòd si penitus totum corpus occupauerit sensus, mentem, sanguinem, bilem, neruos etiam corripuerit, & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inferit, furoris, neruorum distentionis, resolutionisque. quæ si à melancholia proueniunt, sanatione utique accipere nequeunt. Quam ob rem ad hoc malum propulsandum veratro vtendum est: sed antequàm veratrum agrotus accipiat, stomachum ad vomendum exerceat, & humores extenuet, & corpus fluxile red

Aa



dat. Vomitiones autē hāc praeſtant nō-  
nunquam ieiuno ſtomacho, nonnun-  
quam radice prouocati. Docebimus ve-  
rō & modum, & materiam: docebimus  
& veratri ſpecies, & vtendi rationem:  
item quo pacto ſingula & diſtinguere,  
& ordinare prius oporteat, & quo pacto  
in vomitionibus ſubueniendum ſit, in-  
dicabimus. Incredible eſt autem niſi ab  
his funditus conuulſus eſt morbus, at  
multorum ſaltem annorum interuallo  
non ſopiri. plerunque enim poſtea me-  
lancholia ruruſum ſuboritur. Quōd ſi  
iam firmas radices egit, nihil iam vltra  
differendum eſt: ſed quae ad veratrum  
pertinent, omnia adminiſtranda. Nem-  
pē aegroti omnes ſanari nō poſſunt: me-  
dicus enim deorum potentiam antei-  
ret. verūm dolores ſedare, morbos inter-  
cipere, atque obſcurare, medico fas eſt.  
Itaque nimirum hiſ quae poſuimus, ad-  
hibitis, medici defatigantur, ſeque aliud  
quicquam faſtuſos negant, atque duas  
cauſas, aut morbum inſanabile eſſe, aut  
omnia ſe remedia tentariſſe praeſtexunt.  
Nihilominus tamē ſacram ex aloe me-



dicinam subinde præbere haud alienum  
 est: siquidem opportunum melancholiam  
 subsidiū affert, stomacho & iecori sub-  
 uenit, bilēque deiciens mirificè pro-  
 dest. Quin etiam malux seminis pondo  
 drachmam ex aqua propinare optimum  
 esse quidam experientia compertum  
 habuit. Infinita præterea sunt simplicia  
 medicamenta: quorum aliis alia vtilia  
 sunt. Post id genus labores demum re-  
 ficiendus æger est: quibusdam enim,  
 quandiu medicatio adhibetur, tandiu  
 morbus permanet, quanuis labefacta  
 tus ac debilis: at si homo carnes resar-  
 ciat, ac vires instauret, simul omnia mor-  
 bi vestigia oblitterantur. nam potentia  
 naturæ sanitatem, imbecillitas mor-  
 bum parit. Propterea ad refectionē con-  
 uertatur agrotans in aquis sponte cali-  
 dis sæpe cōmorans. medicamenta enim  
 quæ in his sunt ingenita, opem ferunt,  
 bitumen videlicet, aut sulphur, aut alu-  
 men, ac multo his plures alię facultates.  
 Bona utiq; est hamectatio morbi squal-  
 lorem tollens, & curationis vexationē  
 mitigans. Raræ autem ac molles carnes



ad ægritudinis remissionem maximè faciunt: verum siccae ac densæ melancholia laborantibus carnes sunt. Inunctio pinguis cum leni frictione adhibeatur. cum multo autem oleo, hæc contineat.

Multa deficiunt.

panes loti cum vino aliquo dulci, Theræo, Cretensi, & Scybellite, quod Pamphyllum vocant: aut vinum & mel quæ iam diu permixta fuerint. oua & frigidiora & calida, putaminibus nudata: nō pingues carnes vim detergendi habentes, porcorum pedes & capitis partes: animum alæ pingui carentes: venatio, ut leporis, caprearum, damarum carnes: fructuum autumnalium quisquis optimus fuerit. Stomachi subuersioni consulendum est ante cibum, quod minus deuoratus reiiciatur. quare ante omnes cibos mulsæ cyathi dimidium dandum est, bibitumque per vomitum reddendum: quod stomachi excrementa purgentur. sic enim cibus in ventriculo firmus residet. At medicamina necessariò edu-



CVRAT. DIVT. LIB. I. 373

cendorum purgatoria sunt pini fructus,  
& vrticæ: semina coccali & piperis, a-  
mygdala amara: mel eis consistentiam  
præbeat. Sin exiccare volueris, optimè  
proficit myrrha, & iridis radix, & medi-  
camentum ex viperis, & Bistini, & Mithrida-  
tis antidotus, & id genus alia propè in-  
finita. Exterius apponenda sunt cataplas-  
mata, quorum materia est sertula, & pa-  
pauer, & terebinthi lachryma, & hyssop-  
um, & oleum ex rosis, aut ex œnanthe.  
cera autem hæc omnia cogantur. Inun-  
ctio pinguis, gestationes, deambulationes,  
& alia quotquot carnes reficiunt, &  
vires instaurant, & naturam in antiquū  
statum reuocant, administrentur.

Sextum & septimum caput deficiunt.

DE CVRATIONE PHTHI-  
sis, seu vlcera pulmonis,  
cap. VIII.  
carens principio & fine.

\* quemadmodum in naui & tranquil-  
litate. nam si recte habuerit ægrotans,

Aa 3



in mari gestatio fieri poterit: atque ibi  
vitam deget. cum vlceribus enim quid-  
dam siccum marina salfugo communi-  
cat. à gestatione quiete concessa vten-  
dum in praesentia pingui oleo. post fri-  
ctiones oleum cum aceto infundatur,  
palum primò, deinde adiiciendum vs-  
que ad heminas quinq; aut sex, aut mul-  
to plus etiam: sin minus, at saltem quan-  
tum quis ferre poterit. multoties enim  
vel id solum pro omni alimento satis-  
fecit. Lac verò assumptu suaue, potu fa-  
cillimum, nutritu solidum, & qualibet  
esca à pueritia familiaris est: praeterea  
visui colore delectabile, medicamen ar-  
teriam non asperans, guttur laeuigans,  
ad eiiciendam pituitam facilem spiri-  
tum reddens, inferiorem exitum lubri-  
cum efficiens, vlceribus dulce subsidiū,  
& quolibet alio benignius. Si quis mul-  
tum lactis potat, nullo alio eget alimē-  
to. in morbo enim bonū medicamen est  
lac, eiusdem & alimentum efficitur. nā  
hominum lacte vescētium nationes fru-  
mentum non edunt. optima verò est cū  
lacte & puls, & bellaria & alica lota, &



quæcunque edulia ex lacte sunt. quod si & alia esca indigeat, eiusdem generis esto. ptisanæ cremor cōcoctū facilis, tenuis materiæ est. catenus verò condendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. siquid etiam saporis iucunditatem afferens capiat, & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegiū. mentha, salis exiguum, acetum, aut mel. si ventriculus non concoquit, huiusmodi exhibenda sunt. At si nihil ventriculo tale exhiberi necesse sit, omnibus ptisana præstantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare. minus enim flatuosa. & concoctū facilius est, si quæadmodū & ptisana extersa deglubitur. In humidioribus faba vlcera purgat, sed flatibus redundat. item pisum & cichrus, qui & quantò pauciores flatūs citant, tantò minus vlcera purgant. Itaque medicus coniecturis ductus, prout præsentia postulant, his vti debet. istorum quoque condimenta sunt, quotquot de ptisana memorata sunt. At oua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus nuper edita optima sunt, priusquam eam. ♀



Reliqua huius capitis vsque ad xiiij.  
caput deficiunt.

DE CVRATIONE VLCE-  
rum iecoris, & puris ab eo  
effusionis, cap. XIII.  
carens principio & fine.

in iecore vlcus perniciosum in fit. pericu-  
lofissimus autem est qui in ventrem fit,  
saniei confluxus, si stomachum occupet,  
qui viam superiora petentibus præbet.  
Alimentum enim vitæ causa est: ipse  
verò alimenti dux est stomachus. insu-  
per medicamenta intimis corporis par-  
tibus stomachus distribuit. quapropter  
si ad quælibet deuoranda malè se ha-  
beat, celerius ægrum morbo atque fa-  
me consumi necesse est. Hæ sunt cuius-  
que loci, quo se pus cōuersurum est, in-  
ter se differentes notæ. Nam si per inte-  
stina delabitur, tormina vexant, aluus  
liquida est, pituita & bilis fertur: deinde  
cruentum virus circumfluens, aut humi-  
ditas aquæ similis, in qua crudæ carnes  
demerse lotæque fuerint. Si pus in vesti-



cam defluit, grauitas in renibus lumbis-  
 q; sentitur. ac primò lotium multum &  
 bile infectum, postea turbulentum, nul-  
 lam subsidientiam continens, quã Græ-  
 ci hypostasim dicunt, inconstansque de-  
 curret: ad extremum verò & sedimen-  
 album apparebit. Sin ad stomachum fur-  
 sum versus pus rapitur, tunc orietur nau-  
 sea, odium cibi, vomitus pituitæ, aut bi-  
 lis, defectus animæ, vertigo vsque eò, do-  
 nec pus erumpet. Præcipuum sanè fue-  
 rit in aliã partem auertere. praua enim  
 hæc via est. Quòd si pus violentius fe-  
 ratur, omnia facienda sunt, st omachòq;  
 succurrendum escis, medicamentis, vi-  
 ctusque ratione. Sed omnia leniter ad-  
 hibenda. Medicamentis quidem vt sinus  
 effringatur, studendum est. herbam ita-  
 que hyssopum cum mulsa potui dato, &  
 marrubij comam ipsam quoque cum  
 mulsa & succo absinthij. Hæc utiq; quò  
 humores extenuentur, & viæ lubricæ  
 reddantur, & purulenta corpora facilè  
 rumpantur, ante cibos bibere expedit.  
 Dandum est & asininum lac bilem non  
 generans, benè nutriendum, in caseum non



spissescens: quæ lactis virtus est. Ad hæc ægrotanti gratificandum in cibo & portione: quos & si paulo deteriores iuuantibus sunt, nihilominus tamen concedito. nam stomachus nauseam mouenti & cōtristanti humori transitus erit, siquidē nonnullos puris exitus offendit. Cauendum est etiam ne ieiuni sint: cumque aliquid cibi capiunt, illud purum syncerumq; sit. Opus est autem & in cæteris effluuiis diligentissimam stomachi curam suscipere: quandoquidem ipse omnibus medicamentis iter præbet. Meminisse quoque iecoris oportet, vbi vlcerum radix est. Porro si pus in vesicâ impetum facit, vrinam citantibus eliciatur: vtputa assari radice, adianto, & meo potabilibus. hæc enim ex mulsa potuenda sunt. Bistini vtique varium medicamentum, & quod ex vesicario solano conficitur, & quotquot experimento aliquibus probantur, optima sunt. Verum enim verò si per intestina educere malis, tibi lac eductorium esto, præcipue quidem asinæ: id non adfit, capræ, aut ouis. Succi autem lubrici & abstergen-



CVRAT. DI VT. LIB. I. 379

res præbeantur : qualis est ordeaceus.  
Opsonia sunt piper, zingiber, lygusticum. vtque semel de omni victus ratione absoluiam, in qualibet puris eruptione alimenta sint boni succi, stomacho utilia, concoctionem facile admittentia: ea verò sint aut cremores, aut ex lacte pultes, & cibi ex amylo, & bellaria cum lacte.

CVRATIO LIENIS,

cap. XIII.

**S**cirrhi in liene geniti discussiones non facillimæ sunt. quod si & ab hoc oriundi morbi proueniât, vtpote aqua intercus, aut malus habitus, insanabile malum effectum est. Hac ratione verò scirrhis medicus opem ferre debet: orientes auertere, & nuper incipientes discutere oportet: inflammationibus autem resistendum. Siquidem scirrhi inflammationibus ad difflationem tendentibus veluti hereditario iure succedunt: hæc enim inflammationis germina sunt. Porro iis remediis vtendum est, quæ à me in sermone de acutis morbis



relata fuerunt. Si tibi omnia facienti in inflammatione scirrhus immaneat, igni quoque similibus ad molliendam duritiam vtitor: irrigationib<sup>9</sup> ex aceto, oleo, & melle. Sed lanæ vice panni lintei complicati accipiantur. Sic vnguentariæ glâdis puluis cribratus inspergendus est: & cataplasmatibus quàm molliissimis.

Curatio  
ven,  
Curatio  
cap. II  
Curatio  
Curatio  
Curatio  
uij,  
Curatio  
Curatio  
Curatio  
Curatio  
intestini  
Curatio  
Curatio



# ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM DIV-  
turnorum curatione,  
Liber I I,

Cuius prima quinque capita non  
verterat Crassus.

Curatio hydropis, id est aquæ inter cu-  
tem, cap. I.

Curatio diabetis, siue vrinae profluuij,  
cap. II.

Curatio affectorum renum, cap. III.

Curatio vitiorum vesicae, cap. IIIL

Curatio gonorrhoeas, i. feminis proflu-  
uij, cap. V.

Curatio vitiorum stomachi, cap. VI.

Curatio ventriculi affecti, cap. VII.

Curatio colicorum, cap. VIII.

Curatio dysenterias, seu difficultatis  
intestinatorum, cap. IX.

Curatio læuitatis intestinatorum, cap. X.

Curatio affecti vteri, cap. XI.



Curatio morborum in articulis & co-  
xendice, cap. XII.

Curatio elephantiascos, cap. XIII.

### CURATIO DIABETIS,

siue profluentis vrinae,

cap. II.

**D**iabetis, id est vrinae profluuij, mor-  
bus hydropis species est, quod ad cau-  
sam & habitum attinet: loco vnde hu-  
mor effluit, solo differt. Nam ascitis pe-  
ritonaeum conceptaculum est, nec de-  
fluuiū habet, sed illic permanens exun-  
dat: in diabete verò idem est à patiente  
lapsus humoris, eadēque colliquatio:  
in renes autem & vesicam exeundo fer-  
tur effusio. aqua intercute laborantes  
hac via procedunt, si à morbo conuale-  
scant: ac bonū est, si causa solvatur, nec  
ponderis dūtaxat leuatio fiat: his autem  
maior sitis adest. humidū enim defluens  
exiccat. Remedia ad colliquationē se-  
dandam eadem quae ad hydropas va-  
lent: ad sitim verò medicina magna est



CVRAT. DIVT. LIB. II. 383

opus. ea enim in omnium dolorum genere maxima est. et si humidum bibat, meiendi prouocatio est: adde quod & effluens his humor secum abducit ea quæ de corpore colliquat. Opus est igitur medicamentis sitim depellentibus. sitis enim magna est, ac potus insatiabilis cupiditas. nullus enim potus quantus quantus is fuerit, siti medeatur. Omnino stomacho, unde sitis fons scaturit, succurratur necesse est. Igitur ubi hiera purgaueris, epithematis utitor, nardo, mastiche, palmulis, malis cydoniis crudis. horum quidem succus cum nardo & rosaceo ad humectandum optimus, caro verò cum mastichis & palmulis cataplasma fiat. cum cera verò & nardo vngento horum mixtio bona est, vel succi acacie & hypocistidis, tum ad humectandum, tum ad cataplasmatum fouendum. Cæterum & aqua quæ potui dabitur, cum pomis decoquatur. Alimenta sint lac, & cum eo cibaria, amyli, alicæ, sorbilla, vinum adstringens, ad stomachum roborandum: id quæ meracius sit præstat, ad euaporandos & disiciendos alios humores. nam



fitim falsi pariunt: vinum verò vna & adstringens & refrigerans migratione pariter & temperatione. ad vires autem prodest etiam si vinum dulce sit vt sanguis, ad eius procreationem. Varię medicinę eadē adhibeantur, theriaca, Mithridatica, quę ex fructib<sup>9</sup> mollioris corticis quos oporam Græci vocant, conficitur, & alia hydropi cōducentia: itēque vniuersa victus vitęque ratio eadē esto.

### CVRATIO CALCVLORVM

& vlcera in renibus,

.cap. III.

**D**E inflammatione & sanguinis eruptione, & quicunque à renibus affectus acutē perimūt, in libris de Morbis acutis scripsi: de exulceratione, calculorumque ortu, quę vt plurimum senibus commoriuntur, nunc potissimum scribo, ad curationem quā proximē possum accedens: sin minus ad laborātium nōnullam mitigationem. Calculorum igitur procreationem ē fœcūda sterilem reddere



CVRAT. DIVT. LIB. II. 385

reddere nemo potest. facilius est enim  
vterum à pariendo prohibere, quàm cal-  
culosos renes calculis vacuare: ad exitū  
quoquo modo procurandū auxilia que-  
renda sunt. Itaque si calculi confidant,  
remedia dicam. nam valde tum agroti  
dolent, insuper & torminibus, & voluu-  
lo coli, & vrinæ suppressione mortem  
obeunt. contigui enim sunt renes & co-  
lum. Nam si calculi insistant, insitque  
præterea lotij suppressio ac voluulus, ve-  
na malleoli quæ rectà reni respondet  
secetur. Nam sanguinis è renibus flu-  
xiones, calculorum inhaesiones cohi-  
bent. inflammatio enim colligata te-  
net omnia: phlegmones autem euacua-  
tio solutio est. lūbique humectandi, vbi  
renum locus est. adhibeatur verò veteri  
vel recenti oleo rhyte. Anethi quoque  
coma ad vrinam ciendam prodest, & li-  
banotis, aut sampsuchum: his autem ita  
aqua inspergenda est. parum enim  
inunctiones essent. cæterū & his fouen-  
dum, coriis bubulis infuso anthemidis  
oleo. Cataplasmatum sylvia cum farinis  
eadem esto. Soluit & nonnunquam cal

Bb



culos insistentes cucurbitula levis: ac optimum fuerit, si super inflammatione scarifices. Quod si etiam nū tibi hæc facienti superstitēs calculi maneant, in oleum homo descēdat. Id enim simul omnia confert: tepor quidē emollit, quādamq; tenus ad lentitiam adducit: acrimonia promptē mordet: quæ quidem & calculorū exitui profunt, eosque prouocant. ē simplicibus pharmacis potui dāda sunt radices, phu, meum, asarum: herbe, prionites, petroseli, sium: ē variis, vnguenta quæ capiunt nardū, cassiam, myrrham, cinamomum.\*

\* \* \*

cicatricem obducet sinapi, & crustæ ab igni obductæ, & quæ antea dixi epithemata. Diæta verò, inunctio, nauigatio, & vita in mari acta, omnia renum affectibus remedia sunt.



## CVRATIO PROFLUVII

feminis, cap. V.

**G**onorrhœa, id est feminis profluviū,  
 quod malorū omniū causa est, haud  
 cunctanter soluendum est, tum propter  
 morbi turpitudinem, tum propter colli-  
 quationis periculum, tum propter suc-  
 cessurorum liberorū procreationis ne-  
 cessitatem. Ac primum quidem quem-  
 admodum in communis fluxus, sanandū est  
 medicamētis adstringētibus partes ve-  
 ficæ propinquas & fluentibus locis, atq;  
 refrigerantibus lumbos, ilia, pudenda,  
 testiculos, ne diu genitura diffluat: dein  
 de rursus vniuersum corpus calfacien-  
 dum, vt excrementa siccentur. adstrin-  
 gunt igitur & macerant, & aboue succi  
 da lina, & vnguinofum rosaceum vn-  
 guentū aut cœnanthinum cū albo vino  
 odorato, sed seorsim calorem excitādo:  
 oleum commune & mel lotum cum eo  
 feruefactum, & sampsuchum, & libano-  
 tum aut conyz: optima est & anethi co-  
 ma, & malo magis rhyte. his autem ad  
 cataplasmata vtitor, ordeī & erui fari-

Bb



nis & irionis seminis. Nitrum quoque.  
mel verò ad omnium conspersionē &  
cōnexionem. talia etiam sunt cataplas-  
mata quaecūque rubefaciunt, & ionthos  
seu varos cient, & fluxionem deriuant,  
& locos tepefaciunt. tale est cataplasma  
viride, & quod ex lauri fructu cōficitur.  
Castoreum quoque frequēter bibendū,  
& de radice halicaccabi quantū drach-  
ma pondo pendet, & mentae decoctum.  
Ex variis medicamentis, quod ex pipere  
geminio conficitur, Symphonis item &  
Philonis antidotum opt. mū. & quod ex  
fera quæ sitichus appellatur, ad potione  
paratur pharmacum, & Bistini antido-  
tus, & quæ ex serpentibus viperis confi-  
citur. Vniuersum autē victus rationi tri-  
buendum, concedendum & credendum  
est, exercitationibus & ambulationibus  
& gestationibus, hæc enim habitum ad  
calorem conuertunt, quo aff. cui est o-  
pus. quòd si temperans sit rerum vene-  
rearum, & frigida lauetur, spes est fo-  
re vt celerrimè homo virilem habitum  
induat.



CVRAT. DIVT. LIB. II. 389

CVRATIO STOMACHI

vitio laborantium,

cap. VI.

**I**N aliis morbis post curationem dicta ad vires & robur corporis, bona concoctio est: stomachi affectibus laborantibus solis hæc vitiosa est. quo nam igitur pacto hæc cōparetur, dicā. Nam gestationum, deambulationū, exercitationum, declamationū, & alimentorum concoctionem adiuuantium quod satis est, prodest quidem ad debellandū stomachi cibos fastidientis vitium: sed id concoquendi longam imbecillitatem tollere nō potest, nec maciem corporis in corpulentiam conuertere: multo verò magis proficiat, ægrotantibus si gratificetur, & puriter omnia faciat, ac cupiditatibus eorū indulgeat medicus in rebus quæ non magnopere lædunt. Est enim id optimum, nisi rerum valde iuuuantium appetitu moueantur. Medicamenta potui dāda sunt, succi, absinthiū, nardinum vnguentum, theriaca, petroselini fructus, & gingiberis & piperis, & fescelios. Hæc ad concoctionem valent,

Bb 3



etiam pectori ad adstringendū imposi-  
ta, nardi, mastichæ, aloæ, acaciæ, & ma-  
lorum cydoneorū succus: ipsæ quoque  
maiorum carnes contusæ cum palmu-  
lis epithema est adstringēs. Quinetiam  
alia quæcunque in Diabete ad sitis se-  
dationē mihi cōmemorata sunt. eadem  
enim & his & illis sitim prouocant: ta-  
meti stomachicis stomachi cōstitutio  
siticulosa minime sit.

### CVRATIO COELIACO-

rum, id est ventriculo labo-  
rantium, cap. VII.

**S**I ventriculus ciborum digerēdorum  
impotens sit, diffuat autem alimentū  
non coctum, non mutatum, crudum, ni-  
hilque ad corporis molem transeat, cœ-  
liacos hos appellamus, refrigerato ni-  
mirum intus innato calore, quo minus  
coquat, & viribus quæ distribuunt ali-  
menta debilitatis. Vētricus igitur pri-  
mum quiete & inedia labores remittat  
oportet. ita enim eō vires recurrunt. Si  
verò multitudo eorum quæ stomachus



CVRAT. DIVT. LIB. II. 290

acceperit subesse videatur, ieiunio nau-  
seis ex aqua vel mulsa vtendum est. ven-  
tricus autem contegendus, & vt ad-  
stringatur, rigād<sup>o</sup> lanis ab oue succidis,  
ac vnguinofo rosaceo vngueto, aut os-  
nanthino, aut melino. optimū quoque  
si & lēt scino: hypocystide etiā aut om-  
phacio: cū his etiam cataplasmata adhi-  
beantur, calida quidē tactu, sed viribus  
adstringentia. Atque si alicubi ad ieco-  
ris vel ventriculi ostentiones aut inflā-  
mationes sint, cucurbitula admota in-  
cidere oportet: & sunt quibus id solum  
sufficiat: vbi verò ceratis ad cicatricem  
vlcera perducta fuerint, & ad duritiem  
peruenerint, eō hirudines bestiæ admo-  
uendæ: deinde epithemata concoctionē  
iuuantia imponenda, quale est quod ex  
seminibus conficitur, si chameleontis ra-  
dicem habeat, optimum est, vbi que lau-  
ri fructus insint, malagma etiā quod vi-  
ride appellatur, & meum quod myste-  
rium, id est archanū est. Ea enim emol-  
liunt & laniant, & calorem cient, visce-  
rāque flatibus euacuant, quibus ad ad-  
stringendū est opus. Caterum & sinapi

Bb 4



limnestis, & euphorbiū, & omnia talia  
quęcunque refrigerationē amoliuntur,  
calorem autē reuocāt. Talia quoque ad  
adstringendū medicamenta potui dan-  
da sunt. primum quidem vsui est arno-  
glossi succus cū aqua myrtis aut cydo-  
niis malis adstricta. optimus quoque a-  
cinus vuæ omphacinæ: vina vehemen-  
ter adstringentia: deinde medicamenta  
quæ ventri medicantur: potiones, quot-  
quot ex gingibere, & pipere, & fructu  
syluestris petrofelini cōficiuntur, quod  
ex viperis feris constans maximam vim  
concretionis habet. Si verò his nihil, aut  
parum proficiatur, vomitibus ex radi-  
culis vtitor. si autem & his albi veratri  
radicem per noctē vnā includas, valen-  
tissima tibi fiat purgatio, tum ad hu-  
mores frigidos purgandos & expellen-  
dos, tum ad calorem restaurandū. Cæ-  
terum & victus ratio vitæque hoc mo-  
do moderate sunt. noctu fomni, inter-  
diu deambulationes, declamationes, ge-  
statio vel in lauris, vel in myrtis, vel in  
thymo. nam in perspiratione ac respira-  
tione ad bene concoquendum medica-



CVRAT. DIVT. LIB. II. 393

menti vis aliqua inest . exercitationes corporis, frictiones, manus gesticulationes halteribus iaciendis, thoracis & ventriculi lassitudines, ante cibos potationes. minime enim ad vires parandas expeditus est panis: his addatur frictio ad roborem usque, deambulationes segne

Capita quę sequuntur verterat Crassus.

DE CVRATIONE MOR-

borum in articulis & coxen-

dice, cap. XII.

carens principio.

alborum & raphanorum plerunq; deinde ad veratrum veniendum est. in his victus ratio aliarum affectionum communis est: & post victus rationem inunctio, lauatio in frigida marina, precipue quidem omnibus articularibus vitis communia medicamenta sunt. nam & podagricis veratrum mirifice, sed in primis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis iam annis inueterauit, vel & a maioribus per successionem descendit, ægrotum ad mortem usque comitatur. Artuum exacerbationibus hoc sanè pa



cto subueniendum est. lanæ ex oue for-  
didæ adhibeantur: irrigationes fiant ex  
rosaceo & vino: nonnullis & spongia ex  
posca profuit. Ad hæc cataplasma fiat,  
panis sumatur cum refrigerantibus, vt  
puta cucurbita & cumere. Accipiat &  
cucurbitula tenuis, & plantago herba,  
& rosarum folia. Necnon & sideritis do-  
lorem sedat cum pane & musco: & sym-  
phyti radix, & pétaphyllos herba, quin-  
quefolium Romani vocant: & marru-  
bium, quod foliis est tenuibus. huius de-  
coctum quidem infusum dolorem le-  
uat. ex ipsa verò herba cum panis micis,  
aut cum ordeï farina cataplasma fiat.  
Malorum quoque citriorum pars non  
apta cibo cum polenta magnopere sub-  
uenit: fici aridi & amygdalæ cum aliqua  
farina. Hæc vtique est refrigerationis  
materia. Et hoc quidem remediorū ge-  
nus aliud aliū iuuat, & idem interdū  
aliū atque aliū. Nonnullis verò ca-  
lescentia remedio sunt: atque idem re-  
medium aliàs alij opitulatur. Peruulga-  
tum est autem & hoc ad dolorem tol-  
lendum proficere. Capram oportet her-



CVRAT. DIVT. LIB. II. 394

ba n iridē ad satietatem depasci : d in-  
de interposito tempore, quantū ad pa-  
bulum in ventriculo conficiendum sa-  
tis sit, capram immolare atq; intra eius  
ventrem in fino pedes ægrotantis oc-  
culere. Demum infinita sunt medica-  
mentis ægrotos nanque sibi ipsis reme-  
dia parare vrgens impellit calamitas.  
Sed medicorum auxilia in propriis li-  
bris conscribentur.

CVRATIO ELEPHAN-  
tis, cap. XIII.

**M**Orbis, quò dissoluantur, maiora ef-  
ferre remedia opus est. Sed quānā me-  
dela excogitari poterit, quæ elephantē  
tam ingēs malum expugnare digna sit?  
neq; enim in parte vna, aut viscere vno  
inhærescit, neque aut intus duntaxat  
labes occulitur, aut extra prorumpit: sed  
& in penetralibus totum hominem oc-  
cupat, & exterius totū amplectitur. Tri-  
ste profectò, & visu terribile spectacu-  
lum. feræ nanque species est. ac vnā cū  
his viuere, vnā cibum capere perinde



atque in pestilentia, formidolosum est: etenim per inspirationis communionē facilis infectio est. Quid igitur quispiā in arte medica inueniat, quod huiusce mali dignum remedium contineat? Verum enimverò omnia conferre simul oportet medicamenta, & victus rationē, & ferramenta, & ignem. Hæcquē si nouo & orienti affectui adhibueris, sanationis spes affulget: sin ad summū suæ creationis ascendat, in visceribusque stabilis sedeat, quando & in faciem inuadit, tunc de ægri salute spes omnino abscissa est. Itaque venas in cubito ambas incidito: incidito & venas in malleolis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fundēdo vbertim sanguini, & recreandis viribus aptior est. nam sanguinem saepe & multum mittere opere præcium est: quippe qui vitij huius alimentum sit. exigua verò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum præbeat. Idcirco quia ratione prauū inquinatūquē detrahatur, atque interim corpori familiare ac bonum procreetur, coniectandum est: quoad alimenti penuria mor-



CVR AT. DIVT. LIB. II. 327

bus prius fatigetur . noua enim esca applicata corpori spatio temporis antiqua obscurat atq; debilitat . Postea medicinam sacram non semel propinato: quin omnia saepius iteranda sunt , & resumptio, & ad priora reditio. Esto & alia medicamentosa in cibis purgatio: sicut antea de curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam promiscuum atq; indiscretum, sed largius ad aluum molendam potui detur . verum quintam aquae partem , quò lac torum dilabatur, atque descendat, adicito. At ieiunos primò ad vomitum celerius ducito, deinde à cibis iterum , postea assumptis raphanis. frequenter autem atque assidue omnia fiant. Veratrum quolibet tempore, sed potius vere atque autumnò diebus alternis exhibeto: atque idè in proximum annum repetatur . Cæterum si morbus inualuerit , potabilia medicamenta , quotquot quis cognouerit , potanda præcipiat. multa enim ac varia adhibere medicamenta est operæ precium. Atqui & ego quotquot mihi cognita sunt, literis mandabo. Cedriæ cyathum



vnū, brassicæ duos miscens dato. Aliud, fideritidis succi cyathus vnus, trifolij cyathus vnus, vini & mellis cyathi duo. Aliud, dentis elephanti ramentorum drachma cū vini Cretici cyathis duobus. Quinetiam viperarum reptilium, ferarum carnes & ipsæ in pastillos conformatae bibuntur. oportet autem & caput & caudam ad quatuor digitorū spatium præcidere, reliquū vsque eò elixare, donec spinæ separentur: carnes verò in pastillos redactas in vmbra frigefacere: qui potioni, quemadmodum & scylla, exhibeantur. Ipsæ quoque viperae in coena opsonio dentur: quas coquere, & condire perinde, ac pisces, opus est. At si medicaminis illius varij ex viperis compositi facultas adsit, id pro omnibus, quandoquidem omnia simul continet, bibendum est. Præterea corpus detergendum est, tumoresque calefaciendi. Alia item medicamenta sunt innumera Celatarum, quos hac tempestate Gallos vocant. Nitrosis quoque illis factatis globis, quibus velamentū sordes expurgant, saponemque vocant, illis inquam, glo-



DEPART. HOM. 398

his corpus in balneo detergere optimū  
est. Et portulaca, & sedum cum aceto be-  
nè facit. Rumicis etiam radicū deco-  
ctum cum sulphure ignem non experto  
summopere deterget. Illud item varium  
ex aleyonio trito, & nitro, & aceti facie  
combusta, & alumine fisso, & sulphure  
vino, & cocto, & iride, & pipere. forsitan  
autem omnia pro singulorum viribus  
miscēda sunt. Aliquibus verò & hoc æ-  
quis portionibus compositū inspergen-  
tes perfricabimus. Faciei tumoribus sar-  
mentorū cinerem alicui ferarū adi-  
pi admiscens illinito, leonis videlicet,  
aut pantheræ, aut vrsi: in his carcas, ani-  
malis, quod Græce χινάλω πικρα vocāt:  
lati è vulp inferem dicas. quod genus  
avis est, si per literas χ & π prima syllaba  
scribitur: aut Laconicū canē significat  
ex vulpe & cane natum, si per π & λ ean-  
de m syllabam scripseris. simile enim in-  
dissimili, quemadmodum simia homi-  
ni, mirificè prodest. Item amniaciaca  
gutta cum aceto, ex plantaginis, aut san-  
guinalis herbæ succo. & hypocistis, &  
lycium. Si carnes lineant, prius, quò lo-



cus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acribus fluctionibus exulceratas partes lenire volueris, fœnigræci aut ordeï cremoris decoctum molle absterforium est : item ex oleis rosaceum, aut lentiscinum . Assiduæ verò lotiones & ad corporis madefactionem, & ad noxiarum humiditatum diffilationem mirè proficiunt. Esca munda esto, boni succi creatrix, concoctu facilis, simplex: & victus ratio prorsus rectè instituta sit in somno & vigilia, in ambulationibus & locis deligendis . Exercitationes adhibeantur, cursus, conuersiones corporis, peræ aut facculi iactus. omnia hæc citra lassitudinem aptè & congruenter intendantur. Esto & vocis emissio spiritus opportuna exercitatio. Vestis esto munda, non modò vt aspectu iucunda sit , sed quoniam etiam sordida cuti mordacia sunt. Ieiunij absinthite vinū potent. Oppidò quàm utilis est & panis ex ordeo, & salsa, mentum tempestiuū, & exiguum quid nialuarum, aut brassicæ semicoctū cum cumini liquamine, In cœna staphyliini radix apponatur, & alica cum vino &



& melle antiquo mixtis: & marina quot  
quot ventrem subducunt, tellinorum  
iuscula, ostrea, erinacei, & ex piscibus  
saxatiles: ex terrestribus ferae lepus, aut  
sus: inter aves perdices omnes, palum-  
bes, columbi, & quaecunque optima in  
illa regione inveniuntur. Inter fructus  
arboreos illi admittantur, quos Græci  
horeos vocant: quod ea parte anni ma-  
turecant: quam iidem græci horā ap-  
pellant. Vina dulcia vinosis meliora.  
Balnea sponte calida, sulphurosa iuuāt.  
vita in aquis diu ducenda est: & mare, &  
navigatio conueniunt. Præterea per ve-  
raturum purgationes fiant. Album quidē  
superiorem ventrem, atrum verò infe-  
riorem purgat. Quin & album veratrū  
non vomitum tantum molitur, sed etiā  
omnium simul purgantium medicamē-  
torum efficacissimum est, non multitu-  
dine & varietate excrementorum: ide-  
nim & affectus ille, qui cholera dicitur,  
præstare solet: non distentionibus & vio-  
lencia in vomendo (ad hoc enim & nau-  
sea & mare validiora sunt) sed potentia  
& qualitate non vitiosa. quippe quæ la-

Cc



borantibus sanitatem reddit per exiguam purgationem, & modicam intentionem. vetustorum præterea morborum omnium firmis radicibus inhaerentium, si cuncta alia medicamina viribus inferiora sint, id vnicum remedium est. siquidem igni facultate per simile est album veratrum: & quod ignis exurens facit, eo plus veratrum interius discurrens operatur: videlicet facilem spirationem ex difficili, ex pallido colore floridum, & ex macie corpulentiam.

Quæ deficiunt quærito quàm prestantissimi medici Aretæi.



**RVFFI EPHESII**  
de corporis humani  
partium appellatio-  
nibus libri tres,

**IUNIO PAVLO CRASSO**  
Patauino interprete.

**Cc 2**



QVAE IN PRIMO LIBRO  
continentur.

Vnde cuiusque artis tradenda initium  
sumendum, cap. i.

Quae prius & quomodo docere auctor  
velit, cap. ii.

Diuisio corporis in maximas partes,  
cap. iii.

De superioribus capitis, & faciei exte-  
rioribus partibus, cap. iiii.

De oculi exterioribus partibus, cap. v.

De faciei infra oculos partibus, cap. vi.

De reliquis faciei partibus, cap. vii.

De ore, in eoque contentis, cap. viii.

De collo, eiusque partibus, cap. ix.

De ala, humero, brachio, & manu, ca. x.

De thorace & eius partibus, cap. xi.

De genitalibus marium, & eorum par-  
tibus, cap. xii.

De foeminarum genitalibus, cap. xiii.

De dorsi ossibus, cap. xiiii.

De reliquis vsque ad inguina partibus,  
cap. xv.

De partibus ab inguinibus vsq; ad ex-  
tremos pedes, cap. xvi.



DE PART. HOM. 405

- De interiorum membrorum appellatio-  
nibus, cap. xvii.  
De capitis tunicis, ossibus ac futuris,  
cap. xviii.  
De quibusdam capitis ossibus, cap. xix.  
De musculis quibusdam, & processibus  
in capite, cap. xx.  
De foraminibus calvariae, cap. xxi.  
De cerebro, membranis, nervis, spinali-  
que medulla. cap. xxii.  
De oculis, cap. xxiii.  
De prima & secunda colli vertebra, osse  
ypsiloides, gula, tonis, aspera arteria,  
guttur, & bronchiis, cap. xxiiii.  
De cordis partibus, membranisque pe-  
ctoris, cap. xxv.  
De glandulosis carunculis, cap. xxvi.  
De ventris inferioris partibus, ca. xxvii.  
De iccore, & in eo contentis, ca. xxviii.  
De liene, renibus, vesica, urinariis, semi-  
nariisque vasculis, cap. xxix.  
De musculis lumborum, cap. xxx.  
De genitalibus foeminarum locis,  
cap. xxxi.  
De testium tunicis, aliisque partibus,  
cap. xxxii.



De venis, cap. xxxiii.

De arteriis, cap. xxxiiii.

De nervis, tendonibus, cartilaginibus,  
membranis, tunicis, adipe, carne, &  
medulla, cap. xxxv.

De humoribus excrementisque corpo-  
ris, cap. xxxvi.

De foetu, & ad eum pertinentibus,  
cap. xxxvii.



# R V F F I E P H E S I I

## de corporis humani

P A R T I V M A P -  
pellationibus

Liber I,

I V N I O P A V L O C R A S S O

Patauino interprete.

V N D E C V I V S Q V E A R T I S  
tradendæ initium sumendum sit,  
cap. I.



Vid in arte citharæ  
pulsatoria primum  
didicisti? Singulas fi  
des pulsare, credo,  
atque nominare.

Quid in gramma-  
tica primum perce-  
pisti? Vnūquodq; elementū cognoscere  
ac nominare. Igitur & alias artes à no-  
minibus docere incipiūt: & ferrarius fa-  
ber, & alutarius cerdo, & carpētarius in

Cc 4



primis ferri nomē, & instrumētī, & aliorum omnium ad artē facientiū nomina tradunt. Quinetiam grauiore artes nōne & ipse à nominibus pari ratione docendi exordium capiunt? Quid enim primū in geometria accepisti? Punctum sanē, & lineam, & planū, & superficiem, & figuram triangulam, & circulum, aliāque id genus, quid nam sunt dignoscere, rectēque appellare. Vis ne igitur & medicinalem facultatem à nominibus exorsus perdiscere? ac primum omnium, vt singulas corporis partes appellare cōueniat, deinde & reliqua quemadmodum sermonis processus, connexiōque requireret agnoscere? Aut tibi satis esse videtur, me ceu mutū quācunque doceri postulas, tibi ostendentem explicare? Mihi verò id non melius esse, tēque ipsum hoc pacto discere, & alterū docere, haud facile esse videtur. Atque de his quidem sic mea fert opinio.

QVAE PRIUS, ET QVO-  
modo docere velit, proponit,  
cap. I I.



DE PART. HOM. 409

**C**Aeterum audiens & in puerum hunc respiciens, memoriae, quae sensui patent, commendato. Ante omnia ut interiora appellanda sint, animal quodpiam homini quam simillimum dissecantes, instruere te conabimur. Nihil enim impediet, tametsi non omnia omnibus similia sint, quominus summam saltem cuiusque doceamus. Verum priscis temporibus in humanis corporibus huiusmodi generosius ostendebant.

DIVISIO CORPORIS

in maximas partes,

cap. III.

**M**aximae corporis partes haec sunt, caput, collum, thorax, manus, & crura. Thoracem autem non solum eam partem quae à iugulis ad praecordia usque pertinet, appellamus: verum etiam totum illud quod intra iugula pudendaque concluditur.

DE SUPERIORIBVS CA-



pitis, & faciei exterioribus partibus,  
cap. IIII.

**C**Aput vocatur quod pilis contegitur  
separatim, & simul cum facie. capil-  
lati autē prior pars synciput, auersa ve-  
rò occiput nominatur. partes à lateri-  
bus syncipitis positæ tempora dicuntur,  
Græcè corsæ & crotaphi. quod autem in  
medio capite est, vbi maximè capilli  
inuoluuntur, verticem vocamus: partem  
sub syncipite, frontem. iuxta tempora  
pilorum exortus iuli Græcè, Latinè la-  
nugo dicuntur. occipitis autem capilli  
promissi crines vocitatur. vltimas fron-  
tis rugas Græci episcenium vocant, no-  
stri supratentorium dixerint: quòd ocu-  
lis attrahimus, quādo nobiscum aliquid  
altius cogitamus, aut veremur. alij verò  
partem sub superciliis carnosam episce-  
nium vocauerunt. At supercilia hirsutæ  
frōtis extremitates sunt: quorum inter-  
stitium mesophryon Græcè, Latinè gla-  
bella, quòd glabrū sit, dicitur. sub super-  
ciliis palpebræ, quas etiā genas vocant,  
altera supra, altera infra sitæ sunt. ab iis  
prodeūtes pili Græcè tarfi & blephari-



DE PART. HOM. 409

des, Latine cilia nominatur. harum extrema, cum nos dormimus, sese contingetia, corone & chelæ hoc est, ungulæ dicuntur. superioris palpebræ superficiem quod superimpedit, cauum: illi autem respondens inferius, subcauum vocant. Id sane & in aqua inter cutem, & alioqui in prauo corporis habitu, & in longinquo hæmorrhoidum effluuiio, & antiqua mulierum menstrua purgatione, nonnunquam etiam inchoantibus lippitudinibus intumescere consuevit. Huiusmodi verò lippitudo mitiores esse videtur: propterea & id genus affectus, quoniam cauæ partis tumor est, Græcè κοιλισμός dicitur. At cauæ superioris inferiorisque palpebræ extremitates à Græcis canthi, à nostris anguli nominantur: alter maior ad nasum vergens, minor alter tempori propinquus.

DE OCULI EXTERIORIBUS partibus, cap. V.

**O**Culi verò quod in medio aspicitur, visio & pupilla nuncupatur. glenam etiam simulacrum in pupilla apparens



vocant . Quod autem inter pupillam  
atque album continuum interiacet, iris  
est: sic utique, quod colore euariet, no-  
minatur : nam modò nigrum , modò  
igneum , modò cesium, modò splendi-  
dum id esse conspiciamus. Corona nigrū  
ambit, & ab albo distinguit: quæ circu-  
lus & copula oculi tunicarum est. Earū  
sanè prima duabus naturis prædita duo  
quoque nomina gerit: cornicularis qui-  
dem in medio, & vsque ad iridem : hæc  
enim eius particula expolitis cornibus  
assimulatur : candida verò est altera  
pars omnis, qualis & aspicitur: nihil me-  
diæ neque natura, neque colore similis.  
ipsi autem vocata epidermis superin-  
cumbit. qua in iuuenibus & senioribus,  
& in affectu , qui chemosis Græcè , vn-  
guis Latinè dicitur, abscedente atq; ela-  
ta , ruffum siue igneum cernitur . Aliæ  
tunicæ qua sint nomenclatura præditæ,  
paulo inferius in animalis dissectione  
explicabitur.

DE FACIE I INFRA OCULI  
partibus, cap. VI.



DEPART. HOM. 413

SVb oculis insurgentia ossa, subocula-  
ria, nonnulli alij hypopia nominant.  
A superciliorū medio interstitio, quod  
glabellam vocari diximus, deorsum ver-  
sus nasus protenditur. cuius foramina  
rhothones, & nares, Atticè quoq; myxæ  
appellantur. sed Hippocrates pituito-  
sum excrementum per ipsas destillans,  
myxam, Latini mucorem vocant, Athe-  
nienſes verò coryzam. cartilagineum  
illud, quod foramina distinguit, nasi in-  
ferſeptum eſt. partes oſſeæ, que vtrinque  
ad malas vergunt, nasi dorſum. extrema  
verò hinc atque inde huiusce oſſei faſti-  
gij pinnae vocatæ ſunt. iſtæ in vehemēti-  
ori ſpiritus difficultate, & alioqui cū vo-  
luerimus, agitantur. carneum autem il-  
lud ante naſi ſeptum in labia deſcendēs  
columna, naſi extremitas, globulusque  
appellatur. at ſub columna in ſuperio-  
ri labro cauitas philtrum Græce vocata  
eſt, quaſi amatorium, ſiue amabile di-  
xeris. ſed totum ſub naſo ſuperioris la-  
bij hyporrhinon Græcis eſt: Latino vo-  
cabulo caret. deinde labia duo, quorum  
extrema Græcè prochila, Latinè prola-



bia dici possunt. qua parte autem committuntur, prosthomion vocant: inferioris labij cauitatem, nympham. Aurium foramen, per quod voces exaudimus, auditum appellarunt. partem pendulam Latini fibram, Græci lobō vocāt. quam etiam solam auris particulam nomen habere, ceteras vero nomine carere dixit Aristoteles. ceterū medici illis quoque nomina imposuere, pinnam quidem supremam partem latam atq; declinē appellauerunt: helicem totū illud, quod deinde aurium extremā orā ambit: anthelicem id quod in medio cauitatem extollit. concham post anthelicem cauum: oppositam verō conchæ eminentiam iuxta temporis fines tragus, Latine hircum dixeris: helici finem, qui subbreuis est, antilobida vocant.

DE RELIQUIS FACIEI  
partibus, cap. VII.

**T**Ota capitis prior pars facies dicitur. Male sub oculis faciei eminetiæ sunt



DE PART. HOM. 413

ubi pudoris sedes est: maximèque ibi rubor ostenditur. post mala, autem maxillæ habentur: quarum altera superior, altera inferior est, inferiorisque maxillæ acies mentum est. sub eadem inferiore maxilla carnosæ pars leucania Græcè dicitur. sed nonnulli hanc quidem carnosam partem mentum, leucaniam verò cauum iugulo proximum appellauerunt. Barbæ prima sub temporibus germinatio iulus à Græcis, à nostris lanugo dicta est. primus eius in superiori labro exortus Græcè progonium: Latine probarbium, si fingere liceat, dicitur: qui pili postea adacti mystaces appellantur. sed in summo mento pili pappus, sub mento autem hypena Græcis vocibus dicuntur: Latina nomina deficient.

DE ORE, IN EOQUE  
contentis, cap. VIII.

**P**rima labiorum diuisura, & interior usque ad fauces inanitas os est. in ore



autem alia sunt, & dentes, quos nonnulli cranteras appellant. horum primores quatuor incisores, caninos autem sequentes vtrinque singulos: molares verò, & maxillares post caninos vtraque ex parte quinos, vocare consueuimus: sophronisteras, hoc est moderatores, horum intimos atque vltimos Græci vocant: quod eo tempore quo moderatos temperantesque esse oportet, oriri incipiunt. Ab vtraque parte vnus est, genuinos Latini appellant. totidem & superioris maxillæ, eademque nomina sortiti sunt dentes. Maxillarum colligatio habena, menses summitates latæ molarium, mortariola & maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, appellantur. Gingivæ circa radices dentium carunculæ sunt. Linguae radix, vnde ipsa exoritur, nominatur. pars eius musculosa ore contenta lingua est: ceruix, quæ sequitur. parasysra autem, quæ ab vtroque lingue latere sunt, Græci nominant: hypoglossida partem lingue inferiorem, epiglossida verò, quod intimum est gutturi operculum quoddam impositum: ne cum de-

horamus,



noramus, quippiam in pulmones irruat: sed, cum spiritus ducitur, ne transeuntem aerē impediat, sublimis attollitur. Cœlum verò, & palatum concava est superioris maxillæ pars. Columna & gurgulio quidam ex palato processus, quem Aristoteles vuiferum nominavit: quoniā ea parte inflaminata vuæ quiddam simile pendere videtur. Vuam enim nō partem, sed affectum nominari oportet. Fauces omnis ea capacitas quam inter deuorandum dilatamus, vocata est. propterea & Homerus dixit, Faucibus erupit vinūque humanāque membra. Neque enim ex arteria aspera, & pulmone cibum potūque Cyclops euomit. id enim mirum in modum rude, fatuūque fuisset. Paristhmia dicuntur, & antiades, & mala, Latine tonsillæ, carnosæ quædam glandulosæque partes vtrunque à lateribus faucium positæ. Hæ numero quatuor sunt, duæ in summo gutture vtrunque, reliquæ inferius locatæ.



## DE COLLO, EIVSQUE PARTIBUS, cap. ix.

**I** Nisi a caput est collum, quod & ceruicem vocant. Hypodiridis Græco vocabulo est in priori parte colli postremum: in priori item colli parte bronchus est, & aspera arteria, per quam spiritus ducitur. Bronchi summitas guttur est. At posteriore colli parte tendones sunt. iugulis proximum cauum Homerus leucaniam vocauit: sed medici anticardio, quasi cordi oppositum, & iugulationem appellant. Quæ autem à tendonibus ad humeros pertinent, epomidas vocant. Humerus verò brachij caput est, quod lato scapularum ossi inseritur, & cum toto etiam articulo copulatur. At humeri acetabulum est lat. scapularum ossis cauitas. lata scapularum ossa à Græcis omoplatæ vocata ea sunt, quæ tergo incumbunt: quorum intermedia eminentiæ ipsorum dorsum dicitur. Acromion iuguli, scapularumque ossis copula est. Eudemus verò ossiculum perexiguum esse dixit acromio. Claues, quæ & ligula



DE PART. HOM. 419

dicuntur, sub imo collo ossa sunt cū pectoris osse commissa, humeros scapula que, ne in pectus cadant, vt aliis contingit animalibus, prohibentia. nam cetera animalia iugulis priuata sunt. quocirca & latissimi pectoris homo est.

DE ALA, HUMERO, BRACHIO, & manu,  
cap. x.

**A**La sub humeri articulo cauitas est, in quam sæpe humerus luxatione delabitur. Malam verò appellare haud Græci sermonis est. aliquid autē sub alacclantem ferre, sub mala habere dicunt. Humerus illud etiam à Latinis dicitur, quod exit ab humero, sed à Græcis brachium. Huius apud humerum rotunditas caput humeri est. Interior iuxta cubitum excessus, quem nonnullos imperitè processum autumare dixit Hippocrates, & ipse alterum humeri caput est. post humerum totus articulus, acutumque illud, cui reclinati incumbimus, ancon à quibusdam, ab

Dd 2



aliis olecranon vocatur. Dorsus autem Siciliam incolentes, cubitum, ut nunc apud Latinos in usu est, appellat. Quin Epicharm<sup>9</sup> cubito ferire *κνβίξεν*, hoc est cubitiffare, verbum è verbo transfe-  
rendo, appellat. osiū verò brachij quod subicitur cubitus, supra positum radius est. hæc ad brachiale protenduntur. post quod lata pars & compacta, palma Latine, Græcè metacarpion, tarsusque nominatur. sequuntur digiti. Manus totum illud est quod ab humero pendet, & extremum quo apprehendimus. Ex digitis magnus pollëxque est ab alijs summo-  
tus: alter index inter quatuor primus. tertius medius vocatur, quartus anula-  
ris, ultimus parvus. ipsorum ossa scuti-  
culæ, & phalanges, & internodia. primi articuli procondyli Græco vocabulo, (Latino enim carent) medij, condyli: postremi, metacondyli. vnguium in-  
tia, radices vnguium vocantur. internæ digitorum summitates, acini & verti-  
ces. carnosæ pollicis pars sub manus ca-  
uo insurgens, stethos Græcè nomina-  
tur, quod apud Latinos pectus sonat. spa



DE PART. HOM. 421

tium, quod inter indicem, pollicemque intercedit, carnosumque est, sub quo manus in cauum subsidet, thenar dicunt: hypothenar verò, quod sub quatuor digitis est. sed omnem manus interiorem latitudinē thenar Hippocrates vocasse visus est: id apud Latinos vola significat.

DE THORACE, ET EIVS  
partibus, cap. XI.

**A** Iugulis pectus in priore parte est: medium autem, in quod costæ subeunt, sternon vocant Græci, Latini os pectoris. ab auersa colli parte ad metaphrenon vocatum usque; tergum est. Metaphrenon inter tergum lumbosque, ubi renes adhærescunt, locatum est. Lumbi verò dorsi vltima pars sunt. carneæ in pectore eminentiæ, mammae, atque ubera vocantur. mammae extrema pars papilla: primum verò in pubescendo incrementum, faba dicitur, totum autem tumorem Græci ascoma vocant: Latine utrem, sive vber dicitur. sed in mulieribus magis propriè. Latus, illud totum

Dd 3



quod sub ala est, appellatur. ossa verò, costæ: inter ipsas spatia, intercostalia nominantur. Spuriæ costæ sunt, quæ ad pectorale os non perueniunt. Sub pectore cauum, ventriculi os dicitur: quod alij procardion, quasi Latinè præcordium, nonnulli verò cor appellarunt: doloresq; ibi orientes, cordis morsus, cordisq; dolores esse dixerunt. Spuriarum costarum extremitates cartilaginee sunt. Musculosæ autē partes sub cartilaginibus colloatae, hypochondria Græcè, ac si dicas subcartilaginei, Latinè præcordia à quibusdam vocantur. Alius ac venter deinceps locatur. Epigastrium Græcè super ventrem posita cutis appellatur. Eius media cauitas umbilicus est, venarum, per quas infans alitur, segmentum. umbilici pars media, acromphalon à Græcis vocatur: cutis umbilicum ambiens, quoniam corrugata senectutem significat, vetula appellatur. sub umbilico abdomen est, & aqualiculus. huic continua usque ad pudenda pars pecten atque pubes dicitur, alij ephebeon vocant.



DE GENITALIBVS MA  
riū, & eorū partibus, cap. XII.

**G**enitalium porrò membrorum, quæ  
in maribus sunt, propendens particu  
la colis, ac stema est: quæ autem nō pen  
det, sedimentum, collumque vesicæ. li  
neam per medium discurrentem apud  
Græcos alij tramida, alij orrhon appel  
larunt. colis extremitas glans est. cutis  
eam tegens præputium: præputiique ex  
tremum, summum præputij. cauernula  
verò, per quam semen, urinæque profun  
ditur, vrethra urinariumq; iter nomina  
tur. Vretera autem ne dicito: vreteres  
enim alij sunt, per quos scilicet à renib⁹  
in vesicam vrina delabitur. Scrotum ea  
cutis est, qua gemini inuoluuntur. Ge  
minos autem, aut testes appellare nihil  
interest. Geminorum quod supra est, ca  
put, quod infra, fundū vocatur. pars scro  
ti laxior laccopedon Græcè, à quibusdā  
lachichadaron, ab Atheniensibus laecō  
schea nominatur: inter scrotum & sedi  
mentum, & femur locum plichada vo  
cant. Et transire Græci *σπυλίων*, &



id quod est circum, amphiplx enun-  
ciant. Sophocles verò & in Draconibus  
hoc verbo vtitur dicens, Cardinem cir-  
cum comprehendentem, perinde ac si  
dixisset, circumplexum cardinem.

DE MULIEBRIBVS GENI-  
talibus, cap. XIII.

**M**uliebris autem pudendi quod supra  
est, pecten dicimus. id triangulum  
est, & imi ventris terminus. ab aliis epi-  
sion appellatur. pudendi rima schisma à  
Græcis dicitur, scissuram Latine inter-  
pretamur. masculosa in medio carun-  
cula nympa & myrton, ab aliquibus  
hypodermis, ab aliis clitoris nomina-  
tur: lasciuéque eam tractare κλιτορίζειν  
dicunt. Myrtochilas verò vtrunque po-  
sita carnosâ corpora. ceterum hæc Eu-  
ripho & cremnos, id est rupes vocat.  
Sed nostræ ætatis medici myrtochilas  
pterigomata (quasi alas dixeris) appel-  
lant, myrton verò nympam.

DE DORSI OSSIBVS,  
cap. XIII.



DE PART. HOM. 425

**D**orsi ossa vertebræ sunt, quas etiam  
Homerus astragalos, id est, talos vo-  
cat. tota autem vertebrarum compago  
spinam constituit. Extremū lumborum  
os sacrum est: id ab aliquibus etiam hy-  
pospondylon, quod subvertebrum La-  
tinè verteris, dicitur. Eius vltimum of-  
ficulum coccyx, id est cuculus est.

DE RELIQUIS VSQVE AD  
inguina partibus, cap. xv.

**S**ub costis molles partes à Græcis la-  
paræ & ceneones, à Latinis Ilia vocā-  
tur. Deinde ilium ossa, quorum excava-  
ta capita heminae & acetabula. Clunes  
autem ac sedilia post lumbos carnosæ  
partes: quoniam illis sedendo nitimur,  
ab aliis nates dictæ sunt. Sub quib⁹ hypo-  
glutides id est subnatales vocatæ iacēt.

DE PARTIBVS AB INGV-  
nibus vsque ad extremos pedes,  
cap. xvi.

**I**nguina fœmorum priores partes sunt  
prope pubem posita. neruus autem ad



acetabulum pertinēs, ac totus articulus  
coxendix dicitur. Fœm. rû internæ par  
tes parameria Græcis, fœmina Latinis  
sunt. Inter fœmina autem loca, mesome  
ria Græce, interfœminia Latinè dicitur.  
Musculi genibus inhaerentes epiguni  
des, quasi geniculares dixeris, vocantur.  
ossi autem super genu posito epigona  
tis Græca appellatio, Latina, patella est:  
Hippocrates verò epimylida vocavit.  
Genu articulus est fœmur cruri cōmit  
tens. Poples posterior pars est, in quam  
genu inflectimus. Gastrocnemia Græco  
nomine magnus musculus est, Latinè  
sura: unde latus nervus oriēs ad calcem  
tendo factus adhærescit. Ossiū verò cru  
ris quod posterius est, sura quoq; dici po  
test: prius autem, tibia. Sed Herophilus  
suram radium etiam appellavit. vtrius  
que ossis extrema pedi inserta malleoli  
sunt. Tali verò non recte vocantur. si  
quidem & humanus pes talum sub mal  
leolo abditum, non conspicuum habet.  
Calx postremum pedis rotundum est.  
Planta & tarsus pars prior & ampla est.  
Stethos verò id est Latinè pectus, pars



DE PART. HOM. 417

inferior post cauum, vnde nascuntur digiti, vocatur. istos autem perinde, vt manus digitos, appellare, aliaque manuum digitis communia recensere, nihil est quod impediat.

DE INTERIORVM MEM-  
brorũ appellationibus, cap. xvii.

Igitur quæ oculis aperta sunt, ô fili, subiectaq; his ossa in hunc modum nominare decens est. Modò interiora corporis membra simiam dissecantes propriis nominibus illustrare tentabimus, quandoquidem ipsa ossibus, musculis, extis, arteriis, venis, nervis ad naturã hominis proximè accedit: secundo alia multifida: tertio ex bisulcis vtrinq; dentata. Non vtrinq; dentata, ac solidipeda longissima ab hominis similitudine sumnota sunt. Quod si aliquid de membris interioribus exteriora tradentes memorauimus, idem bis repetere ulterius opus non fuerit.

DE CAPITIS TVNICIS, OSSIBUS, ac suturis, cap. xviii.



**A** Spice itaque sub caluarię cute tunicam. hanc pericranion, quod cranium, hoc est caluariam obuoluat, Gręci vocant. Quam verò alia ossa ambiētem tunicam videris, hanc perioftion, Latinè circumossalem verbum verbo reddens appellato. qua ossa caluarię cōmittuntur, futurę sunt: quę duarum ferarum compagem imitantur. Earum vna quidem rotunda est, synciputque circuncidit: altera occiput: tertia medium verticem diducit, quibusdā etiam hæc syncipitis futuram transiens, frontemq; ipsam secans, inter supercilia terminatur. binę alię in temporum ossibus in squammarum modum totis oris paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. ipsis quidem vetusta nomina defunt, sed nuper à quibusdam AEgyptiis medicis Gręcam linguam male doctis imposita sunt: syncipitis futuram coronariam, occipitis lambdoide, id est lābda Gręce literę similē, mediam verò coniunge tem appellantibus. temporaneas etiam futuras lepidoides à squammarum



DE PART. HOM. 429

similitudine vocauerunt. iidem & aliorum ossium partibus ab antiquis innominatis nomina indidere: quæ ego, ut alius nostri seculi medicis innotescant, non prætermittenda iudicaui.

DE QVIBVSDAM CAPITIS  
ossibus, cap. xix.

**I**Nter caluariae ossa meditullium diploen nominat. vbi verò nasi initium est, crebra ibi foramina ithmoide, hoc est cribri speciem referentia, vocantur, per ea indubiè sternutamentum, mucusque propellitur. Nonnulli & hac parte nos in cerebrum spiritum attrahere confirmant. Proxima auribus ossa ob firmitudinem lapidea nomen habent. ab utroque enim latere singula ossa dura, subalbidaque sunt, magnitudine caput maximi manus digiti æquantia, per quæ auditoria itinera feruantur. Alij proclives occipitij processus lapideos appellant, idque non rectè. inanes enim, & cauernosi, & minimè solidi nomini non respondent. Ab auditoriis autem mea-



tibus ad malas pertinentes processus iugalia ossa nuncupantur.

DE MUSCULIS QVIBVS-  
dam, & processibus in ca-  
pite, cap. xx.

**M**usculos caua temporum replentes, temporaneos: qui inferiorem maxillam amplectuntur, maneres vocat. Tenuis illi, & oblongi, deorsumque versus fauces vergentes processus, stiloides à columnæ similitudine dicti sunt. Eundem autem ipsos gallorum rostris assimulat, ac sine appellatione relinquit.

DE FORAMINIBVS CAL-  
uariæ, cap. xxi.

**F**oramina permulta caluariam excavant: quæ omnia duobus exceptis, quæ cæca appellantur, nomine vacant. inter se autem medici altercantur, vtra nam hoc nomine appellanda sint: num illa quæ propè maximum caluariæ foramen adiacet, per quod spinæ medulla in ver-



tebras delabatur: an illa quæ propè auditorias cauernas, & paulò prius iuxta maxillæ articulos sunt. Sed neque illa, neque hæc adeo cæca sunt, quin ea in magnum spinalis medullæ cauum peruadant, hæc sub foramina cribrum representantia subeant. ac per ipsa omnia nerui transire conspiciuntur, de quibus in diuisionibus sermo habebitur. verum ideo ipsi cæca dixisse visi sunt, quòd nō in rectum excauata esse cernantur.

# DE CEREBRO, MEMBRANIS, neruis, spinalique medulla, cap. xxii.

**I**Ntra caluariam cerebrum continetur. id membranæ circunvolunt, altera crassior robustiorque ossi proxima: tenuior altera, & firma quidem, sed priore minus, quæ cerebrum contingit. Summa cerebri pars varicosa appellatur: inferior atque posterior basis: à basi oriens processus parencephalis Græcè, Latine cerebellum. Ipsius cauernæ cerebri ventriculi: ventriculos



interius obuoluens tunica choroides, hoc est secundis similis, cognominatur. Herophilus autem & membranam choroides, id est secundis similem, appellat, Germina à cerebro enascentia nervi sensorij electorijque sunt: per quos sensus, & voluntaria motio fit, omnisque corporis actio perficitur. horum autem nervorum quidam à spinali medulla, & ex ipsam cingente membrana expullulāt. Dorsalem verò, spinalēque omnem pariter per vertebrae defluentem medullam nominant.

# DE OCVLIS, cap. xxiii.

**C**uli tunicarum primam inter extrema, conspicuaque membra cornicularem superius nominauimus, secunda rhagoides atque choroides Graecis vocabulis dicitur. qua parte corniculi subiicitur: rhagoides, quod exterius laeuore, interius aspritudine vuae acino, quē Graeci rhaga dicūt, sit persimilis. qua verò albā tunicā subit, choroides vocatur:



DE PART. HOM. 433

tur: quoniam venulis referta secundas  
quas vocant, foetui circumdatas repre-  
sentat. Deinde tertia humorem à vitri  
similitudine hyaloidea vocatum conti-  
net. hæc antiquo vocabulo propter te-  
nuitatem arachnoides appellata est: La-  
tinè aranealem dicere auserim. at quoniã  
Herophilus eam reti contracto assimu-  
lat, nonnulli & reticularem: alij ab inclu-  
so humore, qui vitri gerit similitudinẽ,  
hyaloidea nominarunt. Quarta mem-  
branula guttam quandam humoris cry-  
stalloidea nominatam includit. hæc an-  
tiquitus nomine caruit, à posteris lenti-  
cularis ob figuram, crystalloides ab  
contento humore cognominata est.

DE PRIMA ET SECVN-

da colli vertebra, osse ypsiloide, gu-  
la, tonis, aspera arteria, guttu-  
re, & bronchiis,  
cap. XXIII.

**P**rimam colli vertebra dentem ap-  
pellare mihi videtur Hippocrates. Sub  
tonillis ossiculum gutturis caput con-  
Ee



tinēs quidam à figura ypsiloides appellau-  
 luerunt, quod Ypsilo græco elemento  
 sit per simile. Cæterum Herophil<sup>o</sup>, quo-  
 niam tonsillis assideat, assessorem vo-  
 cat. Secundæ vertebre processus sursum,  
 ac prorsum versus spectans, pyrinoides  
 ab oliuæ nuclei similitudine dictus est.  
 Iter illud, per quod cibi potionésque in  
 ventriculum descendunt, Græcè stoma-  
 chus, & œsophagus, Latinè gula est. Ner-  
 ui ab utroque eius latere, toni, cæterá-  
 que sensoria, atque fibrosa pariter toni  
 dicuntur, tenores in Latinum vertere li-  
 ceat. asperæ arteriæ summum guttur  
 est. anuli ad eius plexum creati, bron-  
 chia, cauernæ, & aortæ nominantur.

## DE CORDIS PARTIBVS,

membranisque pectoris,

cap. xxv.

**C**Aloris vitæ, arteriarumque motus  
 initium cor est. eius summa pars ca-  
 put dicitur, infima & acuta fundum. ca-  
 uitates ventriculi, crassior & læuis ar-  
 teriosus est, tenuior & dexter venosus,



DE PART. HOM. 435

laevo: capacioꝛ. ab vtroque autem capi-  
tis latere ceu alæ prominentes, cauæ.  
molles, & ad totius cordis motum agi-  
tabiles, cordis auriculæ sunt. Cor cir-  
cumplexæ membranæ pericardios no-  
men inditum est. Ex membranis pecto-  
ris quæ ipsam in duas diducunt partes,  
intersepientes appellantur: quæ costas  
interius vestiunt, succingentes. Mem-  
brana, quæ pectoris viscera ab inferio-  
ribus disiungit, transuersum septum, &  
phrenes.

DE GLANDVLOSIS CA-  
runculis, cap. xxvi.

**E**X glandulosarum carniū genere,  
quæ adenas Græci vocant, (mul-  
tæ autem sunt,) aliquæ in collo, non-  
nullæ sub alis, quædam in inguinibus,  
aliæ in mesaræo vocato reperiuntur.  
Carnes quædam leniter subpingues ac  
fragiles sunt. inter has & vocatus thy-  
mus numeratur: qui in regione capitis  
cordis locat<sup>9</sup> est, septimæ colli vertebræ  
insidens, asperæq; arteriæ extremo, quæ cū

Ee 2



pulmone committitur, adhærescens. non in omnibus tamen inuentus est.

DE VENTRIS INFERIORIS  
partibus, cap. XXVII.

**S**ub transuerso septo venter est: cuius summa pars, primæque ventriculi nomen habet. deinde primus intestini exortus hostiarius Latinè, seu ianitor, Græcè pyloros est. postea ieinum intestinū semper alimento priuatū: vnde ipsi quoque vocabulum fuit. isti continuum gracile intestinum est. Ex gracili biceps prodit exortus. vocatur autem altera eius pars cœcum intestinum, quoniam reuera cœcum est: altera colon Græcè, & venter inferior, & laxum intestinum à Latinis. id Homerus & niēram appellat. Est autem totum intestinorum vinculum ac firmamentum, quod mesenterio, ac mesaræon Græci vocant. Aræam verò & venterem, & omne intestinum vetustissimi Græci appellabant, ex quo adhuc vsque tempora hoc nomen mesaræon deriuatum est, Latini lactes appellasse videntur.



tur. Post grande intestinum colon appellatum rectum est iuxta sedem ac principem. Quod ex orbiculato ventriculi fundo egerminat, ipsumque & aliquam cæterorum intestinorum partem velat, epiploon Græci, quasi supernauigans, omētum Latini vocant. A renibus exoriens membrana, omnibusque prætenta intestinis peritonæos est. At propè intestini primum exortum posita caro præpinguis, glandulisque interstincta, pancreas vocata est.

## DE IECORE, ET IN EO

contentis, cap. XXVIII.

**A** Dextra ventriculi iecur est. Iecoris autem pars transuersum septum, peritonæumque attingens conuexa, quæ infra ventriculo inhærescit, caua dicitur. Sub maxima eius fibra bilis vasculum situm est, cuius media & angusta particula ceruix est, infima fundum. iecoris porta vena est, per quam alimentum illabatur. Quæ in sacrificiis autem aruspices portas, mensam, gladium, & vnguem appell-

Ee 3



lant, in homine quoque, sed obscura  
atque incerta reperiuntur, ad nullum-  
que medicinæ profectum necessariò no-  
minantur.

DE LIFNE, RENIBVS, VE-  
fica, vrinariis, seminariisque vascu-  
lis, cap. xxix.

**V**entriculo à sinistra lienis incumbit,  
cuius crassissima summâque, pars ca-  
put est. propè vltimas autem costas re-  
nes duo : ex quibus duo vrinæ ductus  
vreteres Græcè appellati vesicam intrā-  
tes prodeunt, Vesica verò conceptacu-  
lum est, in quod vrina è renibus per vre-  
teres delabitur: à vesica est ceruix, sedi-  
mentum, tramis, & reliqua commemo-  
rata superius. At seminaria vascula qua-  
tuor sunt, duo varicosa, duo glândulosa:  
quæ genitales etiam venæ vocatæ sunt.  
varicosorū partes illæ quæ testibus ad-  
iacent, assessores dicuntur. Quidam ve-  
rò omnia assessores appellari nihil la-  
borant. Caterum an hæc eadem in fœmi-  
nis perinde vt in marib⁹, cōstituta sunt,



DE PART. HOM. 439

contemplandum est. Foeminas varicosis  
 asessoribus carere Herophilus planè  
 existimat: nos verò in pecudis vtero è  
 testibus enata vascula, atque vtrinque  
 varicis instar reuoluta conspeximus. hæc  
 autem in vteri cauum perforata subi-  
 bant: è quibus mucosus quidam humor,  
 si quis exprimeret, emanabat, magnaque  
 erat spes hos seminarios esse canales, &  
 eorum generis qui varicosi nuncupan-  
 tur. id autem vt se habeat, dissecciones  
 seorsum declarabunt.

DE MVSCVLIS LVMBO-

rum, cap. xxx.

**I**Ntra lumbos musculi psoæ Græco vo-  
 cabulo nominantur: qui soli etiam in  
 dorso lumbis agnati sunt. Istos aliqui  
 vterales neruos, alij vulpes cognomi-  
 nant, atq; in libro Cnidiarum senten-  
 tiarū nomen istud scriptum est. Si renū  
 autem morbus vexat, notæ hæ sunt, si lo-  
 tium crassum purulentūque sit, si do-  
 lor lumbos, ilia, inguina sumenque tor-  
 queat, tū verò & vulpes male habet. Vn-  
 de iam constat, quanti ista scire intersit:

Ee 4



quò ea quæ sic cognominatur, agnoscas. Clitharchus exteriores dorsi musculos psoas, vterales nervos, ac vulpes appellari falso opinatur.

DE GENITALIBVS FOE-  
minarum locis, cap. XXXI.

**G**enitale autem mulieris membrum Græcè metra & hystera, Latine vter<sup>9</sup> vuluâque vocatur. Hippocrates & Delphyn & geniturâ dicit. Eius sursum versus utrinque processus cornua & cirri sunt ipsam exterius sustinentia vasa. medium atque supremum fundum est. que utrinque sunt, humeri: eius extremitas ceruix, atque collû. colli hostium primus meatus; Hippocrates Græcè amphidion à rotundi ferri, quò præfiguntur aratra, similitudine vocat. deinde canum, quod sequitur, multis appellationibus exprimitur. muliebris enim finus dicitur, muliebres loci, vterus, ac vulua. Sed totum genitale cum exterioribus pudendum, obsceniorique vocabulo cunnus.



DE PART. HOM.

448

DE TESTIVM TVNICIS,

aliisque partibus,

cap. XXXII.

**A**T circa testes tunicae sunt Latinis carentes nominibus à Græcis autē erythroïdes vna, artos altera nominatur. nervus quoque cum arteria concauus ad testem pertuenit, qui suspensor à nostris dici potest: cremastera Græci nuncupant. venulae pariter ad testes, vnde nutriuntur: hæque testium altrices nominantur.

DE VENIS,

cap. XXXIII.

**A**Liarum quoque venarum nomina, (vt semel dicam,) hæc sunt. si gracile tunicam habent, sanguineque cōplentur, venae sunt. omnes verò magnae venae vētres appellantur. postea inter medicos vsus obtinuit, vt ea vena quæ à iecore in renes propagines mittit, caua diceretur. in ea Praxagoras initium esse febriliū affirmavit: solamque eam cauam ipse



dominavit. Ceterum alij & eam quę sur-  
sum in cor per transversum discrimen  
evadit, alij & hanc, & priorem vnico vo-  
cabulo hepatitin, (Lati è iecorariam di-  
xeris,) vocitant. à liene exeuntem sple-  
nitin, id est lienariam. Ceterum non  
quemadmodum in iecore, ita & in lie-  
ne sursum versus, deorsumque in fini-  
stra parte discurrens vlla vena reperi-  
tur. qui verò id asserunt, impudenter me-  
tiuntur: quandoquidem venulæ in lie-  
nem pertinentes & graciles sunt, & ibi-  
dem in liene finiuntur. Philistio Italus  
medicus pro Dorienſium eam partē in-  
colentium more, quasdam venas quę  
per tempora in caput ascendunt, aquilas  
vocat: venas à corde illico nascentes, dra-  
contida Hippocrates nominat. Hero-  
philus venam crassissimam grandissi-  
mamque ex corde pulmones petentem  
arterialem appellavit. in pulmonibus  
enim contra atque in aliis res habet. nā  
veræ in his validæ sunt, proximęque ad  
arteriarum naturam accedunt: arteriæ  
contra imbecillæ, venarumq; naturam  
sapiunt. Omnium autem quos nouerim,



# DE PART. HOM. 443

primus Dionysius Oxymachi efflorescē-  
tiam, Græcè epanthismon nomen no-  
uum adinuenit. aitq; Eudemus efflore-  
scētiam venam appellari. Sed mihi qui-  
dem Dionysius rem venæ similem efflo-  
rescentiam, neque idem venam atque ef-  
florescentiam, sed quoddam aliud ad-  
uentitium sanguinis receptaculum vo-  
care visus est: idque ipse ita esse testatus  
est, eodem loco sæpius venam, efflore-  
scentiam, arteriāque inculans, ac re-  
petens. neque enim, si rem eandem ve-  
nam efflorescentiamque putaret, ita vn-  
quam locutus esset. nam etsi nihil aliud  
efflorescentia, quam vena est, nihilomi-  
nus ipse aliter sensit, atque appellauit.

## DE ARTERIIS, cap. XXXIII.

**A**Rteriis præterea vetustissimi Græci  
venæ nomen imposuerunt: cumque  
venas micare dicebant, arterias intelli-  
gebant. arteriarum enim micare, seu pal-  
pitare munus est. Eas etiam aortas, &  
spirabilia vasa, & cauernas, & inanitates



& nervos appellarunt. Aortam verò eam præcipue Aristoteles vocat, quæ per dorsum omnium maxima fertur. hanc crassam Praxagoras appellare consuevit. Cañas autem per collum subeuntes carotidas, id est somniferas antiqui nominarunt: quoniam compressæ hominem sopore grauabant, vocemque adimebant. Caterum nostro sæculo nō arteriarum, sed nervorum sensoriorum propè iacentiū id vitium esse compertum est. quare si nomen permutare volueris, nihil peccati admiseris.

DE NERVIS TENDONIBUS, cartilaginibus, membranis, tunicis, adipe, carne, atque medulla,  
cap. XXXV.

Nervi à cerebro, spinæq; medulla procedentes actiui, sensorij, electiui, atque toni: qui circa artus sunt, copulatiui dicuntur: crassæ autem ex occipitio propagines, quæque ad calcem è musculo nascentes feruntur, tendonis vocabulū habent. Cartilagines sunt, in quas ossa de-



generant, neruis duriores. Membranæ tenuia sunt velamenta: tunica, crassiora. Adeps, pinguisima est alimenti concretio. Caro autem in visceribus illud est, quod inter vascula concretum reperitur, subtegmen quoddam, ac veluti receptaculorum texturæ factum: quò inania eius spatia compleantur. In muscularis caro pars fibrosa ac firma est, & quæ in vlceribus, ossiumque cauis recens cōcrescit. Medulla verò in dorso dorsalis, in vertebris spinalis, has etiam ambiens membranula spinalis dicitur. Medulla intra caluam contenta cerebrum est: sed in aliis ossibus ossalis vocatur: siue in magnis insit cauis, vt in femore atq; humero, siue in angustis foraminibus, quas serangas, id est cauernas, vocant, vt in costis ac iugulis.

DE HUMORIBVS, EXCREMENTISQUE CORPORIS,  
cap. xxxvi.

Sanguis calidissimus est, flauissimūq; succus. Pituita album crassum, ac sub-



falsum excrementum est: quod cum re-  
ficcat, nigrescit. Bilis flaua amarū est,  
ac flauum excrementum: porra ea acris  
est, atque subuiriilis: æruginosa verò est  
valde mera, atque syncera. Atra bilis au-  
tem sanguinis crassamentum est. Alij  
nigrum sanguinem atram esse bilem as-  
seuerant, & reliqua excrementa huiusmo-  
di sunt: saliuā quidem oris est humidi-  
tas. Mucus falsum est cerebri purgamen-  
tum. Sudor est per omne corpus effusa  
humiditas. Vrīna est nitrosus humor in  
vesicā delabens. Flatus est in intesti-  
nis superuacuus spiritus. Cypselis sunt  
aurium sordes, quas cerumina, aut mar-  
morata veteres Latini appellitabāt. Mé-  
ses in mulieribus sunt menstrua per vul-  
uā sanguinis excrementa: quæ cum alba  
sunt, non menses ultra, sed profluuiū no-  
minatur. Lac est in mammis alimentī cō-  
coctio. Semē, Græcè sperma, thora, & go-  
nos, hoc est genitura idem significant.  
id verò est spiritus simul, atque alimentī  
genitalis in assessoribus concoctio. Pra-  
xagoras peculiari quodam modo suc-  
cos nominauit, dulcem, temperatū, &



DE PART. HOM. 447

vitreum, hos à pituitę specie sic vocauit:  
item acidum, nitrosum, falsum, & ama-  
rum. hos ita, vt gustatus iudicat, appellauit.  
alios præterea porraceum: quidem ex colore, vitellinum, verò ex crassitudine:  
alios quoque abrasorios, quoniam abrasuram parant alios stagnantes, quòd in venis inhæreant, neque in carnem fubeant,  
quia tenues, intra venasque absorpti quiescunt. in summa, omne liquidum  
Praxagoras chymon appellat. At Mnesitheus quod liquidum est, chylon, id est succum nominat: sed gustatilem  
qualitatem, siue in arido, siue in liquido positam, chymon, id est saporem vocat.  
Calorem autem, atque spiritum Zeno idem esse censuit. Sed medici distinxerunt,  
spiritum, quem spirando trahimus, calorem autem spiritus elisionem appellantes.  
Alij vitę quoddam principium calorem esse dixerunt.

DE FOETV, ET AD EVM  
pertinentibus, cap. XXXVII.



**F**Oetus mēbranis inuoluitur: quarum  
tenuem ac molliorem amnion vocat  
Empedocles, agniūā Latinè dicitō. Inde  
& ilithya, quæ partui præest, amnias mi-  
hi agnominari visa est: non à Cretæ, vt  
alij expst imant, quodam portu. Nos hāc  
tunicam dissecantes, humoris cuiusdam  
longè illo qui in secundis continetur,  
mundioris plenā inuenimus. accurateq;  
astimātibus veluti quidā fœtus sudor vi-  
debatur. per vrinaculum verò humorem  
quendā in secūdas instar vrinæ trāsfun-  
di cognouimus. Sed amnius interior fœ-  
tui, secundæ exterius vuluæ brevis atque  
venosa tunica adhærebant. è secundis  
vmbilicus oritur ex duabus venis toti-  
dēmq; arteriis compositus, & ex quin-  
to appellato vrinaculo, breui vasculo,  
vtrinque cauo, è vesicę fundo in secun-  
das intrante.

Plurima in homine reperta huiusmo-  
di appellationibus insignire oportet.  
quòd siquid in his omissum fuerit, non  
ideo tamen plurima ob pauca quædam  
coniuuentibus oculis præterita a sperna-  
ri conueniet.



DEPART. HOM.

449

Quæ in altero libro primo  
continentur.

- Quæ sit libri necessitas, cap. i.  
Quæ sint maxime corporis partes, ca. ii.  
De capite eiusque partibus vsque ad na-  
sum, cap. iii.  
De naso & aliis faciei partibus vsque ad  
labia, cap. iiii.  
De oculorum partibus, cap. v.  
De malis, maxillis, & mento, cap. vi.  
De aurium partibus, cap. vii.  
De ore, & in eo contentis, cap. viii.  
De collo, & eius partibus, cap. ix.  
De epomide, humero, scapulis, alis, & re-  
liquis vsq; ex extremam manum,  
cap. x.  
De pectoris ac dorsi partibus, cap. xi.  
De ventris, seu alui partibus, cap. xii.  
De virilis membri partibus, cap. xiii.  
De foeminarum locis, cap. xiiii.  
De dorsi ossibus, extremisque eius par-  
tibus, cap. xv.  
De inguinibus, crurisque totius vsq; ad  
extremum pedem partibus, cap. xvi.

Ff



## R V F F I EPHESII

de corporis humani

PARTIVM APPELLATIO-  
nibus, alter liber I,Iunio Paulo Crasso Patauino  
interprete.QVAE SIT LIBRI NE-  
cessitas, cap. I.

Iquis fidibus canendi  
artem doceri cupiat,  
ante omnia fides peri-  
tè tractare, singulasq;  
propriis nominib<sup>9</sup> ap-  
pellare discat, necesse  
est. Grammatistæ an-  
te legendi, ceteraq;  
doctrinę scientiam,  
elementorum nomina pueros prædo-  
cent. necnō in geometria, quid lineasit,  
quid superficies, quid planum, quid figu-  
ra triangula, quid circulus, id genusque  
alia, quoq; ritè nomine appellentur,



DE PART. HOM. 451

prædiscere opus est: in aliis itidem arti-  
bus prænotiones vocabulorum similiter  
edocent. Medicam itaque artem cape-  
scere optantibus elementa prius trade-  
re perquam necessarium esse duxi: ut  
quæq; videlicet corporis pars rectè no-  
minanda sit. quandoquidem diuinissi-  
mus Hippocrates in libro qui inscribi-  
bitur de Locis in homine, ita loquitur:  
Corporis autè natura sermonis in me-  
dicina principium est. Nos igitur etiam  
à simpliciorib<sup>9</sup> exteriusq; aspectui subie-  
ctis exorssi, eorum prænotationem appel-  
lationesque trademus.

QVAE SVNT MAXIMAE  
corporis partes, cap. II.

Maximæ corporis partes, caput, col-  
lum, thorax, manus, cruræque  
sunt. Thoracem non solum à iugulis ad  
ræcordia vsque, sed totum a iugulis vs-  
que ad genitalia vocamus.

Ff 2



## DE CAPIT E I V S Q V E

partibus, vsque ad nasum,

cap. III.

**C**Aput, quod capillis intectū est, simul etiam cum facie & alia sic appellantes comprehendimus. prior capillata pars synciput dicitur: in quo & sutura est, quoniam ipsi coronas circumponimus, corona vocata, posterior occiput. partes ab utraque syncipitis parte tempora. pars media qua maximè conuoluuntur capilli, vertex. sub syncipite frons sita est. in temporibus pilorum exortus iali Græco vocabulo, Latinè lanigo: posteriores occipitis pili à Græcis chætæ, à nostris crines dici possunt. ultimam frontis rugā episcenion Græci dicunt, quod supertentorium nostris sonat: partes frontis pilis hirtæ supercilia sunt. horum media intercapedo mesophryon apud Græcos est, Romanis glabella. inde nasus porrigitur.



DE NASO ET ALIIS FACI-  
 ciei partibus vsque ad labia,  
 cap. XIII.

**N**asi extremum globul<sup>o</sup> dicitur. quod  
 nasum in duas cauernulas distiguit.  
 interseptum à globulo carnosum quod-  
 dam in labium descendens, columna est.  
 nasi caua ab vtroque intersepti latere,  
 per quæ olfactus præstatur, nares vocan-  
 tur. nasi alæ, seu pinnae huiusmodi caua  
 ambientes sunt. sub columna subsidens  
 cauitas supra labium philtron Græcè,  
 Latinè amatorium dicitur. totum verò  
 quod infra nasum supra labia est, hypor-  
 rhinō appellant. deinde labia duo, quo-  
 rum summa prochila Græci dicunt: tu  
 prolabia, si lubet, dicito. quâ committun-  
 tur autem prostomion est.

DE OCVLORVM PAR-  
 tibus, cap. V.

**V**b superciliis oculi sunt. quæ oculos  
 contegunt, palpebræ sunt. harum alte-  
 ra supra, altera infra est: quarum in con-

Ff 3



niendo congressus tarfos vocant. pili ex palpebris enati, cilia sunt. Tarforum extrema, anguli, magnus naso, exiguus tempori finitimus. Coræ pupillæ sunt: glenæ oculorum media, per quæ videmus. Alij pupillam id vocant, quo videmus, coram autem & glenam simulacrum in pupilla conspicuum. post hæc autem quæ sunt nigra, cæcia, aut splendida, à colore nominantur iri: circulus est prædicta albo continuans. Sub oculis loca hypopia Græcè, Latine subocularia sunt.

DE MALIS, MAXILLIS, ET  
mento, cap. VI.

**H**is insurgentes eminentiæ subiacent malæ vocatæ: quæ per pudorem erubescunt. sub his maxillæ, seu mandibulæ. quarum inferioris extremum in acutum definit, mentumque est: à quo usque ad inferius labium os fit rotundum, atque prominens. sub mento carnosæ pars à Græcis anthereon, seu leucania dicitur. verum alij anthereona hanc



partem; leucaniam verò cavitatē iuxta iugulum appellant.

DE AVRIVM PARTIBVS,  
cap. VII.

**A** Vriculæ eminentiæ sunt ab utroque tempore iuxta extrema collocatæ. quarum cauernulæ meatus auditorij vocantur: per quos audimus scilicet: harum inferiores carnosæque partes fibræ sunt, superiores cartilaginosaque pinnæ. Helices, quæ deinde circumferentiam ambiunt: anthelices verò in medio post helicem extumescences prope cavitatem particulæ. cavitās ipsa concha dicitur: conchæ opposita prope temporis finem elatio tragus, id est hircus vocatur: huic opposita ex crassiore anthelice antitragus.

DE ORE, ET IN EO CONTENTIS, cap. VIII.

**O** S est prima labiorum divisura, & reliqua omnis vsq; ad fauces inanitas.

Ff 4



in ore & alia quædam, & dentes sunt: quorum priores octo incisores dicuntur: canini hos sequentes quatuor. reliqui omnes viginti molares sunt. horum extremi atque interius conditi sophronisteres, id est moderatores ac temperantes nuncupantur: qui tum cum sapere incipimus, oriuntur. genuinos Latini vocant. dentes circumplexæ carunculæ gingivæ sunt: quarum commissura habena dicitur. latè molarium dentium summitates mensæ nominantur: maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, mortariola atque præsepia. Linguae exortum radicem vocato: ceruicem, quod sequitur: eius summum proglosson, quasi prælinguium dixeris: eius latera parasira, id est assequeantia. quod est infra linguam hypoglossis est epiglossis, quod interius supra guttur est arteriæ asperæ tegumentum: quod inter deuorandum nihil in pulmones decidat: inter spirandum verò, ne spiritus ascensum impediatur, extollitur. Quod supra linguam in orbem cavum est, cœlū, Palatum uocatur. quæ deinde superius pendet caruncula, columel-



DE PART. HOM. 497

la est: quam alij gurgulionem, vnam alij  
vocitarunt. ipsi subiicitur arteriæ asperæ  
caput.

DE COLLO, ET EIVS  
partibus, cap. ix.

**D**Einde collum & dera Gracè, cuius  
prior pars brōchus, & aspera arteria:  
circa medium prominentia guttur: auer-  
sa pars, ceruix & occipitium: propè iugu-  
la cauum anticardium & iugulatio nun-  
cipatur.

DE EPOMIDE, HUMERO,  
scapulis, alis, & reliquis vsque ad  
extremam manum,  
cap. x.

**A**Tendone autem ad humeros perti-  
nentia epomides nominantur. Hu-  
meri capita sunt eorum ossium, quæ à  
Græcis brachiona, à nostris etiam hume-  
ri vocantur. Scoptula operta siue lata  
scapularum ossa tergo imposita lata os-  
sa sunt: quorum media eminentia spina



est. ingulorum latorumque scapularum  
ossium copula acromia dicuntur. con-  
tinenter clauæ adfunt, seu iugula. Ala  
est sub humeris cauum, in quod frequen-  
ter humerus luxatus delabitur. deinde  
humerus est, qui brachion à Græcis vo-  
catur. articuli angulus, quo nitimur in-  
clinati, ancon est, siue olecranon: Lati-  
nè cubitus. Quod sequitur, vlna, siue la-  
certus siue brachium est: quod brachia-  
li terminatur. postea palmæ, deinde ma-  
nus pectus, alij hypothenaron vocant,  
sub pollice est. postea est manus caui-  
tas, quæ vola nominatur. Ex digitis  
vnus ab aliis distans magnus, pollexque  
dicitur. Index autem inter alios qua-  
tuor primus est, alter medius, tertius a-  
nularis, vltimus minimus. horum ossa  
scuticulæ, aut phalanges, aut internodia  
vocantur. quorum curuaturæ condyli,  
sed primæ procondyli, vltimæ metacon-  
dyli, omnes à Latinis nodi vocati sunt.  
vnguium initia radices vnguium appel-  
lantur: digitorum extrema acini, aut ca-  
cumina. interstitium anularis ac polli-  
cis thenar est. Hippocrates autem to-



tum hunc locum thenar appellasse visus est: qui apud Latinos volæ nomen habet.

DE PECTORIS AC DORSI  
partibus, cap. XI.

**A** Ingulis autem in parte priori pectus ac sternon est. Tergum verò posterius à ceruice ponitur. Deinde quod appellant metaphrenon, hoc est pars è regione septi posita, sequuntur lumbi pars dorsii infima. in pectore carnosæ eminentiæ mammae sunt, quarum summa papillae: totum, quod sub ala deorsum versus protenditur, latus est, ossa costæ & spathæ. quarum primæ inter se committuntur ad terminum ossis, quod Græci sternon, Latini os pectoris nuncupant: quæ cor situm est, septum transuersum aliqui phrenes, aliqui procordiam, quasi ante cor positum, aliqui cor nominant. post ipsum est ventriculi hostium. inter costas spatia intercostalia vocant. Spuriæ costæ sunt, quæ non inter se coeunt. hæ in cartilagines degenerant.



DE VENTRIS, SEV ALVI  
partibus, cap. xii.

**M**Vsculose partes sub cartilaginibus hypochondria Græcè, subcartilaginea Latine, à quibusdam præcordia dicta sunt. Deinde alius est: quem alij ventrem nominant. quod in medio est, epigastrium Græci vocant, super ventrem scilicet cutem. media cauitas vmbilicus est, ei circumdata cutis vetula vocatur: quod ea corrugata senectam adesse significat. quod sub vmbilico ponitur, abdomen ac sumen est. quod postea ad genitalia vsque pertinet, epision, pubes ac pecten dicitur.

DE VIRILIS MEMBRI PARTIBUS,  
cap. xiii.

**G**enitalium maris quod pendulum est, Gstema Græce, coles Latine, penisque dicitur. quod non pendet, hypostema hoc est sedimentum, aut perineus. eius extremum præputium est. Scrotum quo testes continentur, appellatur. eorum



DE PART. HOM. 461

superior pars caput est, inferior fundum.  
partem laxiorem scroti laccopedon di-  
cunt.

DE FOEMINARVM LOCIS,  
cap. xiiii.

**M**ulierium locorum pars superior  
pecten est: fissum verò prima diuissio.  
in medio sita musculosa caruncula myr-  
ton, aut nymphea est. myrtichila verò à  
lateribus collocata pinna.

DE DORSI OSSIBVS, EX-  
tremisque eius partibus,  
cap. xv.

**D**orsi ossa vertebrę sunt. vniuersa ver-  
tebrarum compago spina dicitur:  
cuius infima pars lumbi: postremumque  
dorsi sacrum os est: quod aliqui hypo-  
spondylon, id est subvertebrum, vt ver-  
bum verbo reddatur, appellant. Hu-  
ius extremum coccyx est, Latine cucu-  
lus. à lumborum lateribus nates sunt.  
post lumbos carnosę partes clunes ap-



pellatę sitę sunt: quę & ephedrana, quodd  
sedendo commodę sint, à Gręcis no-  
minantur.

## DE INGVINIBVS, CRV-

risque totius, vsque ad extre-  
mum pedem partibus,  
cap. XVI.

**I**nguina sunt fœmorũ principia. fœmo-  
rum partes interiores fœmina sunt,  
quę partes inter has per ineumq; sunt,  
plichades à Gręcis dicuntur. Musculi ad  
genua tendentes epigunides Gręco no-  
mine vocātur: ossa superiacentia epigu-  
natides. hæc Hippocrates molas vocat,  
Latini patellas. Genu est fœmoris cum  
crure connexio: sub quo poples est. Su-  
ra est posterior magnus cruris muscu-  
lus: vnde latus nervus ad calcem tendit:  
ossium verò posterius item suram, prius  
tibiam dicito: extrema pedibus propin-  
qua malleoli, à nonnullis tali, sed non  
rectę dicuntur. Tali tamen & ipsi adsunt,  
sed non oculis conspicui. Calx poste-  
rior est pedis rotunda pars: post quam



cauum pedis est . post hoc verò planta,  
seu vestigium . cui oppositum supremū  
tarsus est . totum verò pedis situm pezam  
Græci vocant . Pedum digiti manuum  
digitis appellationibus respondent.

Liber secundus quæ contineat.

Libri continuatio, atque propositum,

cap. i.

De cerebro, eiusque tunicis, & enatis,

cap. ii.

De oculi partibus,

cap. iii.

De eis, quæ ore continentur,

cap. iiii.

De pharynge, id est aspera arteria, & gu-

la, & pulmone,

cap. v.

De iecore, bilis conceptaculo, & venis

portis vocatis,

cap. vi.

De liene,

cap. vii.

De corde, ab eoque enatis, & adiacenti-

bus,

cap. viii.

De pectoris partibus, & septo trāuerso,

cap. ix.

De gula, & ventriculo,

cap. x.

De intestinis, & lactibus,

cap. xi.

De renib<sup>9</sup>, vrinariisq; meatib<sup>9</sup>,

cap. xii.



De omento, cap. xiii.

De seminariis conceptaculis, & semine,  
cap. xiiii.

De scroto, testibus, eorumq; membranis,  
cap. xv.

De utero, cap. xvi.

De venis, arteriis, multisque aliis corpo-  
ris particulis, cap. xvii.



DE PART. HOM. 465

RUFFI EPHESII

de partium corporis

HUMANI APPELLATIONI-  
bus Liber secundus.

IVNIO PAVLO CRASSO  
Patauino interprete.

LIBRI CONTINVATIO,  
atque propositum,  
cap. I.

**P** Osteaquàm extima-  
rum corporis huma-  
ni partium appella-  
tiones exposuimus,  
deinceps continua-  
ta serie ad latetium,  
internarumque no-  
titiā trāseamus: quippè cū à viris sa-  
pientibus homo exiguus quidam mun-  
dus appelletur, cœlestis ordinis æmu-  
lus, in membrorum fabrica, actionibûs-  
que præstandis varium effectum artifi-  
cium possidens. quemadmodum igitur

Gg



reliqua medicinæ præcepta, ita & quæ ad dissectionis artem faciunt, referenda sunt. Quã ob rem artis principia, ac veluti fundamenta illustrioris doctrinæ causa iacentes, quem situm membris natura tribuerit, eorúmque simul nomina explicabimus.

### DE CEREBRO, EIVS-

que tunicis & enatis,

cap. II.

**I**Taque in capite intra caluariæ concavum suis cū velaminibus cerebrũ includitur: proq; corporis mole longè maius in homine quàm in cæteris animantibus reperitur. eius substantia pulticulæ similis est, viscida atque præcandida: post id in occipitio vocatũ cerebellum collocatur. Tunicarum prima caluariæ ossibus affixa est, quæ pulsatorio etiam motu cietur: altera cerebro circumdata ipsum dissipabile conseruat, eiúsq; fragile corpus in vnum cogit ac retinet: vtraq; neruosa membranosaq; est, exiguo interpositorum vasculorum sensu prædita. interius cõdita motu caret, exterior mo



bilis atq; crassior est. A cerebro medulla processus exoritur per caluarię foramen in occipitio erūpens, per vertebra- rumq; omnium caua ad extremā vsque delabitur, neque propria tamen cerebri substantia est, sed emanatio, quę spina- lis medulla vocatur. Meatuū verò pro- cessus sunt à cerebro neruosi ad singula sensoria, vt ad aures naresq; & huius- modi alia propagati. vnus autem à basi prorsum versus in duos diuisus progre- ditur, & ad vtrūq; oculū pergīt: qua par- te vocata peluis est, atq; instar foueę iux- ta vtrāq; narē faciei cauitas: vbi tuni- carū oculū cōponentiū plexus efficiuntur.

### DE OCULI PARTIBVS, cap. III.

**E** Arum tunicarum prima nimirum ab ordine prima, à colore verò candida vocata est: quemadmodum & cicatrices eius candorē indicantes ostendunt. Tu- nica igitur prima cādida vocatur: & cor- nicularis, siue cornea: aut propter firmi- tatem, aut quoniā interius conditus hu- mor per hanc, tanquam per corniculum

Gg 2



pellucet, aut quòd instar cornu in corpuscula ctedonas vocata, id est fibras aut filamenta resoluitur. Secunda verò primæ per appensionem vsque ad vocatam coronã adnexa est, quæ media dehiscit, atque orbiculari cauo perforatur: cauatum autem corpusculum exterius, quæ cornicularem attingit, læue tersumque est: in auersa parte asperum, vt inquit Herophilus, quale vuæ acini corium esse solet, vasculis perplexa hæc tunica est: quæ secunda ab ordine, perforata à structura, à similitudine rhagoides, Latine acinalis, aut vualis: choroides etiam quod instar secundarum, quas chorion Græci vocant, vasculis fit multis irrigata, nominatur. Tertia ab eodem meatu progressa tunica humorem oui albo similem, vitreumque appellatum includit. est hæc prætenuis, vocaturq; ab humoris concretionem vitrea, à tenuitate aranealis, à vasculorum contextu figuræque reticularis: quippe quæ ex angusto in latum diffunditur, sinuatürque: quò quartam tunicam humorem cristallo similem continentem inuoluat, cuius dimi-



dium prominet, secundæ tunicæ forami-  
ni contiguum, dimidium cum araneali  
comittitur. Hæc igitur tunica discoi-  
des, id est disco similis aut lenticularis  
à figura vocatur, aut à concreto humo-  
re crystalloides. nempe quidā hanc ne-  
que tunicam appellandam esse censent:  
nam membranosam quandam congela-  
tionem esse dixerunt.

De HIS QVAE ORE  
continentur, cap. IIII.

**D**Einceps ad ea quæ in ore latent, de-  
scendamus. Lingua primū turbinata  
figura consideretur, à lato in angustum  
gracilescens, à faucibus radices ducens,  
carnoso & quodammodo nervoso cor-  
pore, in cibus atterendis deuorandisque  
mobilis: præterea & ad articulatæ vocis  
creationem emissum aerem secundum  
animi inclinationem conformans, gu-  
statoriūque sensum participans. In hu-  
ius basi epiglossis vocata exoritur, ceu  
quædam exigua lingua supra eius lati-  
tudinem assurgēs, in faucibus ex latiore

Gg 3



basi in angustum finiens, cartilaginea materia constans, faucibusque cognata. hæc asperæ arteriæ operculum, & ciborum in gulam descensus iter quoddam est. Supra epiglottida autem supernè columella dependet, ex palati partibus secundum eius foramina exoriens. hæc & vua ab extremitatis rotunditate vocatur, nullam magni faciendam utilitatem afferens. unde fit, ut ea recisa nulla corporis actio vitietur. In penitioribus autem ab utraque linguæ parte affixæ tonsillæ sunt, numero sex, corpore glandulosæ, figura subrotundæ, natura facile mutabiles, atque dissipabiles, mēbranulis quibusdam altius insertis conuolutæ. ex his quatuor ab utroque latere cernuntur, duæ verò cerni vix queunt. Has Græci vocant paristhmia, quòd in angusto meatu sitæ sint. veteres enim Græci locorum angustias isthmus appellabāt. Antiadas verò, quasi contrarias dicas, iccirco etiam nominabāt, quoniam ore aperto inter se contrariæ, præsertim quū inflammatae sunt, appareant.



## DE PHARYNGE, ID EST

aspera arteria, & gula, & pul-  
mone, cap. V.

**I**Nde à palati ac linguæ partib<sup>9</sup> duo iti-  
nera patefiunt. horum prius pharynx  
Græcum vocabulum habet. inter hoc &  
colli vertebrae gula est. Pharynx cartila-  
ginosus est, atq; in orbem patēs, superius  
latior, infra verò angustior. per ingula  
autem, appellatumq; antisternon, id est  
spinā dorsi, quæ pectori opponitur, de-  
scendens in medios pulmones inferitur:  
ipsoq; anulis, quæ bronchia vocant, inte-  
xit. huiusmodi membrum aspera arte-  
ria, quod istis anulis asperata sit, dici  
meruit: bronchus etiam à quibusdā vo-  
catur, ad aeris inspirando ducti transitū,  
vocemq; edendā à natura cōstitutus. De  
ipso pulmo suspēditur rarus ac peruius,  
pectoris inanitate conclusus: idē globo-  
sus est, murisq; caudæ figura speciē re-  
præsentās. in fibras quinq; diducitur, co-  
lore cinereo atq; subalbido. assidua mo-  
tione concutitur, follis morem in spi-  
ritu transitu retinens. quippe spiritus

Gg 4



per asperā arteriam in bronchia tractus  
per pulmonis spiramenta intra pectoris  
cauum elabitur : atque iterum foras ab  
hoc per naturalia formina propellitur.

DE IECORE, BILIS CON-  
ceptaculo, & venis portis vocatis,  
cap. vi.

**A**B vtrisque præcordiis lienis iecurque  
iacent. sub pulmone à dextris iecur  
est, transuerso discrimini magis appen-  
sum, posteriori parte in gibbum assur-  
gens: in quatuor aut quinque fibras di-  
rimitur, colore lentis ad rubicundius ta-  
men vergit, venoso corpore iuxta atque  
sanguineo. Venas autem quæ cauæ per  
interseptum ad cor tendenti commit-  
tuntur, ora portasque vetusti scriptores  
nuncuparunt. Sub conuexa parte pusillū  
quoddā vasculū vesicæ simile defixū est,  
neruosum, fellisque inibi geniti capax:  
à quo sanè meatus quidam nerueus per  
lactes ad intestina contendit : per quem  
paulatim bilis in intestina delabitur,  
excrementaque felleo colore suffundit,



atque ipsa depellendi cupidinem infert.  
Hoc intercluso itinere aurigo futura  
portenditur, bile per omne corpus effu-  
sa: quocirca albidæ cretaceæque deie-  
ctiones exeunt. Est autem præferuidum  
igneumque iecur plurimū ad se alimen-  
ti attrahens, ac finitimis partibus com-  
municans. ideoque sinistris dextræ par-  
tes viribus præstant.

## DE LIENE,

cap. VII.

**A**T Lienis iecori cōtrarius in sinistris  
præcordiis iacens opponitur, ad hu-  
mani vestigij longitudinem protentus,  
superius rotundus & robustus, infra con-  
tractus & gracilis, medius angustior, vi-  
ni fæcis colore perfusus, laxus ac fora-  
minulentus, conceptaculis multis im-  
plicitus: ignauum membrum, nullōque  
fungens ministerio.

## DE CORDE, AB EOQUE

natis, &amp; adiacentibus,

cap. VIII.



**P**ulmonis fibris cor circumtegitur, intra pectus sedem habēs secundū medium, magis tamen ad sinistram declinans, & sub sinistra mamma collocatur, pinei nuclei effigiē adeptus, & à lata base in mucronē instar turbinis acuminatum, musculosum natura atque nervosum, pulsatorio semper motu percitum, medium inane, duobus manifestis finibus concavum, altero in dextris, qui sanguineus, quòd multitudine sanguinis affluat, appellatur: altero in sinistris spirituofo, quoniam spirituum copia redundat, nuncupato. inde fit etiam, vt spirituum agitatione moueatur. Membranis præterea vtrinque latioribus auricularibus vocatis cor præcingitur: quoniam ad aurium imaginem cordis lateribus iuhærent, & prominēt. Ab ipso verò plura conceptacula nascuntur, & venę, & arteriæ: è quibus omne corpus vasculis tanquam riuus emanantibus irrigatur. Membrana præterea quadam cor veluti sepimento vallatur, eam pericardion Græci nominant, nervosam, tenuem, motuque à corde transfuso palpitantem.



DE PART. HOM. 475

DE PECTORIS PARTIBVS,  
& septo transuerso, cap. IX.

**H**Æc omnia complectens pectus ex cartilaginibus componitur atque of-  
fibus: quæ in costis, pectorali osse, atque  
dorsi spina reperiuntur. neruorum etiam  
carniumque particeps extra carnosius,  
interius neruosum est. qua etiam parte  
succingente membrana vestitur. Inter-  
septum autem, siue transuersum septum  
obliquum pectori, qua costæ finiuntur,  
subtenditur. id ita vocatum est, quod vi-  
scera in pectore abdita ab inferioribus  
intersepit.

DE GULA, ET VENTRI-  
culo, cap. X.

**A** Superioribus igitur corporis parti-  
bus, quemadmodum supra retuli-  
mus, simul cū aspera arteria enascitur,  
secusque ipsam gula protenditur, ab eis-  
dem utique partibus incipiens, nō simi-  
liter autem desinens. Hæc tubæ imagi-  
ne figuram amplitudine refert, supra



angustior, infra verò, quàm cum ventriculo committitur, capacior. hoc quippe nomine superior venter natura nervosus vocatus est. mur ere autem sicci humidique alimenti deucrandi gula fungitur: cuius examen ipsa acutissimo sensu prædita facit. Ventriculus itaque à gula exorients sub medio intersepto ad læuam magis reflexus collocatur ab angusto ore in latam capedinem sinuatus, cuius conuexum extra in abdomen vergit, sinum verò dorsum respicit. longè, quàm gula, nervosior ventriculus est atque amplior. ipse nimirum intus accepta colliquans non magnopere se dilatat: sed cibi ingressui cedens, eius descensum se constringendo insequitur: cum ad alimèta suscipièda à natura creatus sit.

DE INTESTINIS, ET LAC-  
tibus, cap. xi.

**A** Vêtriculo intestina in plures orbes implicita ad cibaria, quæ ab eo delabuntur, excipienda formata prodeunt. horum vnum idèmq; ab ipso vocato



processu ad rectum ac sedem vsque iter  
pertinet. inter quę primum est, quod ho-  
starius, aut dodecadactylus dicitur: ho-  
starius quidem, quod in ventriculo po-  
sita tãtis per, dum sunt coacta, custodiat:  
cũ remissa sunt autem, tunc & hostia-  
rius cum intestinis aperitur: quẽadmo-  
dum ani musculus sphincter, id est ad-  
strictor, vocatus remittitur. Dodecada-  
ctylus autem à duodecim digitorũ lon-  
gitudine vocabulum accepit: nervosa  
ipsius crassaque substantia est: hoc ap-  
pellatum ieiunum tangit aliis intesti-  
nis carnosius, semper ferẽ alimenti pe-  
nuria laborans: vnde ieiuni quoque ap-  
pellationem adeptum est: quod in ipso  
videlicet alimentum, vt in ventriculo  
& intestinis assolet, nõ inuenitur. postea  
gracilia quę vocantur, intestina proli-  
xa in multas spiras conuoluta, tredecim  
cubitorum longitudinem æquantia col-  
locantur, & sub vmbilico in abdominis  
regione ponuntur. Sub his omnibus cœ-  
cum intestinum, & colon eodem loco  
exoriuntur: cœcum quidem recta in  
dextrum inguẽ spectans, altera ex parte



obstructum: colon verò, quod maius in-  
testinum Latini vocant, à dextris ena-  
scens, supernè sese circunvoluens, in ic-  
cur præcordiæque adductū incidit, de-  
inde lienem sinistrumque ile petens, po-  
sterius cum recto intestino coniungi-  
tur. id nonnulli & inferiorem ventricu-  
lum nominarunt: in quo etiam plurima  
cibi pars in stercus vertitur. omnium po-  
stremum rectum est cæteris carnosius,  
rectamque sedem, vnde & nomen acce-  
pit, sortitum est. in anulum autè & sphin-  
ctera vocatum, id est adstrictorem, defi-  
nit, eum quidem nervosum & durum,  
hunc autem carneum atque rugosum,  
infimum omnium collocatum. Inter  
intestina medijs laetæ sunt, quos Græ-  
ci mesenterij atque mesaræi vocabulo  
insignunt.

DE RENIBVS, VRINA-  
riisque meatibus, cap. XII.

**R**enes circa vltimas dorsivertebras siti  
sunt, numero duo, figura rotūdi, co-  
lore leticulæ, & quasi subcinereo. dexter



## DE PART. HOM. 479

paulò altior grandiorq; inuenitur. den-  
so squallidòque corpore constant: fau-  
ciati ineuitabilem mortem afferunt. In  
penitis cauisque eorum partibus mem-  
brannulæ sunt instar cribri, foraminibus  
plurimis pertusæ. vnde meatus duo ex-  
euntes vesicæ summitatem intrant: per  
quos vrina in vesicam transfunditur, in-  
deque foras expellitur. hos paulo ante  
meatus nominauimus.

## DE OMENTO, cap. x. ii.

**O**Mentum intestina contegit præpi-  
gue, duplicique membrana contex-  
tum. ipsum idcirco natura condidit, vt  
intestinis superfluitans ea aduersus am-  
bientis peritonæi duritiam remolliret.  
recisum aut vulneratum vitæ discrimi-  
ne vacat.

## DE SEMINARIIS CONCE- ptaculis & semine, cap. xiiii.

**A**T seminaria itinera secundum re-  
nes quatuor descendunt: bina recta



tendentia, quos & assessores & glandulosos nonnulli vocant: bina varicosa, quòd varicis more circunfleuntur. intra hæc fœcundum semen gignitur, grandinosum crassumque: quare & ipsa nonnulli genitales venas appellare voluerunt. in alteris autē est infœcundum dilutūque semen, quod simul cū priore eius nutriendi causa excernitur. verū ab vtraque parte coniugata simul vtraque à dorso descendunt. sed sterilia vascula cum vesicæ ceruice coalescunt: varicosa verò per inguina testiculorum tunicas subeunt. Quapropter eunuchi semen quidem, sed infœcundum è glandulis fistulis eiiciunt: è varicosis verò excisis testibus seminis profusio seruari non potuit.

DE SCROTO, ET TESTIBUS, eorūque membranis, cap. xv.

SCrotum & tota ea laxitas est, in qua testes continentur, & magis propriè exterior carnosā pars, ex mēbranis constat



stat, exteriore quidem darto vocata, quæ rugosa est, interiore autem erythroide. Nempe scrotum & dartos communia amborum testium inuolucra eos superioribus partibus suspendunt: sed erythroides sibi ipsi adnectit, atque in orbem testes amplectitur, priuatim seorsumque singulos inuoluens. Ipsi testes autem ex pulticulæ simili materia constant, humidique admodum neruosa firmaque membrana includuntur.

## DE VTERO,

## cap. XVI.

**M**ulier autem genitale membrum, quod vulua atque vterus vocatur, inter conceptacula eximium est: inter vesicam rectumque intestinum ponitur huic incumbens, illi subditum, medicinalis cucurbitulæ figuram æmulans. hoc loco venerei congressus exercentur.

Hb



DE VENIS, ARTERIIS,  
multisque aliis corporis par-  
ticulis, cap. XVII.

**V**enæ receptacula sanguinem conti-  
nentia sunt, per quas sanguis in om-  
nes corporis partes diffunditur. Arteriæ  
spiritus & quodammodo etiam sangui-  
nis receptacula sunt: in quibus motio fit,  
quæ pulsus communi vocabulo dicitur,  
& à corde exclusus spiritus per ipsas in  
omnem corporis molem dispellitur.  
Pinguetudo est alba oleosaque concre-  
tio, quam adipem etiâ nominant. Glandu-  
losæ carnes, quas Græci adenas vo-  
cant, concretiones quædam subpingues  
atque carnosæ sunt, peculiariter cauis lo-  
cis insitæ: alis, dico, & inguinibus, nec-  
non & lactibus. Ossâ coagmenta quæ-  
dam sunt solida, sanguine & sensu cæ-  
rentia, per quæ actiuæ atque electoriæ  
motiones perficiuntur. Musculus corpus  
est firmum ac densum, non simplex, sed  
ex nervis, venis, arteriisque composi-  
tum, sentiendi particeps, officium volun-  
tariæ motionis obiens. Cartilagines au-



tem concretionēs sunt mediæ inter ossa  
neruōsque naturæ: ossibus enim mol-  
liores, neruis duriores sunt, præcipue of-  
sium extremitatibus coalescentes. Ner-  
uus corpus est simplex atque densum,  
voluntarij motus instrumentum, obtu-  
si, dum inciditur, sensus. Secundum Era-  
sistratum quidem & Herophilum sen-  
sorij nerui sunt: Asclepiades autem ip-  
sos sensu vacare testat<sup>r</sup> est: cæterum se-  
cundum Erasistratum cū gemina ner-  
uorum natura sit, sensoriorum videli-  
cet, atque mouentium, sensori, qui caui  
sunt, in cerebri membranis originem ha-  
bent, mouentes in cerebro ac cerebello.  
Dixit autē Herophilus aliquos esse vo-  
luntati obediētes neruos, qui & à ce-  
rebro spinalique medulla oriuntur: ali-  
quos, qui ab ossē orientes in os inferun-  
tur: aliquos à musculo in musculum  
transeuntēs, qui articulos etiam copu-  
lant. Medulla substantia est vnguinea  
& exanguis, quæ semper in ossium ca-  
uis includitur.

Hh 2



## Q V A E T E R T I V S R V F

fi Ephesij liber con-  
tineat.

De ossibus capitis, & futuris, & cauis,  
cap. i.

De colli vertebriis, humeris, scoptulis o-  
pertis, & eorum processibus, cap. ii.

De iugulo, ossibus humeri, brachij, &  
manus, cap. iii.

De dorsi lumborumque vertebriis, & co-  
stis, cap. iiii.

De coxa, fœmore, & reliquis vsq; ad ex-  
tremum pedem ossibus, cap. v.



DE PART. HOM. 485

R V F F I E P H E S I I

de membrorum hu-

MANORVM APPELLATIO-

nibus, Liber tertius,

I V N I O P A V L O C R A S S O

Patauino interprete.

DE OSSIBVS CAPITIS, ET

futuris, & cauis,

cap. I.



Ostea quàm interio-  
rum locorum natu-  
ram nominâque pro  
viribus superius ex-  
posuimus, modò de  
ossibus sermonem  
subiiciemus. Calua-

ria igitur, qua parte vocata scaphula  
est, globosa cernitur, in vertice extube-  
rans, in syncipite subcrassa aliquantu-  
lum, & lata, atque per ossis iniectum du-  
plicata, circa tempora compressa, ple-  
runque futuris quinque diuisa: vna in

Hh 3



vertice in posteriorem partem tendente, quæ à literæ lambda similitudine lambdalis nomen habet. Altera autem in syncipite orbiculari, coronæ vnde & dicta est, formam imitante: quæ ibidem terminata finitur. Tertia à lambdali recta verticem partita coronariæ vocatæ coniungitur. Duæ præterea sunt secundum aures in temporum sedibus squamiosæ dictæ, nō in profundo, vt reliquæ, structuras habentes. Priori ex parte cauernæ oculorū sedes sunt: pyelidas Græci nominant, nos arculas, seu peluiculas dixerimus. Inter has nasi os insurgit, intra quod ithmoides à cribri similitudine cognominatum os multis foraminibus cauum reconditur. Facies præterea ossium coagmētationes tales habet, infra supercilia vnā, duas ab nasi ossis obliquis lateribus, quartam inferiorem maxillam separantem, quintam in palato iugalibusque ossibus, duas alias, quæ vix cerni queāt in malis. At caluaria ab inferioribus partibus concaua foramina profunda rotundaque habet, per quæ spinalis medulla descendit.



DE COLLI VERTEBRIS,  
humeris, scoptulis opertis, & eo-  
rum processibus,  
cap. II.

**C**ollis septē vertebræ sunt inter se con-  
gruenter insertæ. harum prima capi-  
ti motum exhibet, reliquæ immobiles  
sunt. postea humerus est, deinde scoptu-  
la operta figura triangula pectoris co-  
stis posterius ad tabellæ imaginem in-  
cumbunt. & qua parte latiora sunt, ibi  
etiam tenuissima: qua verò angustiora,  
ibi & crassiora & robustiora in sinum  
quendam subsidentia: in quem humeri  
caput coniicitur. Ab eo sinu processus  
exigitur, ceu spina quadam ab anchoræ  
hamiq; similitudine ancyroides & an-  
cistroides Græcè nuncupatus. cum quo  
iuguli extremum per cartilaginem coa-  
lescens committitur.

DE IUGVLO, OSSIBVSQVE  
humeri, brachij, & manus, cap. III.

**A**T iugulum in tribuli formam effi-  
giatum instrumento illi, quod ca-



thetera masculinum Græci vocāt, per-  
simile est, cum osse autē pectoris, cumq;  
lato scapularum osse connectitur. ipsa  
verò iugulorum media pars sigma Græ-  
cæ literæ similis cum prima dorsi ver-  
tebra coniungitur. Humerus prælongus  
ac teres est, superiorique parte, quæ hu-  
meri caput dicitur, tumidior. id dimidi-  
um in verticillato scapularū osse recodi-  
tur. At inferius, qua cubito deligatur,  
inæqualis est, duosque vtrique proces-  
sus pugillis similes habet, medium ca-  
uum: à prioribus quidem partibus mi-  
nus, à posterioribus autem magis con-  
tractus est. Brachium ex ossibus duo-  
bus constat, cubito ac radio. Radius,  
quam cercida Græci appellant, superior  
breuiorque: & primo tenuior rotun-  
do & leniter cauo capite exiguum hu-  
meri exteriusque tuberculum reci-  
pit. Cubitus inferior longiorque, & pri-  
mo plenior est, atque in manus articu-  
lo brachialis extremum admittit. Ra-  
dius vtrique, qua brachiali adnectitur,  
duobus sinibus cauus est, altero recto,  
quo firmatur articulus, altero à latere,



in quo rotundū cubiti caput inseritur. Porro brachiale ad figuram turbinis ex octo ossiculis coagmentatur. Post hæc phalanges sunt, prælonga ossa digiti formam habentia. Deinde ossa digitorum scythalides à Græcis, id est scuticulæ, à Latinis Internodia nominata, in singulis digitis terna inter se inæqualia præter pollicem: quippe qui à basi duobus tantum ossibus nititur.

### DE RELIQUIS VERTEBRIS, & costis. cap. III.

**P**ost septem colli vertebrae sunt dorsi duodecim, lumborum quinque vertebrae: vtomnes quatuor & viginti sint. Ita verò instructæ paratæque sunt, ut introrsum versus, qua viscera contingunt, læues ac circumductiles, exterius asperæ spinosæque sint, carne ingenita obrutæ, à lateribus in mensæ formā explanatæ, omnes in medio concavæ, vnicum in suo corpore cochleæ instar foramen habentes, per quod (ut supra diximus,) spinalis medulla demittitur. in



transuerfis præterea proceſſibus parum  
deſidentes ſinus habent, qui coſtarum  
extrema recipiunt. Nempe coſtarū alia  
ſuperius inflexæ inſtar fornicis, inter ſe  
deinde in interiora leniter flexæ com-  
mittuntur: alia obliquæ occuſantes,  
poſtea cartilagineæ factæ ſpinæ, ſpu-  
rieque coſtæ nominantur, & maiorem,  
quàm in ſuperioribus, circuitum ex cō-  
curſu minorem faciunt. Reliquis omni-  
bus vertebris vltima præſtat, quod & ſa-  
crum os ſecundum antiquorum conſue-  
tudinem appellamus: qui omnia magna  
ſacra nominabant.

## DE COXA, FOEMORE, ET

reliquis vſque ad extremum  
pedem oſſibus,

cap. V.

**A**B vtroque autem huius vertebræ la-  
tere coxarum oſſa poſterius exten-  
duntur, ſuiſque extremis oſſi pubis, cui  
pectini nomē eſt, cartilagine coaleſcen-  
tia deligantur. Hæc figura lata ſunt ac  
ſubrotunda, interdū etiā anguſta ac craſ-



fiore . Id genus ossa sinus verticillatos non exactè penetrantes, sed profundos habent, quos Græci cotylas, Latini acetabula vocant. in eos fœmorum capita coniiciuntur. At fœmora prælonga valentiâque ossa sunt, à coxis ad genua usque pertinentia, tereti figura, atque in exteriori parte gibba. ab inferioribus autem, qua genua attingunt, tuberosis globis intumescunt adeo, ut utrinque in rotunda capita consurgant; media verò sinuata sunt, quò facilius excipi à tibiis possint: quæ triangulæ, & in summo capite latecentes leniter in sinus desidēt, in quos extuberantes fœmoris eminentias recipiunt: ipsius vero tibiæ promi- nētia in sinum fœmoris inseritur. At ab exteriori parte os alterum, quod fura rectè nominatur, appositū est, tibia gracilius, non proximum fœmori, infra breuius, qua etiā parte tumidius est. eāmq; nonnulli vulgares talum vocari assue- rant. utrunque os autem fura, videlicet, ac tibia in fine multa cartilagine vnita continētur. Sed tibiæ fœmorisque com- missuræ os incumbit, quod Græci epi-



gonatida, Latini patellam, seu molam  
vocant. Hoc disci figuram repræsentat,  
& superfluitans medium situm est. ve-  
rùm in curuando crure ad tibiam ma-  
gis accedit: eùm autem extenditur, su-  
per vtrunque os cadit. In partibus mal-  
leolo proximistibia paulū gracilescit,  
atque in extremo ad stigma Græcæ lite-  
ræ speciem ita æqualiter distat, vt pro-  
cessus duos, alterum oblōgum, alterum  
breuiorem habeat. at maioris processus  
caput interius est, alterius enata carne  
occulitur. cum suræ autem extremo cō-  
iungitur, quod vltterius procedens exte-  
riorem, vt modo dixi, tumorem osten-  
dit. Quapropter huiusmodi ossa ad sig-  
ma literæ formam media dehiscunt: in  
quo hiatu talus delitescit. Hic secūdam  
partem quatrionem allachium vocatam  
fursum vergit, & ea quidem imis tibiæ  
suræque processibus adiacet. verùm os  
ἐπὶ τρεῖς vocatum super imposito illis  
suræ ossi, quod à figura cubicum nomi-  
natur, ad cauitates incumbit: vt ossis  
ἐπὶ τρεῖς quod vocant, inæqualitates  
occludantur, cartilaginēque circunda-



ta deligentur. Anterior autem ipsius rotunda particula in cavitatem cuiusdam ossis quod ex illis est, quæ tarsum vocatum constituunt, & à cavitare nuniculare dictum fuit, inseritur. Ex octo autem ossiculis inæqualibus angulis tarsus instruitur. Ipsi planta subiicitur è quinque ossibus composita in medio tenuibus, in summo crassescens, sursum versus exurgentibus: unde & à terra caua cernuntur. Post hæc deinde sunt ossa digitorum, quæ scythalidas Græci, Latini vocant internodia, ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem comparata. Ossium figura, situs, & nomina pro viribus à nobis explicata sunt.



## VARIÆLECTIONES,

quas interpretes adnotarat.

pag. 26 extrinsecus ulcerat, alia lectio,  
attrahit. & ad interiora, alia,  
suffocauit.

31 curuantur, alias, vigilant.

47 lucentes, alias, mobiles.

59 ad spinam, alias, concaua.

61 lotium acre, alias, flauum.

88 & excandescentiæ, alias, tristitiæ.

91 frigori similes, aliter, affectui.

114 ex violento abscessu, aliter, violenta  
extentione.

122 tussis longior, aliter, minor.

130 spiratione maior, aliter, dolore.

134 ad albedinem vergit, aliter, album  
cum viridi mixtum.

265 communi simul violento. Hæc ver-  
ba abundare videntur.

209 aliud extrinsecū, aliter, intrinsecū.  
crudorum & incoctorum distribu-  
tio fit, aliter, seminis crudi & in-  
cocti emissio fit.


211 nasus tumet, aliter, atque extat.



DE PART. HOM. 495

- 296 et far Tyrrhenum, aliter, Zea.  
312 soluendus est æger, alias, lauandus  
est.  
316 At si dolor absit, aliter, febris.  
319 ad recessum eius, aliter, ad exten-  
sionem.  
348 quin & palmularum, aliter, præter.







ANNOTATIONES  
locorum, qui in

ARETAEI CODICE GRAE-  
co, ab interpretatione Craffi  
discrepant, autore  
G. M. T.

In cap. V. lib. primi.

Leui de causa, utpote) Græce est, qui-  
busdam concidendi angor animi causa  
fuit.

Aut inde exortum est) aut alicunde.  
Futuramque prospiciunt.) adiutores  
inquit, aduocant, quodã usu futuri præ-  
sagi, vel, futuram prospicientes experi-  
mento calamitatem.

Nonnunquam & nos ad ægritudinis  
notitiam impulerunt) ad nostram existi-  
mationẽ tale remedium mali aduentũ  
depellit si legas pro *ἡμετέριον*, *ἡμέτερον*,  
sensus erit, eo die accessum repulit. hic  
enim *συνασίη* id significat, ut mox.

In cap. VI.

Ii



Ariditas senectæ, & mortis natura)  
frigus & ficitas senectutis, quæ etiam  
est mortis natura.

Omnes subito atque affatim corripit)  
ut in summa de omnibus dicam. Inter-  
pres legit ἡγεῖς.

Aut cuneis per Iouem facile diduci),  
abundat, per Iouem. Ionica tmesis fefel-  
lit interpretem.

Ego sane vidi & miratus fui, lotium,  
&c. Videntur hæc verba ad præcedentia  
pertinere, cum ait cuidam etiam aures  
moueri, quod, inquit, mihi spectanti mi-  
raculo fuit. Tum sequitur, Lotium sup-  
primitur, aut sponte effunditur quodam  
vesicæ compressu.

Crura flectuntur: è contrario popli-  
tes vitiose curvantur) crura adducta.  
nam vitio quodam contra poplitem fle-  
ctuntur.

In cap. VII.

Et singulorum naturæ insignis ma-  
cies) gracilitas quàm pro cuiusque natu-  
ra maior. Genitium φύσιος ad ἰσχύος  
ille retulit, cum ad comparatium refe-  
rendum videatur.



Charonæis) interpres notat alias le-  
gi Coronæis. χαρώνια sunt quæ Latinis  
Auerna dicuntur.

Eodem die moriuntur, qui celerrime)  
quorum acutissimum malum, eodem  
die moriuntur.

In cap. VIII.

Et increfcit, liuet) & increfcēdo liuet,  
vel, & in illa amplitudine liuefcit.

Prouenit autem & id ex fluore), nasci  
tur autem istud, sponte quidē ex fluore.

Quoniam tonsillæ vna malè habent)  
tonsillis ex consensu dolentibus.

Et inflammationi magis obnoxij), &  
magis fit inflammatio, vna videlicet.  
Interpres videtur legisse ἐπιφλεγμαίνεσσι

In cap. IX.

Eundēque vehementer in pectus spi-  
rando adducunt. Immundi adeo sunt,  
(neque) quo quidem protinus pectus  
icissim adflant. vsque adeo sibi displic-  
ent, vt non, &c.

Tristantur enim) nauseant enim.

Quiete carentes) sui intolerantes.

Nam quiescere nequeunt. solitudine



fugiunt) quietis impotentia, quietem re-  
fugiunt. interpres legit *δρῆμιν*.

In cap. X.

In sua enim ipsius sede collocatur) in  
sua enim sede membrana collocatur.

Atque in soporem grauem inclinātes,  
mentis alienationem patiuntur) & in il-  
lo sopore iactantur.

Morbi transpositione) morbi transitu  
seu migratione.

Difflatio atque digestio) difflatio at-  
que exhalatio.

IN LIB. II, DE CAV-  
fis, cap. I.

Male vitam agit) miserè viuit.

Vomica scilicet pulmonis. Nam fe-  
bris acuta comitatur, doloris carentia  
Hic prætermissa sunt quædam, Pulmo-  
nis inflammatio cum acuta febris, qu-  
bus accidit thoracis grauitas, indolenti

Sedere volunt laborantes: ad spiritum  
ducendum corpus rectum statuitur) si-  
dere cupiunt in rectum habitum ad re-  
spirationem.



In sacrum ventrem) in imum ventre.

In cap. II.

Cū verò paucissimus & guttatim sanguis exit) quod si amplius eieciatur sanguis guttatimq; Interpres videtur legisse, *ἐπειδὴ μᾶλλον μὴ βεγχεῖν τοὶ αἵματες.*

Qui expuitur sanguis, haud ita crassus est, colore ater) quod si ex sputo sanguis fit, haud sane crassus est, verum colore ater. Interpres legit, *ἢν δὲ το*

Id fordidum, ulcerosum) asperius, ulceratum, &c.

Tussis non scretus exoritur) tussiant) que pro screatione.

Atque inde fit corruptionis initium) *φθογῆς* videtur legisse, cū sit, *φθογῆς.* unde initium cursus seu eruptionis.

Non ita terribile est) neque admodum latalis est affectus.

Per narem illum sanguis erumpit, quæ è regione patienti visceri opponitur) per nares sanguinem emittunt, ea fluente nare quæ rectà visceri respondet.

Vel ferendo onere, aut tollendo) vel contentione oneris gerendi, vel eius impositione.



Detrita & attenuata) multum tabes-  
cit & tenuata.

In aliquo inani spacio) in caua capa-  
citate.

Quoniam ater est sanguis, crassus, &  
facile spissescens, qui à vena mittitur:  
præterea minus, &c. Quoniam ater est,  
crassus, & facile concreescens, si ex vena  
manet, minusque periculi adfert. sequi-  
tur, Sin ab arteria, flavus, &c.

Erosionis autem curatio magnam di-  
ligentiam postulat, cum sit longa, diffi-  
cilis, & periculosa. Etenim parte mem-  
bri deficiente, ad solidat.) curatio, si ex  
erosione nascitur, longa est, difficilis &  
periculosa: ideòque propter defectionē,  
ad cicatricem vlcus non perducitur.  
pro  $\mu\chi\kappa\eta$ , alia quædam exemplaria ha-  
bent  $\mu\chi\kappa\eta$ , idest malum.

In causa est venularum quæ ibi sunt,  
arteriarumque tenuitas) illic enim gra-  
ciles venulæ sunt, & minutæ arteriæ.

Nonnullos autem & gulæ ipsius do-  
lor inuadit, ad interscapulum vsque in-  
terdum pertinens. vomunt pituitosa)  
ingeneratur autem & nonnullis dolor



stomachi: vomitus dorso tenus pituitosi.  
Interpres legisse videtur, ὁ δὲ μέσσι με-  
ταφρένσ. ἐμεδὶ φλεγματώδεϊς

Nonnunquam, si morbus producit  
& inualefcit, cibum reiiciūt, cibos sum-  
mopere fastidiunt ) Regerunt autem a-  
liquando plurimum, vbi morbus in lon-  
gum abit, estque maior inedia.

Cum materiā euomuerunt ) si verò  
hæc euomuerint.

Tussis permolesta est: sanguis verò  
exacte flauus) cum magna tussi sanguis  
affatim rutilus.

Si in pectore noxa fit ) sin à thorace  
hauriat.

Si à membrana costas vestiente ) sed  
si à latere, cum tussi, &c.

Dolor succingentis membranę) late-  
ris dolor.

Terribilior est quàm periculosior )  
quàm infestior.

#### IN TERTIVM CAPVT.

Ocyphon) exclamatio est indignācis,  
dij vestram fidem, cuius mali nomē est?

Syncopę facultate) vi & potentia, vi-  
ribus.



Ad mortem vitamve potentius:) capitalius. Cutis irrigatione) cutis non habet Græcū, sed ipsorum, id est capillorū.

Verum cordi stomachus vicinus perniciosus est) sed enim stomachi vicinitas cordis permagni interest.

In cap. IIII.

Oculi puri) ὀφθαλμοὶ mobiles.

Omnia ignorat) neminem agnoscit, vel, nihil agnoscit.

Vapor è naribus multus exhalat) magnum nares volunt anhelitum.

Copiosa & aliena humiditas) ὑγρότης, mador ingens.

Iam in aerem cesserit) codices quidam habebant, ἐξ ἱερῶν ἰδ est quasi consecrata, & non iam humanæ, sed diuinæ.

In cap. V.

Vngues liuent, algēt extrema) vngues liuent, perfrigescunt, algent extrema.

In cap. VI.

Remollitio intestinorum accesserit) adde, multūq; imū ventrē superauerit.

Humiditas superans) mador.

Vt neque vel tenuem acū) vt ne te-



nue quidem segmentum.

In cap. vii.

Ad tussim inclinatio) conatus.

Vomere frustra conantur) inaniter distenduntur.

Multorum variorumque fructuum) tempestiuorum & variorum fructuum.

In cap. viii.

Si quis enim aliquid, &c. eundem descensum & ascensum inueniet) Aliter Græcè est. Si quis enim velit, lamellam trahat à superiore vena cava ad cor pertinente, in eam quæ per spinam perreptat, & à spina per iecur ad cor. idè enim ascensus est.

Sunt autem cedmata, &c.) Hæc cedmatum descriptio, interpretis est, non Aretæi.

Et ventriculus sanguine redundat, pro  
hæc in Græco legendum videtur hæc  
hoc sensu, Quod si venter sanguine plenus sit, inflammatioque nascatur circa venam, si magna sit, ipsa celeriter hominem tollit. Alterius lectionis sensus est. Nempe venter sanguine plenus erat. Nasceatur autè, &c.



Flamma) θερμὴ, calor.

Et cum eo palpitatio, &c. quibusdam  
& arteria secundum dorsum inflamma-  
tur) in Græco inflammationis nulla mē-  
tio. sic enim habet, Et palpitatio ipsius  
venæ in porrectum ad ilia usque perue-  
niens: nonnullis etiam arteriæ, secundū  
spinam. subauditur enim è superiori, pal-  
pitatio.

Lotium acre mordax que est) lotium  
flauum mordaxque.

Causi, id est ardoris speciem) simplici-  
ter est, causon appellant.

Quadam segnitie torpet, & corpus ta-  
be consumitur) mente, inquit, non per-  
turbati illi quidem, sed tardi & maridi.

Exoritur, cum ferum & immane quid-  
dam sapit. Viros ac iuuenes occupat) ex-  
oritur, quoniam & quod ferum & imma-  
ne est adolescentes & florentes occupat.

In cap. IX.

Cum distentionibus) conuulsionibus.

Emittunt. Quicumque verò non mo-  
riuntur, plures, &c. Celerrime, inquit om-  
nium qui moriuntur, pereunt, qui nihil  
prorsus emittunt. plures enim liberan-



tur, aut calculo in vesicam per urinæ fe-  
mitas delapso, aut phlegmone suppuran-  
te, paulatimve per difflationem exhalā-  
te, quanquam, &c. Interpres addita ne-  
gatione, sensum turbauit.

Sed phlegmone ratione, &c) sed ex  
phlegmone quæ cum profluuiio sangui-  
nis coniuncta sit, si retentus sit sanguis.

In cap. X.

Ab innato calido) ab innati caloris fo-  
mento.

In imo sacro ventre) abundat ver-  
bum, sacro. exemplaria iēg<sup>n</sup> habe-  
bant, vt supra vixiēg<sup>n</sup> legendum vi-  
detur. In nouissimo, inquit, ventre infi-  
ma sedet, à thorace longissime amanda-  
ta. sed eius officium maxime refert, uri-  
næ, inquam, egestio.

Vlcus accedit & inflammatio) disjun-  
ctum, aut inflammatio.

In cap. XI.

Sed ex ambrothriæ subiectione exci-  
tatur) sed ex abortiu i causa: vuluē, &c.

Nequaquam tamen ab affectu exci-  
tantur aut subleuantur, imò quàm celer-  
rime interitus aduenit) tam celerrimè ex



hac valetudine reficiuntur, quàm celer-  
rimè moriuntur. Interpres pro *ὠκιστα*  
legit *ὥκιστα*.

Veruntamen communes quoque vi-  
ris egritudines in vulua oriri consue-  
verunt, veruntamen communes vuluæ  
viris quoque egritudines oriuntur, id  
est patiuntur viri aliquando morbum  
qui communem cum vuluæ strangula-  
tu habet phlegmonem sanguinis, pro-  
fusionem, &c.

In cap. xii.

Dionysio) Baccho, Libero patri.

Intemperantes quoq; in alio exoneran-  
da, in venerem lasciuientes) neque verò  
sibi moderari queunt, quin propalam ré  
habeant. Interpres malè pro *ἀμφοδον*,  
*ἀφ' οδον* legit.

Vomitibus non absque discrimine effu-  
derit) abundant hæc verba, non absque  
discrimine.

I N L I B. P R I M I D E

morbis diuturnis, cap. iiii.

Terribilis utique in accrescitionibus)  
accescitionibus effractus.



Vexat etiam pueros & adolescentes) & pueris etiam adolescentibusque contumernalis est.

Cum ætatis flore) cū formæ dignitate Interdum morbus iste) *πρὸς*, insuper, adhæc. Interpres legit *κοτὴ* seu *ποτὴ* Ipsius quoque morbi origo mirabilis & præter hominum opinionem est) sed & ignominiosa quoque species est.

Aut ob vulnera quæ tempore exacerbationis accepit) aut ex accessionū vulneribus.

In cap. V.

Bilem quidem in istis redundare, iracundia significat: atram verò bilem iracundiæ vehementia ac feritas) etymon est vocabuli *μελαγχολικός*, in quo nomine, inquit, *χολὴν* irā interpretamur, & *μέλαιναν* multam & efferatam.

Et animi angore) *θυμὸν* lætitia. Interpretis lectio magis probatur, qui legit *ἀθυμίαν*.

Accusanda) causanda, id est causa est.

Rarius autem quàm viri, sed deterius mulieres furiis agitantur) Aliter sonant Græca. Ac viri quidem, inquit, furere &



melancholia corripuntur, aut etiam vi-  
ris iuniores: sed deterius quam viri mu-  
lieres ad insaniam aguntur.

Quotquot enim à naturali statu, &c.  
Græca habent in hunc sensum, Quæ e-  
nim cūque refugiunt & auersantur, nō-  
dum in malo, prouident insomnij occur-  
su: ad mutādam sententiam faciles sunt,  
turpes, parci, non munifici.

Melancholicum visum esse) adde quæ  
interpretis omisit. Hic verò nec amorem  
in se nouerat: at vbi puellæ, &c.

In cap. VI.

Quippe & vinum mētem inflamat,  
& per ebrietatem delirare cogit) nam &  
vinum in ebrietate ad mentis perturba-  
tionem accendit.

Nam repente hæc adueniunt) & cele-  
riter conquiescunt. Temere enim orta,  
facilius consistūt.

Et viri) & quibus omnium vigor inest.

Quibus obuiam fiunt, non sunt infe-  
sti: ita se habet huiusmodi furoris spe-  
cies) posterior pars abūdat. Græcè enim  
est tantum, Non tristis est præsenti-  
bus species.



Et obuios quosque male habuerunt)  
quæ quidem præsentibus non sine peri-  
culo calamitas est.

Monstruosa quædam cogitant) visa a-  
liena gignuntur.

Hæc erat inter locum illum, & viri  
mentem cognatio) & eadem mētis quæ  
loci dilatio erat, id est tantum mentis  
habebat, quantum locus protēdebatur.

Altero alterum inuicem lædente) pa-  
riter mutuis adiumentis alterum alteri  
opitulantia.

Verum præcipua furoris & melancho-  
liæ sedes, &c. Verum in infania & furo-  
re vis mali hæret in visceribus, quemad-  
modum phreniticis magnam partem in  
capite & sensibus.

Anxij sunt) fastidiosi.

Neque eos etiam in publico ventrem  
exonerare pudet, ad mutua & familia-  
ria colloquia pigri sunt) idem lapsus qui  
in capite de Satyriasi. Interpres enim le-  
git ἀφ' οὗ pro ἀμφ' αὐτόν. adde etiam  
quod verbum ὁμιλῶ eum fefellerit.  
Sensus enim est, Effrænatus est ad libi-  
dinem impetus, vt ne in propatulo



quidem verecundia sit aut cunctatio cō-  
plexus.

Quidam immensum spatium decur-  
runt, & quo peruenturi sint nescientes)

Quidam effrenatè cursu rapiuntur, igna-  
rique eodem reuertuntur: alij longo in-  
teruallo se ad suos recipiunt.

In cap. viii.

Si ab externa causa) alias interna.

Genus homines empyj) id genus mor-  
bi empye, id est purulentia vocatur.

ἐμπευοι legit interpres.

Angor, fastidium.

Tumida, excarnis) non est in Græco,  
excarnis. nam quod vnum exemplarium  
veterum habebat κοῖλον, vitiosè repeti-  
tum è proximo videtur, & mox sequi-  
tur, excarnes sunt.

Buccarum tenuia dentibus inhærent)  
buccæ graciles faciunt vt dentibus pro-  
pius admoveantur.

Tenues enim) abundat cōiunctio.

At spina) spina enim.

Porro senes in hoc malum, frequen-  
ter non incidunt) exemplaria Græca qui-  
bus vsi sumus, negatione non habebant.

Ac



Ac senes quidem, inquit, frequenter hūc morbum patiuntur, & minime euadunt.

Tussi vsq; ad phthifin) vsq; ad phthoē, id est tabem.

In cap. IX.

Grauitas potius quàm dolor) grauitas aut certè dolor.

Quoniam concoctio non fit qualis antea, inde caro consumitur) Concoctio enim antea familiaris abest, & bona corporis habitudo.

In cap. XI.

Materia verò craffi interiūsque abdi ti humores.) materia verò humidi, craffi, glutinosi humores. Interpres legit *κολωδία*.

Morbi verò incipientis) futuri morbi: vel poti⁹ dilationis morbi, *μελλισμῶν*.

Multum & frigidum aerem cupiunt) subdiuo ambulant) in Græco *ἐπιθυμῶν* dandi casu legatur, aptius erit, hoc sensu, Multi & frigidi aeris cupiditate commoti, in locum subdiuo proficiscuntur.

In cap. XII.

Interdum & senes in hanc labem incidunt, & exterriti.) Ea correptis leui mo

Kk



mento ad perniciem opus est) si quando  
senes quos facile hic morbo capit, & hor  
rore perculsi, eo vel leuiter tententur,  
lecto in quo mortem obeant, componan  
tur, idest non conualescent, mortem non  
euadent, si semel hoc morbo vexati de  
cumbant.

In cap. XIII.

Venter squallet) alius sicca est.

In cap. XIII.

Increscere visus est) intumescere.

In cap. XV.

Et sy uestris mustellæ species est) Hæc  
de suo addidit interpres.

Atque adeo istorum causa & ipsius bi  
lis causa est) Atque istorum quidem caus  
sa est: ea verò & genera bilis sunt.

Tenuioris generis) omisum, Aut ad li  
uidum atrumque vergens.

In cap. XVI.

Siquidem ab omnibus morbis propa  
gatur & emanat) Morbus autem in mul  
tum tempus extrahitur,

Intestinorum difficultas adest continua)  
Morbus iste parua quædã dysenteria est  
cōtinua: nonnullis, morborum reuersiones.



Quando enim horum singula quæ aderant non amplius reuertuntur, tunc sequitur corporis grauitas ) Quo tempore eorum singula quæ aderant nulla redeunt. Grauitas corporis adest, &c.

Decubentibus autem partes decliues atque iacentes) inclinata fœmora, decubētibus. Interpres pro *μηρία, μόρια* legit. In illas decumbētes partes) in illa, subaudi fœmora.

IN LIB. II. DE DIUTURNORUM morborum signis,  
cap. I.

Si paulum superficiem secueris) si quā partem multum secueris. Interpres legit *ἐπιπολῆς*.

Si abdomen perforaueris, parum admodum humoris effundes. Ab interiori namque parte vesica occlufit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succ<sup>o</sup> emanabit) Nam si abdomine perforato, parum admodum humoris effundis, intus vesica occludetur: at si instrumentum impuleris, iterum effluet.

Kk 2



Nam siue ex intestino colo , siue ex ventre ferantur , qualis sit ipsarum generationis modus , quid dicam nihil certi habeo) neque enim de his quid dicā habeo. Nam siue ex colo, siue ex ventre proficiantur , quis coagmentationis modus sit?

In cap. II.

Itaque potius insatiabili auiditate) legendum, potus.

In cap. III.

Aut si vnus sit magnus , locorum angustiiis intensus inhærescit. Atque si vtroque in rene hæc fieri vsu veniat) Si magnus vnus locorum angustiiis inhærescat & in vtroque rene hæc fiant , interelusa vrina, &c.

Multum sanguinis limum elixatū) à sanguine, Græce est.

In cap. V.

Neque id quod fit ) neque geniturae Auor, sensu percipitur.

In ap. VI.

Corde periculosa vicinia ad tenorem animique alacritatem siue abiectiōem ob animæ consensum præcipue stoma-



chi facultas cōfert) cordis vicinia ad te-  
norem, animique alacritatem siue abie-  
ctionem, ob animæ consensum, interest.  
hæc prima est & præcipua stomachi fa-  
cultas.

Delectationis hi fructus sunt) volupta-  
tem hæc pariunt.

Ore conterere, in deuorando dolor,  
& maior conflictatio.) In cibis ore con-  
terendis angor, in deuorandis dolor ma-  
ior adest.

Quibus molle cubile est nuda humus,  
stragula vestis, ignobilis) quibus molle  
est cubile humi sine stragulis, vile indu-  
mentum.

Diuitiæ autem adeptio atque vsus di-  
uinæ sapientiæ) diuitiæ autem, diuinæ  
intelligentiæ atque copiarum abundan-  
tiæ, vsus.

Non saturandæ famis, &c.) non vt ci-  
bis satientur, sed vt vitam sustineāt dun-  
taxat: non vino indulgēt, non exhilarā-  
tur: non vagantur & obambulant, non  
exercent corpora, non fiunt carnulen-  
tiores.

Atqui ob stomachum erga cibos male



affectum, cito satiantur cibo vſitato) ſto-  
mach<sup>o</sup> quoq; iis malè erga cibū affectus  
eſt: ac celeriter aſſuetoq; ſatiantur, eoq;  
vili & ad manū, quòd variis dapibus nō  
ſint aſſueti.

In cap. VIII.

In ieiuno vbi affectus maxime vrget)  
in ieiunio, ideſt quādo quis ſe à cibis ab-  
ſtinet, quo tempore morbus viget. Ne  
quis de inteſtino dictum accipiat.

Propoſiti inteſtini dolor) morbus.

In cap. IX.

Aut potio ryeon appellata) bryteon  
videtur legendum, vt ſupra libri primi  
cap. 9, quæ potio ex floſcibus ſeu vina-  
ceis conficitur.

Maiores ſunt vlcera) profunda, caua.  
Et viuunt) noxæque ſoluti viuunt.

In cap. X.

In iſtis enim calidum quandoque re-  
frigeratum eſt, &c.) Si enim quod in iſtis  
eſt calidum refrigeratum neque conco-  
quat, neque ad diſtributionem incite-  
tur, ſed præ imbecillitate retinere non  
poſſit, omni cōfectione alimentum de-  
ſtituitur.



Sed leuis mouenti) legendū, leuis mo-  
menti.

Et malus habitus qui decumbere non  
cogit) & malus habitus quem quis se eri-  
gendo ac stando comparauit.

In cap. XI.

Anxietate vexantur) fastidiosæ sunt.  
Minime autē puellis, quibus magis al-  
bi nocent) puellis vero minime albi no-  
cent.

Quod si altius penetrēt, &c.) Si verò al-  
tiora fiant, & vlcerum ora immitia sint  
& aspera, sanies quædam tetri odoris, &  
maior quàm antea dolor existit. exedit  
autem vluam vlcus.

Si grata odoramenta naribus subie-  
ciat) vt grata odoramenta olfaciat.

Et prius remedia mitigatoria, &c.) &  
antè mitigatoriis vterinis oblinatur.

In cap. XII.

In capite feruntur) abundant hæc ver-  
ba, in capite.

Viri facilius in hunc morbum incidūt,  
& ex mulieribus agiliores) viri vt faci-  
lius in hunc morbū incidunt, ita mulie-  
ribus leuius torquentur.



Auari) munifici.

Tanquam mortem rursus subituri) tā-  
quam iterum mortem euasuri.

In cap. XIII.

Facies fœdas) ignobiles & obscuras.

Cum musto reiecisse, quoniam in mu-  
sto fera extincta fuerat: iterumque, &c.)  
cum musto reiecisse. Postquam autem  
fera in musto extincta est, auidè largi-  
terque hominem è musto bibisse.

IN LIB. PRIMI DE CVRA-  
tione acutorum morborum,

cap. I.

At si vltra conueniens tempus, vtpu-  
ta sexto aut septimo die superueniat, venæ  
sectio dimittenda est. multo enim ante,  
&c.) At si vltra conueniens tempus, vtpu-  
ta sexto aut septimo die accedat, multū  
ante iudicationes in acutis morbis va-  
cuandum, aut pharmacis vtendum, &c.

Aut succi ad amaræ fabæ magnitudi-  
nem ex aquæ cyathis duobus) aut amari  
succi cyathum cum aquæ cyathis duo-  
bus. Interpres pro *ἡνάθου πικροῦ*, legit  
*ἡνάθου πικροῦ.*



In cap. ii.

Herba verò mercuriali assidue uti-  
tor) cum herba verò mercuriali conco-  
quito.

Manus ad humeros usque, &c.) Manus  
ab humeris usque, pedes ite ab inguinib<sup>9</sup>.

Sic enim magis flatus digerit) cum  
his verò magis quoque flatus digerit, si  
hæc adiungantur, & terebinthinæ resi-  
næ pars vna.

Sed pruritus & dolorem non gra-  
uem) sed pruritus doloris expertem.

Quale est cyprinum, aut gleucinum,  
aut Sicyonium) aut cyprino, aut gleuci-  
no, aut Sicyonio. ne ista medica mento-  
sa putes.

Imperitia enim timoris & cautionis  
causa est) timor enim & cautio imperi-  
tiæ causa est.

In cap. iii.

Nutricatio & vètris calefactio) nutri-  
catio & calefactio, ventrisque humectatio.

In cap. iiii.

Exanimes sunt, quorum & corpus &  
mēs stupet &c.) in totum enim mortem  
præ se ferunt, si & ægrotus senex sit, qui-



bus familiaris morbus est. non enim liberantur, tum propter mali magnitudinem, tum propter ætatis calamitatem.

AEgrotis verò id inutile est: illæ autē inhærentes corpori in colliquatas partes à calore sorbentur.) id verò laborantibus inutile est, si corpori inhæreat, inque partibus colliquatis, & à calore sorbeatur.

In cap. V.

Id intra anum intrudito) lege intrudito.

In cap. VI.

Fouenti sunt) lege, fouendi sunt.

In cap. IX.

Porro igne vitium adurere, cum in superiori parte sit, imprudentis esse propter isthmum iudico) Porro igne vitium adurere, subleuat: at imprudenter id fit propter isthmum.

## IN LIB. II. DE CVRATIONE acutorum morborum.

cap. I.

Repletioque pulmonis) inflatio seu tumefactio. verbū etiā significat ardorem.



In cap. II.

Gummi etiam cum planta porri & spinæ lachryma) gummi etiam cum planta, porrum, spinæ lachryma.

In cap. V.

Oleum bibat) adde, multum.

Et ipsarum succus itellinæ aqua potui detur) & ipsarum aut tellinæ succus, aqua potui detur.

At si dolor absit) at si pus absit.

In cap. VI.

Hirundines quàm scarificationes) scribe, hirudines.

In cap. VII.

Exercitatio modica) gestatio parua.

In cap. VIII.

Si pauperes ægroti sint) melior alia lectio, & πνοι, id est si pus abest. sequitur enim, Si ad pus vergat.

Quæ bistimus appellatur) Bistimus medici cuiuspiam nomen videtur huius medicamenti auctoris, ut sit legendum, quæ Bistimi nuncupatur. nisi mauis legere Bistini, cuius confectionis multis locis Arateus meminit.



In cap. ix.

Vnde mars cum maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit ) erat mors, ubi, mars, reposuimus. Locus est quidam ex Homero.

In cap. xi.

Locus inter fœmina & inguina plechada Græci vocant ) & locum inter anum & scrotum (perineos Græce dicitur) Abundat sententia posterior Græce enim est τῶν καὶ πλεονεχάδα, quam vocem quidam interpretans ad marginem adnotarat, τὸ περίον: quod interpretem fefellit.

IN LIB. PRIMI DE Curatione morborum diuturnorum, cap. II.

Verum non semel totum detrahere, &c.) maxime verò conducit, non semel detrahere, si & vires copiosam sanguinis detractionē patiantur, & in his ipsis continenter morbus altius radices agat.

Alio loco descripsimus) describemus.



In cap. iiii.

Vena cubiti recta, &c.) vena frontis  
recta secanda, aut quæ vtrunque ad an-  
gulos nari circumponuntur: cucurbitu-  
la vertici affigenda, arteria secandæ:  
caput radendum.

Ad magnitudinem amæ, idest placen-  
tulæ) ad magnitudinem hamæ, quod in-  
strumenti nomen videtur. si placentulæ  
significasset, ἄμντος, opinor, scripsisset.

Mentem labefactat) mens facile per-  
ueri potest.

Sed rectæ & longæ & lenes ac super-  
rioribus locis exercitationes fiant) sint  
autem ambulationes rectæ, longæ & le-  
nes. Interpres pro οἱ πρὸ ὀφθαλμῶν legit  
ὡς ὁπτατοί.

Si quidem ita assueti sint, optimum pa-  
nem solum assumant) si quidem ienta-  
culum assumere sint assueti, pane solo  
contenti sint.

Salsamentum recte conditum) salsam-  
entum tempestiuum, & veris tempore  
conditum.

in cap. V.

Ipse naturæ prædium est atque ali-



metum) praelium malè erat prius.

In cap. xiii.

Illud purum syncerumq; sit) puri tum  
syncerique sint.

Afari radice) adde, phu.

IN LIB. II. DE CVRATIO-  
ne diuturnorum morborum,

cap. VII.

Vomitibus ex radiculis vtitor) à radi-  
culis, seu ab esu radiculorum.

In cap. xiii.

Cum vini Cretici cyathis duobus) cū  
vini diluti ac temperati cyathis duobus.

Quod genus avis est, &c. ad eum lo-  
cum, Simile) verba sunt interpretis.

Simile enim in dissimili) Simile enim  
vnum dissimili, &c.

IN RVFFI LIBRVM PRI-  
mum de partibus corporis hu-  
mani. cap. viii.

Quos nonnulli cranteras appellant)  
Hæc verba huc pertinere non videntur,  
sed subiicienda his, Ab vtraq; parte vnus  
est. Ex Polluce.

In cap. ix.



Quæ & ligula) lege iugula.

In cap. XIX.

Meditullium diploen nominant. vbi  
verò nasi initium, eius crebra ibi fora-  
mina ithmoide) meditullium, vnde na-  
sus inchoat, diploen nominant. cuius cre-  
bra foramina, et moide, &c.

In cap. XXXIII.

Omnes verò magnæ venæ ventres ap-  
pellantur) cauæ appellantur.

IN LIB. II. cap. VIII.

Pinei nuclei effigiē adeptus) forma ro-  
tundus. *αυγινοειδής*; interpres legit.

Hæc cursim Latina cum Græcis cōiun-  
gentes obseruauimus, h'cque adnotau-  
mus, non vt aliquid interpreti bono de-  
traheremus, cuius meditatio docta non  
mediocriter nobis in edendis Græcis  
profuit, sed vt ipse his pauculis admoni-  
tus, in studiosorū gratiā dū vitā super-  
est, op' regnoscat, & melius quàm qui-  
uis alius, inchoatū opus tandem absolu-  
tum emittat.



## ESVIDA.

Ruffus Ephesius medicus, temporibus  
Traiani cum Critone vixit. eius plurimi  
libri feruntur, ex quibus & hi sunt, De vi-  
tus ratione lib. 5. De nauigantium vi-  
tus ratione 1. De vulnificis medicamē-  
tis 1. De membrorū contusione 1. De fi-  
cis 1. De antiqua medendi ratione 1. De  
lacte 1. De melle.



R V F F I E P H E -  
 sij de vesicæ renumq;  
 affectibus.

**S**ingulatim perscribā  
 morbos omnes, q̄ ve-  
 sicæ, & renibus inna-  
 scuntur: eosq; vt præ-  
 scire & medicare con-  
 ueniat. Ac in renibus  
 quidem haud temerè vnquam pera-  
 cuti morbi obueniunt, tam exitiabiles  
 tamen, alibi quàm qui maxime: siquidē  
 hulcera inibi coalita, & suppurata, pro-  
 cessu temporis exitio compluribus ex-  
 titerunt. Nam licet renes, cū inflam-  
 matione tentantur, peradmodum do-  
 leant, non tamen morbus acceleratur:  
 vesicæ vero inflammationes acutiores  
 sunt. his enim laborantibus promptius  
 cōtingit vrinas intercipi, febricitare, de-  
 lirare, & multa itidem euomere mera,  
 & impermixta. Acutiores etiā sunt reli-  
 qui vesicæ morbi. namque perniciosior

LI



locus est, qui que cum primum ab infantia morbis solet esse obnoxius, atque acutis admodum. Renum vero doloribus citius & grauius vexantur senes, quam iuuenes. Communiter autem omnia renum, ac vesicæ vitia, tractatu morosa sunt, præsertim si hulus insuper accesserit. Lotium enim continenter influens, vnâ extimulat, & ad cicatricem perducere non patitur. Quæ huiusmodi cum sint, & prædiscere, & curare oportet.

#### SIGNA RENVM LABO- rantium inflammatione.

**I**Nflammationis renum notæ sunt, dolor infra lumbos, vt incedēdi, aut erigendi sui, egrotis potestas negata sit: & si steterint, aut quocunque modo succutiti contigerit, continuo lamentantur, & reclinati in vêtrem non sufferunt, resupini dolore videntur non nihil releuari. renes enim lumborum teneritati continentes sunt & proximi. Porro cuius hunc in modum affecto tolerabilius est placidè iacere, atque acquiescere. Nam



## DE MORB. VES. 51

corpus inclinando, dolor ingrauescit  
cruciatusque cum cæteras partes per-  
meât, tum hepar supernum afficiunt. re-  
nes nanque magnæ venæ communione  
illi malum suum communicant, præser-  
tim si horum dexter inflammatione ten-  
tetur: est enim hic ipse ieceri propin-  
quior, & eius particulam, & segmentum  
attingit: sinister verò paulo remotior,  
& demissior existit. Alij verò dolores ve-  
sicæ usq; & genitalia protenduntur, & ij  
quidē continui, sed dissipati lumbos, cru-  
ra, & ilia exagitant. Aegrotantibus inte-  
rim extrema frigerit, tibiæ, & pedes præ-  
cipuè. meūt assiduè, & difficiliter: prin-  
cipio tenuia, & aquosa: inualecente ve-  
rò phlegmone rubicundiora. Et cum eò  
status progressum est, fœmora & clunes  
extenuantur atque gracilescunt, tibiæ  
debilitantur, & quibusdam suppurantur  
renes. Nam bona ex parte ita finiuntur.  
sed de suppuratis paulopost tractabitur.

LI



## CURATIO PHLEGMO-

nes.

**I**nflammationibus ita mededū: ægroti in-  
lecto cōponēdi sunt quā mollissimē &  
primū diem absque cibo tolerandi. Non  
tamen sicut in aliis inflammationibus,  
conducunt extremę inedia: sed aliquid  
assumendum potius, obseruando cum  
se febres intenderint, & quando relaxa-  
rint. Nec tantum illis profunt ieiunia,  
quantum nocent morsus intemperati' lo-  
tij. Primis autē diebus sustentandi sunt  
forbitionibus dilutis, & aquæ potu. mul-  
so verò eos abstinere oportet, nisi iam  
tum vrinas ciere consultum sit: quod ini-  
tio fieri mihi non probatur, antea quàm  
liquido constet, dolores esse sopitos: quo  
tempore equidē per vrinas purgare ope-  
ra precium fore iudicari.

## DE CLYSTERE.

**Q**uod si alius vacuanda sit, nihil tale  
moliri oportet, quale illud vacuan-  
di genus, quod medicamentis inuentū,



atque excogitatum. Eluenda tantum est iniecta aqua calda, aut maluae, aut lini, aut silicia decocto, cui olei admixtum sit, quantum usus exigit. Nec vero ita magna copia immittenda est, ne intestina completa renes comprimant: subducta aluo si necdum concedat dolor, lannam oleo calido delibutam circumpones, atque illic residere patiêre. Nec absere fuerit, rutham, hibiscum, anethum, & artemisiâ oleo incoquere.

## DE VENAE SECTIONE.

**A**crius ægrotantibus, vena secundum cubitum secanda est, & si quid inflammationis reliquum sit, emplastra illinenda sunt, primum ex farina mulso incocta, aut telino. Postea admiscere conveniet chamæpytij, polij, abrotoni, vitis nigrae, ruthae, absinthij, centauree, artemisiae, & trissaginis folia: adhæc asari, & iunci odorati. Tum non amplius emplastra mulso incoquere, sed musto, aut vino melitite, adicere etiam cū superiorū aliquo, farinæ duplum, paulò plus etiâ,



si quis efficacius cupiat, admixta cera  
sicca, & contusa. Benefacit præterea hoc  
Chryssippi emplastrum, quod ita confici-  
tur: Galbani, resinæ terebinthi, polij, fa-  
rinæ erui, singulorum pondo drachmæ  
quingenta, iridis siccae sicilique duo,  
cerati suauiter olentis hemina, farinæ  
tritici sextarij dimidium. Hæc musto  
decocta illinito, nephriticis quidem po-  
nè: ante verò vesica laborantibus. tum si  
nec emplastris cruciatus lenietur, admo-  
uendæ sunt cucurbitulæ tum lumbis, tū  
partibus infra ilia, & scarificatione san-  
guis detrahendus. Postea adhibenda sunt  
fomenta ex spongiis, faciendumque uti  
æger supra aquam caldam desideat, in  
qua papauer, anthemida, harundinem,  
iuncumque coxeris. Ceterum prius im-  
pletis oleo, & aqua vesicis, reclinandus  
erit, fouendusque molliter, & delicatè.  
Postremò his locis superponere profi-  
ciet tum cerata ex cyprino oleo, vngue-  
to rosaceo, tum malagmata odoris sua-  
uitate quàm iucundissima.



DE MORB. VES. 134  
CONTRA VEHEMENTES  
cruciatus remedia.

**C**Um dolores infestant, hæc medica-  
menta ebibenda sunt: seminis fœni-  
culi grana vicena, opij, aut panacis her-  
culei radicis sesquiscrupulum, fertulæ  
campanæ momentum, cedriæ, & scapi  
papaveris exustulati semiobolus, styra-  
cis tantundem, apij quantum tribus di-  
gitis comprehendi potest, meconij quan-  
ta est erui magnitudo: horum vnum-  
quodque subtilissimè tritum, ex aqua  
dulci potandū exhibeto. Actutum enim  
iuuabit, quantunus dolor sæuiat, &  
mollis somnus obrepet. Postea cum tem-  
pestiuum esse videbitur, his rebus partes  
tradentur quæ vrinas mouent.

DIVRETICA NEPHRY-  
ticis.

**H**Æc sūt quæ vrinas ducant: apij ra-  
dix, chamæpitys, casia, meum, cina-  
momum, polium, petroselinum, & grā-  
men: hæc in aqua coquenda sunt, & cum

Li 4



vino, aut mulso propināda. prodest etiā echinorum marinorum esus. Inter ole-  
ra fœniculus, apium, daucus, raphanus  
discoctus, & agrestia omnia vtiliter as-  
sumuntur. belle enim excitant meien-  
di voluntatem: & comprimis pastinaca,  
crithmum, scandix. Actalibus expectan-  
dum vrinas copiosas & crassas fore: atq;  
eisdem pulchrum quod subsidit: quod, si  
quod aliud, morbum diiudicat. quæ ve-  
rò aquæ, puræ, & perspicuæ redduntur,  
iudicandi sui maiorem afferunt difficul-  
tatem.

#### SUPPURATIONVM ET inflammationum sanatio.

**I**Nflammationes hoc modo perbenè  
quis curarit. Porro quibus suppurati  
sunt renes, iam ilia intumuerè, & renes  
ipfos vehemens ardor incessuit, fulua, &  
temperata meiuunt. nec iam tam acres  
sunt cruciatus, quàm antea, ceteroquin  
grauiores, & pulsantes: febres non statæ,  
sed erraticæ, atq; horridæ. Illis suppara-  
ta vt plurimum in vesicâ erumpunt, quæ



rupturarum est potentissima. aliquando in intestinum abscessus rumpitur, ibi se alleuante purulenta materia, & putrescente. Praxagoras referebat visum sibi quendam, qui per sedem urinam excreuisset, superuixissetque annis duodecim. an ne etiam pluribus, quod tunc temporis ipse discessisset, nec de eo quicquam audisset postea, ignorare. Sunt alij quibus abscessus collectio extrorsum abruptur, & iliorum cauernas peruadit, quas pure, & lotio cōpleri necessum est, ibique illuuiem adharefcere: deinde progressu temporis in anum extrudi, atque illac foras tendere. Nonnullis verò extra renes frangi cunctatur, & illic ad multum tempus remanet vsquequo exuratur, aut quocunque modo se discindat. Quibus autem in vesicam effunditur, illi principio mucosa, & cruenta meunt, instar apostematis excisi: deinde pro vlcerum competentia, atque ratione. Nam si malignè exasperentur, vt in aliis hulceribus putrescētibus vsituenit, multa redduntur foetida, liuida, & mucosa, atque etiam quædam ca-



runculae oblongae, similesque membra-  
nis absistunt. si hucera maligna non  
extiterint, pus album, & æquabile, sine  
græcolentia, & copia paucum excerni-  
tur. Iam verò si ren ad suppurationem  
inclinare videbitur (videbitur autem  
prædictis signis) maturadum est, quoad  
eius fieri potest, insubidè atque diligen-  
ter, & ita viam quendam moliri atque  
comminisci ad puris exitum, quod sæ-  
pius in vesicam diuertitur. Proinde spon-  
gis identidem fouere oportebit, & lo-  
cum farina hordeacea, cum ficuum de-  
cocto oblinere: verum ficus easdem in  
mulso aut vino decoquere consimiliter  
oportebit. Bonum erit etiam ficus ipsas  
tenuando, & diducendo admiscere: & co-  
mam tusam absinthij: quin & chamelea,  
iridis, bryoniaeque radicem excretam.  
Hæc siquidè tum mitificant, tum vrinas  
proliciunt. Expedit autem mingendi fa-  
cultatem provocare. Ideo agroti erunt  
inuitandi, vt aliquid horum bibant quæ  
vrinas cient: ad quem usum accommo-  
datissimum erit amerinae semen ex vi-  
no aut mulso potum. Conferet quoque



DE MORB. VES. 539

ferulæ radix, & anchusa, & arum, siue  
vnumquodque per se datum, siue cū vno  
horum aut altero permixtum.

DIVRETICA QVAE AB-  
fcessus frangunt.

**P**rodest etiam illud: Origani, & dauci  
sextarium, pseudodictami eandem  
mensuram in vinum album, odorūq;  
coniicito atque recondito. Cum verò  
necesse habebis, fumes cyathos quatuor,  
& affuso aquæ dimidio, permixtāque  
drachma ex foliculis ruthe subtilissimi  
pulueris, propinabis. hoc pus educet, &  
vrinas copiosè. Si tamen omnia tentan-  
ti labor frustrà cesserit, necdum ruptum  
sit empyema, clysteriis acribus ventrem  
eluere oportebit. Constant autem ex ve-  
ratri nigri diluto, in quo etiam perma-  
duerint raphan<sup>o</sup>, allia, & pulpa colocyn-  
thidis. licebit quoque in muria, vel aqua  
marina, vel aceto macerare: tum pauco  
oleo admixto, vt lubricum sit, his rebus  
aluū perfundere: iuberéq; vt quàm pote-  
rint diutissimè retineant. Eo sepe puru-



lenta collectio frangitur, & confanescit: nihilominus tamen, spongiis usque fouere conuenit, & emplastra inducere, ut dolor omnis minuatur, & pus ex facili profluat.

QVAE MOVENDO VRINAS vlcera detergant.

**D**anda itidē sunt quæ per urinas purgant, hulceris habita ratione: quod si tractabile sit (id autem denotant febres, & dolores leuiore, & quæ in urinis apparent æquabilia, alba, & inodora, cum facilitate miendi) mitiora exhibeantur. Cuius generis sunt peponis semen, palmarum decoctum, iris excepta melle, & ipsum mel per se. Et si quis valētius purgare volet, usurpet capilli veneris decoctum cum aqua mulsa, galbanum, opopanacem, resinam terebinthi: tum in aqua liquefaciat, atque ubi aqua referbuerit & substiterit, percollet, & ex mulso, aut vino bibendū exhibeat. Hæc quidem hulceribus minus morosis atque difficilibus auxiliantur.



CATAPLASMATA HULCE-  
ribus putrescentibus.

**A**Duersus maligniora hulcera valen-  
tioribus opus est, & intro assumptis,  
& foris admotis: intus quidem, quæcun-  
que iam dicta sunt ad rumpendas colle-  
ctiones conuenient, Et cum inu. Aethio-  
picum cum vino dulci, rutha cum mel-  
le & vino, canchrys cum semine porri  
ex vino molli & delicato. Extra verò  
proderit erui farinam in vino & mel-  
le coctam illinere: & rosas aridas tritas  
que cum lente & melle, aut baccas myr-  
ti alicui horum incoctas. Quippe hæc &  
id genus omnia hulcerum putredines  
inhibent: verum oportet totos lumbos  
& ilia perlinere. Bonum etiam aliquod  
medicamentum iniicere eorum quæ dy-  
senterica appellantur, si vehemētius de-  
pascatur hulus: si verò præ dolore &  
inflammatione pus foras prodire nō po-  
test, abluere oportebit tenui cremore  
ptisanæ, & lacte, & huiusmodi tepida fo-  
menta adhibere, & supra aquam tepidā  
sedentem collocare. Ita enim percom-



modè exierit. At si propter crassamentū  
retardetur, bibendum decocturam apij  
chamapityj, absinthij atque origani. hęc  
taliter facienda sunt.

## DE LACTE.

**P**ostmodum bibendum lac cum mel-  
le, cū primis asininum aut equinum.  
Siquidē eius magnus vsus est ad hūlcerū  
mundiciem. Quando autem nihil am-  
plius repurgari indigebunt, & pauca fu-  
bluuies effluet, morsusque vrinarum re-  
tundentur, atque homo corpus recupe-  
rare & pinguescere laborabit, tum lac  
bubulum citius quā ouillum obtule-  
ris. Crassum enim magis, & minus flui-  
dū. Dabitur vero ad duas, tres, pluresue  
heminas. Nec cibi quicquam præterea  
ingeretur, quoad sumptum hoc perco-  
ctum sit & mitificatum. Quin immò se-  
rum ipsum lactis tum intestinorum hūl-  
cerum efficacissimum est remedium, tū  
grauiter manantibus hūlceribus mitissi-  
mum accidit, & sub manu corpus alit:  
maximè in syntecticis, hoc est defectis



## DE MORB. VES. 543

& quasi strigosus, quorum plurimi interest, ut ad habitio-rem corpulentiam quam primum reducantur. quapropter siue hac victus ratione, siue alia procures, uti nephryticus pinguescat, nihil aberrabis. Itaque cubantem & molliter fricare, & quotidie expediet: alere autem, initio lacte ut dictum est, & forbili ptisanario, amyliis panibus, farina elota & incocta lacti ac placentis, suminalibus confractis in capi iuscula pingua. dabis etiam pulmentaria ex ciceris, phaseolis atque eruis: sed eruum prius oportebit, ut ita dicam, edulcare, hoc est macerare ut amarorem deponat, & per se decoquere, aut cum aliquo dictorum leguminum.

## DE OLERIBVS.

**O**Lera conuenientia his de quibus agitur, malua, lapathum, blitum, portulaca, asparagus, cucurbita, coctus cucumis, & lactuca cocta: prodestque nihil crudum comedere. Hæc autem & ventrem leniter subducunt, & hebetant vinarum acrimoniam: atque in processu iam ad



plenum extinctis febrium ardoribus, & corpore reſecto, carnibus cibare oportebit.

## DE CARNIBVS.

Carnes in hoc morbo laudo hœdorũ, agnorum, carnem ſuillam probo, aues tenellas, ex piſcibus ſaxatiles coctos, quin & ſquatinas, raias leues, torpedines, & cætera id genus cartilagineorum.

## DE SECVND A MENSA.

ET ſi quid in lōgo morbo bellariis op<sup>o</sup> ſit, à carycis abſtinendum. hulceribus enim aduerſantur. veſcendum verò palmis, nucibus auellanis, ſtrobilis & vua paſſa: amygdala etiam toſta danda ſunt ex melle, vinumque bibendum mellei coloris. Acetum autem atque omnē ſaſſiſlaginem, in poculentis atque eſculentis iuxta, vitare oportet. Hæc igitur ſunt eorum quibus renes dolent pulmenta & edulia. Quod autem ad reliquam vitæ rationem attinet, confert minimè feſtinationem, ſed tardè atque ocioſè eos ad exercitia



ercitia motusque produrere. namque agitatio cum aliis exulceratis omnibus, tum renum hulceribus vehementer est inimica. conducit igitur quietum reficere atque recreare omni vitæ mollitie voluptuaria, frictionibus quam leuissimis, balneis & integumentis.

### QVAE VOMITIONEM excitant.

**R** Epletionibus subortis faciet satis illasque leuabit fatus per sicca & vomitus: per inferna vacuare vel detrahere nihil est necesse, præterquam dictorum ciborum quotidiana retrimenta: ac ne impendiò mouendo crucietur, impera vt intra modum repleto vetriculo. vomat, assumpto etiam eorum aliquo quæ nauseosa sunt & vomendi appetitionem mouent, cuiusmodi sunt pinguia & dulcia & prægrandes cucumeres: qui si non sint ad manum, substituantur eorum semina melle intrita, & pulticula: potusque dulcis super his ingestus largiter: nec solum aduersus saturitates & expletiones

Mm



vomitionem commendo, sed etiã mihi videtur (si quis fortè periclitari audeat) vomendo sæpius, non modo renum, hucera, verum etiam eius loci vitia omnia breui posse consanari. postmodum autẽ cũ vsque adeo processum erit, vt iã ex morbo reualuisse compareat, & motiones salutariter posse perpeti, primum spatium poterit paulatim & modicè, idque per planitiem: status verò fugiet, cursus, saltationes, subitãsque declinationes, & inflexiones corporis: deinde quo firmior & valentior in dies euaserit, eo plus deambulationibus exercitationibusque alijs licebit apponere. Alia exercendi sui genera sunt, colluctationes manuũ, frictionesq; leui attactu & manu suspensa. Ea quidem est in nephriticis viuendi præceptio: nunc si suppuratio foras eruperit, an etiam manus tractatione atq; opera vtendum sit nec ne, luculenter apparet. Antiquitus suppurata inurebãt, aut decacuminabãt, hoc est scalpello deputato fastigio ressecabant vt pus proflueret. \*



547  
EIVSDEM AV-  
ctoris fragmentum

DE MEDICAMENTIS  
purgantibus.

\* Et soboli procreandæ conferre videtur.

Filicula pituitam, bilem aquâsq; detrahit. danda excepta mulso aut aqua, rafa radix, ad drachmas duas. Non minus est salubre bullitam ad salgama, siue cum falsamento, ante prandium comedere. purgat item non molestè cum ptisana & cum iure avis domesticę decocta: bella fuerit purgatio, vt quæ adolescentibus etiam satisfaciât: in morbis vero nihil tâta purgatione opus est.

Iris quidem pituitam, mucosa excrementa, atq; etiam biliosa deducit: quin & sanguinem, & melancholiam trahit, si præter modum dederis. Quare sola vt mediocriter purget, cyathi dimidium sufficiet. admodum enim stomacho est ingrata. Radicis vero dandæ

Mm 2.



drachmæ (7) in mulso, lienosis, quotidiana & quartana febre laborantibus, anhelatoribus, tussientibus, & colicis.

Colocynthis pituitam purgat, & bilē meram. Eius pulpæ danda est drachma vna in mulso: si quis tamen mitius purgare volet, semen eiiciendum est, & affuso vino dulci intra corticem, lento igne coquendum, quousq; rectè incaluerit, tum his propinandum offeratur, quos non potenter exinanire cōueniat, & quorum cutem liuidæ papulæ deformarint. In totū verò colocynthis prodest suspiriosis, laterum doloribus, inueteratis capitis cruciatibus, singultibus, & aduersus obtusam aciem oculorum. Etsi enim oppido quā amara est medicina, tamen in posterum efficit, vt illis sit vsus cibi gratior.

Calcifraga aquosa, pituitosa, biliosa, & que vacuat. drachmis duabus in mulso pota sufficit.

Peplos & peplis gentilitate & figuræ cognatione proximæ, in purgando pituitam, & bilem extrahunt cum flatibus pro copia: ficcata etiam benignè purgāt.



# DE PURGANT.

549

Aloe celeriter purgat, nec vero ut absinthium gratissimū est stomacho. eius duæ drachmæ cum mulso potæ, sufficiunt. pituitam & bilem attrahit. Bonū consimiliter quotidie eam assumere à prandio. humores siquidem permeat & subducit, nec cibi digestionem abolet. præterea non siticulosum reddit, sed famelicum. terere autem oportet cū brasicæ aut lapathi succo, & formare catapotia partim ciceris, partim fabæ magnitudine: & cum exinanire collibuerit, duo aut tria ingerere. Cōuenient etiam eius globuli cum resina apparatus, aut cū melle cocto, eorum causa maximè quibus intolerabilis est amaritudo. Quinetiam scāmonio vtiliter admiscetur, aut corū alteri quæ stomachi dissolutionem faciunt præterquam quòd febres quotidianas sanat, arquatis, & iocinoris vitis subuenit: cibi fastidia & cruditates emēdat in hominibus, & perinde in mulieribus. fuissetque optimum medicamentum pueris, nisi amarum esset supra modum. puerilis enim ætas à rebus vsq; adeo amaris vehementer abhorret.

Mm 3



Hippophaes & hippophæstum pituitam, bilem, aquasque purgant largiter: hippophæstum aquæ vitia. Præcipuè comitialibus datur, syderatis altera manu, aut crure, obliuioſo, difficulter ſpiranti, & his qui rectà ſpirare coguntur: adhæc his omnibus quos perpetuus variuſque tremor exagitat. Si valétius purgare vo- lueris, dabis ſucci per ſe obolos tres: ſin- autem ex eo quod cum farina erui cō- ſicitur, drachmam vnam ex mulſo. ſed omnia efficacius hippophæstum: ideo dandum minore copia.

Clematis pituitam & bilem purgat. eius fructus ad drachmā vnam exhiben- dus eſt cum mulſo.

Pycnocomum bilioſa detrahit. eius radicem comedendam dato. ipſa enim per ſe purgat, rotunda eſt, exiguo malo admodum ſimilis.

Vites purgant tum bilem, tum pitui- tam. Dantur drachmis duabus. ſatiuæ uſus eſt inſignis contra morbum cadu- cum, & inſaniam: ſylueſtris vero ad a- quam intercutem.

Thymus, epithymum, amaracus, &



DE PURGANT. 551

cunila, bilem atram pituitamque purgant: sed ad omnia plus potest epithymum, tritum & cretum dandum est in vino dulci, semunciae cum sicilico mensura, aut etiam maiore. Egregie enim humores trahit. ac si à medicamento statim prandere velis, nihil iustam purgationem impedit: manè vero purgare oportet cum oxymelite sale adiecto. Cōfert etiā epithymū inflationibus, & interaneis morbis, crudis, & his quibus hepar, aut liē pregrauatur, atq; etiā difficiliter spirantibus. Thymus detrahit melancholiam, & pituitam affluenter. Come eius acetabuli mensura cum melle danda suspiriosis, tussi inueteratae, & his qui humores crassos in ventriculo continent.

Amaracus siccus drachmis quatuor melle exceptus, admixto sale, eandem vim habet: similiter & origanū. Danda sunt sicca acetabuli mensura cū mulso.

Papauera leniter subducunt: seminis vtriusque sufficit acetabulum in mulso.

Cucumeris radix epota facit ad aquā inter cutem: purgat pituitam & bilem:



verum succi ex radice satis est trium  
obolū pondus: corticis triplum: elatyrīj quantum paulo post.

Heliotropium minus, quod tricoccū dicitur, pituitā purgat, purgat & bilem. satis facit manualis fasciculus decoctus moderatē ex aqua, & potus affuso vino.

Sesamoides minus pituitam quoque & bilem ducit: seminis mensura acetabuli dimidium.

Tithymalus helioscopios (est autem omnium esularū imbecilimus) detrahit etiā ipse biliosa & pituitosa retrimenta, siue succum, siue semen, siue folia dederis. est tamen succus efficacior, secūdo loco semen, extremo folia. Succī vero drachmę pondus satis est. Ex aliis detur quantum vires ferunt. Purgat itidem cyparissias, sed cum maiore efficacia, idcirco minus dandū. Inter esulas quę esula propriē dicitur, potentissima. nam seminis si solum expressum succū intra carycam dederis, purgabit insigniter: folia perinde, per arida, & mulso soluta, quanta est seminis minus mensura acetabuli.



# DE PURGANT.

553

Chamelæa pituitam, bilémq; vacuat. folia terere oportet, & melle cocto excepta exhibere: acriter enim mordet. nonnulli abfinthiū admiscentes, in catapotia digerūt. pōdus idoneū drachmę dua. Brassica marina, vt cętera olera cocta & cōdita estur: stomachūq; pessimē subuertit, & celeriter perturbat.

Lathyreos comesta grana decem faciunt satis: gustatu dulcia sunt, & pituitam, & bilem affatim detrahunt. sufficiūt etiam succi ex mulso liquati, terni oboli. folia etiam licet ad eundem vsum iu sculo gallinaceo incoquere. aluum siquidem subducunt: sed non cum tanto successu.

Agaricum pituitam bilémq; deducit, sed segniter. vtilissimum est hepati, lien, pulmonibus, anhelatoribus, acidum ructantibus, & his qui articulorum morbo, & capitis grauedine vexātur: conuenit etiam singultibus, morbo caduco, & mulierum doloribus. pondus est sicilicet ex mulso aut posca.

Euphorbium aquosos humores, biliososque detrahic. R. C. F.



INDEX EORVM QVAE  
in Aretæi & Ruffi libris  
continentur.

A.

Abdomē 422, 460	ancon 419, 458
acetabulum 425	ancyroides 487
achichadaron 423	angina 12, 259
acini 420, 458	anguli 454
acromiū 418, 458	anhelitus 119, 122
acromphalon 422	anthelix 414, 455
adenes 158, 435.	anthereon 454
482	antiades 417, 470
adeps 445, 482	anticari, n 418,
AEgyptiaca vlce-	457
ra 19	antilobis 414
AEgyptij medici	antisternon 417
428	antitragus 455
ala 419, 458	aortæ 434, 443,
aluus 422	444
amnios 448	aphthæ 19
amphidion 440	apoplecton 93
anagoge 33, 35	apoplexia 99, 242
anæsthesia 59	apostematia 111
anasarca 124, 147	aqua intercus 146
ancistroides 487,	aqualiculus 422



aquilæ	442	Blepharides	410
arachnoides	433	bilis conceptaculū	
aræa	436		472
aranealis	468	bilis atra	446
Aristotelis locus		bilis flaua	446
417, 444		brachiō	457, 458,
arquatus	133		488
arteriæ	443, 482	bronchia	118, 434,
arteria aspera	457		475
arthritidis	196	bronchus	418, 457
articulorum mor-		bubones	44
bi	393		
aruspices	437	C.	
ascites	147		
Asclepiades	483	Cachexia	140
aspera arteria	418	cacochymia	365
assessores	438, 480	calculus	159, 164,
asthma	119, 203		384
astragali	425	calx	426, 462
Athenarum pesti-		cauini dentes	416,
lencia	14		456
auriculæ	455	canthi	411
aurigo	133	caput	410, 452
		cardiaci	297
B.		carotides	70, 444
		cartilago	422,



444,460,482	Clitarchus	440
eatheter 488	clitoris	424
cauernæ 434	clitorissare	424
causus 47,62	clunes	425,461
ceneones 425	coccyx	425,461
cephalæa 79,339	cœca foramina	430
cephalalgia 79	cœcum intestinum	
cercis 488	477	
cerebrum 431,44,	cœliaci	175,390
457	cœlum	17,456
cervix 418,437,	κοιλοιδία	411
456,457	colici	178
cerumina 136,446	coles	423,460
chartæ 452	collum	418,437
chela 411	colli vertebræ	433
chemosis 412	colon	54,436,437
chiasmus 201	477	
chiragra 196	columella	456,470
cholades 179	eius morbi	16,263
cholera 49,308	columna	17,417,
chorion 468	453	
choroides 432,468	coma	30
chyli 447	comitialis morbus	
chymi 446	2,82,250,357	
cilia 411,454	concha	414,455
claves 418,458	condyli	420,458



cor	422, 434, 459,	469	
	473, 474		
coræ	454	ctedones	468
cornicularistuni-		cubitissare	420
ca	432	cubitus	420, 458
corona	452, 468		488
corone	411	cuculus	461
coronaria futura		cyceon	181
	428	cyclops	417
corfæ	410	cynanche	13
coryza	413	cypselis	136, 446
costæ	422. earum		
tunicæ	435 mor-	D.	
bus	24	Dartos	441, 481
cotyli	491	delphys	440
coxendix	426	dentes	416, 456
cranteres	416	dera	457
craspedon	17	diabetes	154, 382
crassæ arteriæ mor		diaplissare	423
bi	320	diarrhoea	175, 193
cremasteres	55,	digiti	420, 459
	441	Dionysius	443
cremni	424	diploe	429
crotaphi	410	discoides	469
crusta	19	dodecadactylus	
crystalloides	433,		477



Dores Siculi	20,	epigonatis	426,
	442		462, 491, 492
dorsi ossa	425, 461	epigunides	426,
dracontides	442	epilepsia	82
dysenteria	179	epymilis	426
		epiploon	437
E.		episcenium	410
		epision	424, 460
Elephantias	203	epomides	418, 457
elephantiasis	394	Erasistatus	483
elephas	203	erythroides	441,
Empedocles	444		481
emprosthenos	7	eschara	19, 187
empyema	36	etmoide	429
empyi	107, 111	Eudem <sup>o</sup>	418, 430,
entera	189		443
epanthismi	443	eunuchi	480
ephebaeum	422	Euripho	424
ephedrana	462	exanthemata	19
Epicharmus	420	excrementa	445,
epichordis	52		446
epidermis	412	F.	
epigastrium	422,		
	460, 476	Facies	413
epiglossis	416, 456	fauces	417
	469		



pestilentes mor-		gonorrhœa	168,
bi	266		386
febris bistoria	47	gonos	446
fibræ	455, 468	gracilia intestina	
fibræ auris	414		477
filamenta	468	grammatistæ	450
flatus	446	gula	434, 471, 475
fœmina	426, 462	gurgulio	16, 417,
foramina	430		457
frons	410, 452	guttur	418, 434,
furor	87, 91		457

## G.

Gangrana 69  
gastrocnemia 426  
gemini 423  
genæ 410  
genuini 416, 456  
genu 426, 462  
gingivæ 416, 456  
glabella 410, 413,  
452  
glans 423  
glena 411, 454  
globulus 453

## H.

Habena 455  
hæmorrhagia 33  
helix 414, 455  
hemine 425  
hepatitis 442  
herculeus morbus  
207  
Herophilus 426,  
432, 433, 434, 439  
442, 468, 483  
Homeri locus 87,  
417, 418, 425, 436



homo exiguus mū	hystera	440
dus 465	I.	
homini familia a-		
nimantia 427		
hostiarius 477	Ichor	190
humerus 418, 419,	icterus	133
457, 458, 487	iecur	437, 472
humorum species	iecoris morbi	55,
108	124, 316, 376	
hydropici 129	ieiunum intestinū	
hydrops 146	436, 477	
hypena 416	ilia	425
hypochōdria 422,	ileus	51
460	ilithya	448
hypodermis 424	iugua	425, 462
hypodiris 418	infania	86
hypoglossis 416,	intercostalia	422
456	internodia 420, 458	
hypoglutides 425	489, 493	
hypopia 413, 454	interseptum	475
hyporrhinon 413,	intestina	436, 476
453	iris	412, 454
hypospondylum	ischias	195
425, 461	isthmi	470
hypothenar 421	ithmoides	480
hypostema 460	iugula	458, 482



418  
 iuli 410, 416, 452  
 L.  
 Labia 453  
 lac 446  
 laccopedon 423,  
 461  
 laccoschea 423  
 lacertus 458  
 lactes 52, 436, 478  
 leuitas intestino-  
 rum 188  
 lambdoides futura  
 428, 486  
 lanugo 410, 416,  
 452  
 laparæ 428  
 lapidea ossa 429  
 laxum intestinum  
 436  
 lateris morbus 23,  
 268.  
 latus 459.  
 lēticularis tunica  
 433, 469  
 leo morbus 207  
 lepidoides futura  
 428  
 leucania 415, 418,  
 454  
 leucophlegmatias  
 149  
 lien 438, 472  
 lienis morbi 129,  
 379  
 lenteria 189  
 lingua 416, 456,  
 469  
 lorum 17  
 lumbi 421, 459, 461  
 M.  
 Malæ 414, 454.  
 mala 417, 419  
 malleoli 462  
 malus corporis ha-  
 bitus 140  
 mamma 421, 459  
 mandibula 454  
 Nn



maxilla	87	micare	443
manus	419, 420,	mola	462, 492
458		molares	416, 456
marmorata	136	mortariola	416,
446		456	
maxillae	454	mucor	413
maxillares	416	mucus	446
medulla	432, 445,	musculi	430, 439,
483		445, 482	
melancholia	86, 365	myrtachila	424,
melancholici	87	461	
membranæ	431, 445	myrton	424, 461
mensæ	456	mystaces	416
menes	446	myttotum	185
mentum	415, 454	myxæ	413
mesarcon	436, 478	N.	
mesenterion	436		
mesomeria	426		
mesophryon	410,	Nares	413, 453
452		nasus	429, 452
metacarpion	420	nates	425, 461
metacondyli	420,	necrosis	69
458		nephritis	439
metaphrenon	421,	nerui	432, 444, 483
459		neruorum resolu-	
metra	440	tio	98



nixra	436	paralyfis	99
nodi	458	parameria	426
nympha	414, 424,	paraplegia	99
461		parasyra	416, 456
O.		parencephalis	431
Oculus	411, 432	parefis	99
453, 467		paristhmia	417,
occiput	410, 452	470	
occipitium	457	patella	426, 462,
oesophagus	434	492	
olecranon	420, 458	pecten	422, 424,
omentum	437, 479	460	
omoplatae	418	pectus	421, 459
opisthotonos	7	penis	460
ora venarum	472	perioftios tunica	
orrhos	423	428	
orthopnoea	119	Pericardios	435,
ossa	482	474	
P.		pericraniū	428
Palatum	417, 456	perineus	460
palma	420	peripneumonia	29
palmae	458	peritonæon	437
palpebrae	410, 453	pestis faucium	266
pancreas	437	peza	463
papillae	421, 459	phagedæna	193
pappus	416	phalanges	420,

Nu 2



458, 489		præputiū	413, 460
pharynx	471	præsepia	456
phlegmatias	147	proboscis	206
Philistio Ital <sup>o</sup>	442	procardion	422,
philtrum	413, 453	459	
phrenes	435, 459	prochila	413, 453
ptrenitici	216	procondyli	420,
phthisis	107, 373	458	
phthoe	107	proglossum	456
pinguitudo	482	propogonium	416
pinna	413	prostemion	414,
pituita	445	453	
planta	426, 463,	psoæ	439, 440
493		pterygomata	424
plechas	74, 423	pubes	422, 460
plechades	462	pudenda	460, 461
pleuritis	23, 268	pudendum mulie.	
podagra	196	bre	424
pollex	420	pulmonis abscess <sup>o</sup>	
poples	426	117	
porta iecoris	437	pulmonis vlcera	
portæ venarū	472	373	
Praxagoras	441,	pulmonarij	122
444, 446		pulmonaria	28, 281
præcordia	422,	pulsus	482
460		pupilla	411



purulenti	107, 111	sanguinis reiectio	
pus	108, 111		32
pyelides	486	satyriasis	73, 707
pylorus	436		332
pyrinoides	434	scirrhus	129, 379
R.		sceptrula aperta	
Rabidus canis	13		457, 487
radius	420, 426,	scotoma	82
488		serotum	423, 460,
regius morbus	132		480, 481
renes	438, 478	scutilla	420, 458
renum affectus	63,	scytaides	489, 493
158, 323		sedimentum	423,
reticularis tunica			438, 460
433, 468		secundæ	448
rhago des tunica		sedilia	425
ibidem		femen	446
rhorrhones	413	feminis profluuiū	
rigor	7		168, 386
ryteon	181	f. minaria vasa	338
			479
S.		seranges	445
Sacrum os	425,	septū transuersum	
461, 490			459
salua	446	sigmatoides	488
		sophronisteres	416
		Nn	3



4567		T.	
spathe	459	Tabes	241
sphincter	477, 478	talus	491, 492
spina	425, 457, 461,	tali	426, 462
467		tarsus	410, 420,
splenitis	442	426, 454, 493	
spuriae costae	422,	tempora	410, 452
490		tendones	418, 444
stema	423, 460	tergum	459
sternō	112, 421, 459	testes	423, 460
stethos	420, 426	testiū tunicae	441
stomachus	434	tetanus	7, 253
stomachi affectus		tibia	426, 462, 491
170		thenar	418
stomachici	389	thora	446
strophus	178	thorax	409, 421,
sudor	446	451	
sumen	460	thymus	435
supercilia	452	tonfillae	417, 470
sura	426, 462, 491	tonfillarum vlce-	
suturae	428	ra	19
sinanche	12	tonus	
synciput	410, 452	toni	434, 447
syncopa	43, 297	tormina	178
Syniaca vlcera	19	tragus	419, 455
		tramis	423, 438



transuersum septū	435, 475	vesicę agritudines	66, 164, 326
tunicę	445	vestigium	463
tunicę oculi	412,	veternosi	233
467		vetula	422, 460
tympanias	147	vipera	213
V.		vitrea	468
Vbera	421	vlna	458
venę	441, 443,	umbilicus	422,
472, 482		445, 460	
venę concauę mor		ungues	428, 458
bi	58, 320	vola	421, 458, 459
venum vlcera	384	voluulus	51, 178,
venter	422, 436	313	
veter superior	476	vreteres	423, 438
vetricul <sup>9</sup>	436, 475	vrethra	423
ventriculi affectus		vrina	446
175		vrinę profluuium	
ventriculos'	422	154	
vertebrę	425, 433	vrinaculum	448
461, 487, 489		vterus	440, 481
vertex	410, 420,	vteri morbi	190
452		vua	17, 417, 457
vertigo	82	vuiferi processus	
vertiginosi	349	417	
vesica	438	vulpes	439



vulua 69,440,481 Ypsiloides 434  
vulux strangula-  
tus 69,329 Z.

Y Zeno 447



